

GESAMMT-CATALOG

DER

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI ZU LEIPZIG.

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

PREISVERZEICHNISS No. 37.

1662.

16

66

## Bemerkungen.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge durch Postvorschuss oder durch Nachnahme von den Eisenbahnen erhoben werden.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 15 = Thaler 4, Fr. 100 = Thlr. 26 $\frac{2}{3}$ .

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égle valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

L'affranchissement de lettres simples de France pour l'Allemagne est de 50 cent.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

*l'Etablissement horticole*

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen,  
one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6 $\frac{2}{3}$  Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Express Co., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

*Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence (an unpaid letter is taxed twice as much).*

The Horticultural Establishment  
of H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Agents for Great Britain: Messrs. Betham & Blackith, Cox's Quay,  
Lower Thames Street, London E. C., but all letters must be directly sent to

**H. LAURENTIUS**

LEIPZIG (Germany).



Catalogue général  
de  
L'Établissement horticole de H. Laurentius, Leipzig.  
Prix-Courant № 37. Printemps et Été 1867.

№ 37.

PREIS-VERZEICHNISS  
der  
LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI  
zu  
LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1867.

I. ABTHEILUNG.

NEUHEITEN.

Nouveautés. — Novelties.

Warmhaus. — (Serre chaude. — Stove.)

1 Thaler de Prusse = Fr. 3. 75 c. — 8 Groschen = 1 Franc.

1 Prussian Thaler = 3 Shillings. — 10 Groschen = 1 Schilling.

4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

Thlr. Gr.

**Achyranthes aureo-reticulata.** Eine sehr hübsche Varietät des bekannten A. Verschaffelti, von derselben Grösse, Blattform u. constanten Färbung. Die Blätter sind glänzend dunkelgrün mit hellgelber Nervatur, ein Colorit, welches durch die hellrothen Mittelrippen u. Blattstiele noch mehr hervorgehoben wird. Gute Acquisition, die bald eben so grosse Verbreitung finden wird, als die Stammart. (12 Stück Thlr. 2.) — 6

**Alocasia gigantea.** Eine der distinctesten Species dieser Gattung. Die grossen pfeilförmigen (sagittifolia) Blätter haben einen ebenso metallischen Glanz, als die von A. Veitchii, nur werden sie (wie überhaupt die ganze Pflanze, welche eine Höhe von 4 Fuss erreicht) weit grösser. Species von grossem Effect. — 4 —

**Amaryllis Alberti flore pleno** (Laurentius) (Amaryllis Alberti à fleurs pleines). Diese so prachtvolle Varietät, von welcher wir das Eigenthumsrecht erworben haben, wurde von Herrn Albert Wagner in Cuba aufgefunden. Die Blumen sind von leuchtend orangerother Grundfarbe mit einem frischen glänzenden Carmin nüancirt. Die Basis der einzelnen Petalen ist weissgelb. Die einzelne Blume hat einen Durchmesser von 6 Zoll. Die Staubgefässe sind durch 30—40 Petalen ersetzt, welche eine vollkommen geformte Blume bilden und nicht

wie bei der bekannten rostrothen *A. fulgida* fl. pl. verkrüppelt erscheinen. Die schönen lebhaft grünen Blätter erreichen eine Länge von  $1\frac{1}{3}$  Fuss bei einer Breite von 2 Zoll.

Im Februar und März erscheint der etwas über 1 Fuss hoch werdende Blütenstiel, welcher regelmässig 2 Blumen entwickelt, wovon die zuerst entfaltete vollkommen aufrecht steht, während sich die zweite etwas neigt.

Die stärksten Zwiebeln erreichen einen Durchmesser von 2 Zoll, und ist besonders noch hervorzuheben, dass sie sich leicht durch Brut vermehren, aus welchem Grunde leicht vor auszusehen ist, dass diese *Amaryllis* in wenig Jahren eine beliebte Marktpflanze werden wird.

Diese prächtige Neuheit ist abgebildet in der »Illustration horticole« und in »Neubert's Garten-Magazin«.

*Wir liefern hieron blühbare Zwiebeln . . . . . à 4 —*  
*und fügen einer Bestellung von 4 Stück ein fünftes gratis bei.*

**Anthurium regale.** Ein würdiger Rival des *Anth. magnificum*. Die Blätter dieser neuen Species, von Wallis in tiefen Schluchten der peruv. Cordilleren aufgefunden, sind länglich herzförmig u. erreichen eine Länge von  $2\frac{1}{2}$  Fuss bei entsprechender Breite. Ihr Colorit ist glänzend smaragdgrün mit hervortretender weisser Nervatur . . . . . 6 —

**Aralia Sieboldi fol. aureo var.** Diese von Herrn von Siebold aus Japan eingeführte Varietät ist anstatt weiss, wie die ältere Spielart, gelb an den Blatträndern gezeichnet . . . . . 4 —

**Begonia Pearcei.** Sehr hübsche Species. Die Oberseite der Blätter ist sammetig hellgrün mit dunkler Zeichnung: die untere Seite trüb-roth mit hellgrünen Adern. Blume gross, gelb. Von Peru. In der Form der Blätter der *B. cinnabarina* ähnlich . . . . . 1 —

**Bertolonia guttata.** Eine der zierlichsten Melastomateen. Die ovalen 5 Zoll langen u. 3 Zoll breiten Blätter sind von dunkel olivengrüner Färbung u. mit regelmässigen Linien rosenrother Punkte geziert. In der That eine höchst reizende Erscheinung . . . . . 3 15

**Bertolonia pubescens.** Zwergige Art, deren ovalspitze Blätter stark behaart sind. Ihre Färbung ist hellgrün, der mittlere Theil jedes Blattes aber dunkel chokoladenfarbig. Eine ebenfalls gute Einführung . . . . . 1 15

**Calathea (Maranta) Lindeniana.** Prächtige neue Art und in derselben Region, wie *Calathea Veitchiana* durch Wallis aufgefunden. Sie hat mit dieser viel Aehnlichkeit, ohne jedoch den lebhaften Farbenschmuck der Rückseite der Blätter zu besitzen, welche dagegen noch transparenter sind, als die Blätter jener Species . . . 6 —

**Calathea (Maranta) splendida.** Von Herrn Baraquin am oberen Maranon entdeckt. Die dunkelgrüne Oberfläche der Blätter ist längs der Mittelrippe hellgrün, fast gelblich gezeichnet, während die untere Seite braunroth ist. Eine schöne Art, die eine ansehnliche Grösse erlangen soll . . . . . 7 —

**Calathea Veitchiana (Maranta Veitchii).** Prachtvolle Species von Peru. Die grossen, langgestielten Blätter glänzen metallisch u. sind längs der Mittelrippe durch eine dunkelgrüne Zeichnung charakterisirt. Die Rückseite schillert in mehreren Farben, ist von regelmässiger Zeichnung u. hat in der That Aehnlichkeit mit dem Farbenglanz einer Pfauenfeder . . . . . 12 —

**Chamaerops elegans.** Neue Species, die einige Aehnlichkeit mit *Cham. tomentosa* hat, sich von dieser aber durch einen gracileren Habitus untersch eidet, indem die Blattstiele länger werden u. sich elegant zurückbiegen. Die Wedel sind halbkreisrund mit tiefen Einschnitten und unterhalb silberweiss. Junge Pflanzen . . . . . 3 —



- Coleus Gibsonii.** Neue Species von Neu-Caledonien von dem gedungenen Wuchse des *C. Verschaffelti*. Die Blätter, welche eine ansehnliche Grösse erreichen, sind hellgrün u. mit violetrothen Adern u. Flecken sehr prägnant durchzogen u. bedeckt. Wird gleich *Achyranthes aureo reticulata* eine beliebte Handelspflanze werden . . . . . — 8
- Cattleya Bogotensis Lind.** Die Blumen sind sehr gross, rein weiss, die Sepalen u. Tepalen an der Basis gelb gefleckt. Von Bogota in Neugranada . . . . . 15 à 30 —
- Cattleya maxima Lind.** Diese prächtige Orchidee wurde von Wallis in Ecuador aufgefunden. Die Blumen sind ebenso gross als die von *L. purpurata*, die Sepalen hellrosa-violet, die Lippe gefranst, carminroth, weiss geadert u. in der Mitte mit einem bandartigen gelben Flecken gezeichnet . . . . . 20 —
- Cattleya quadricolor Batem.** Blumen etwas kleiner als die der vorstehenden Species. Die Sepalen sind schneeweiss, die Tepalen sehr gross u. blassrosa, die Lippe lebhaft rosa, der Schlund goldgelb, weiss eingefasst u. die Spitze des Labellum ist mit einem dreieckigen brillant purpurfarbigen Fleck geziert . . . . . 15 —
- Cypripedium insigne var. Maulei.** Eine Varietät der bekannten Species, welche sich vor Letzterer durch den breiten rein weissen Rand des oberen Blumenblattes auszeichnet, wodurch das Grün u. die rothen Flecke der Mitte um so mehr hervortreten. . . . . 7 à 20 —
- Dieffenbachia gigantea.** Die grossartigste der Dieffenbachien. Blätter sehr lang und mit grossen, weinweissen Flecken übersät, Stengel getigert . . . . . 4 —
- Dieffenbachia Weirii.** Diese Species, welche von Hrn. Weir in Südamerika (wo?) entdeckt wurde, zeichnet sich von allen Arten dieses Genus durch ihren niedrigbleibenden Habitus aus. Die Blätter sind schmal, verhältnissmässig lang, glänzend dunkelgrün u. mit hellgelben Flecken dicht bedeckt . . . . . 8 —
- Dipladenia nobilis Ch. Morren.** Liebliche Schlingpflanze Brasilens mit zartrosarothern Blüthentrauben . . . . . 1 20
- Ficus Chauvierii.** Blätter glänzend grün, bis zu 1 Fuss lang werdend. Hat einige Aehnlichkeit mit *F. elastica*, den diese neue Art aber schwerlich verdrängen wird . . . . . 2 —
- Ficus Suringarii.** Die glänzend grünen, mit purpurrothen Adern lebhaft gezeichneten Blätter erreichen eine Länge von  $1\frac{1}{2}$  Fuss. Ist empfehlenswerth als Decorationspflanze für Zimmer u. Gewächshäuser . . . . . 2 —
- Graptophyllum comorense.** Mit ebenso schönem Blattwerk, als *Grapt. hortense*, aber eleganter. Die Blätter sind sehr lang, lanzettlich zugespitzt, dunkelgrün u. mit orangegelber Nervatur . . . . . 1 —
- Hoya maxima.** Höchst auffallende Species mit grossen, dicken Blättern, welche bis  $1\frac{1}{2}$  Fuss lang werden. Rankt in einem feuchten Warmhause beträchtlich hoch . . . . . 6 —
- Laelia grandis.** Prachtvolle Art, von Bahia. Die Blumen, welche meistens paarweise erscheinen, sind sehr gross; die Sepalen und Tepalen nankingfarbig u. die dreilappige Lippe weiss u. roth geadert 15 à 30 —
- Laelia Wallisii Lind.** Ausgezeichnete Art, von Wallis an den Ufern des Rio Negro entdeckt. Die sehr grossen Blumen sind weiss, die Lippe gelb . . . . . 30 —
- Latania borbonica var. erecta (Livist. chin.).** Auffallende Varietät, die von der allbekannten Species durch schnellere Entwicklung, grössere Dimensionen u. namentlich durch einen aufrechten,

geraden Wuchs sich unterscheidet. Die Wedel dieser Art werden grösser, die Blattstiele länger u. mehr in die Höhe gerichtet. Neben einer Pflanze von gleicher Stärke der bekannten Species gestellt, fällt diese Varietät durch ihren verschiedenartigen Habitus sofort Jedermann auf. Pflanzen mit 3—4 Blättern . . . . . 4 —

**Maranta roseo-picta** (*Phrynium roseo-pictum*). Ein wahres Juwel unter den Marantaceen! Diese Species stammt vom tropischen Südamerika u. wurde von Wallis entdeckt. Die mittelgrossen Blätter sind von musterhafter ovalrunder Form, dunkelgrün mit glänzend metallischem Glanz u. geschmückt mit zwei breiten Bändern vom schönsten Carminroth . . . . . 3 15

**Odontoglossum luteo-purpureum** Lind. Schöne Art von Neu-Granada mit grossen (4 Zoll im Durchmesser haltenden) gelben, purpurgefleckten Blumen . . . . . 15 —

**Passiflora helleborifolia** Will. Hübsche Species vom Rio Negro. Blüht blassrosa mit violettem Centrum . . . . . — 20

**Pavetta incarnata alba**. Diese Varietät übertrifft die bekannte Species durch grössere, rein weisse Blumen . . . . . 1 10

**Pavetta Oxleyana**, Blumen zart rosa . . . . . 1 10

**Peperomia acuminata** R. P. Eine sehr hübsche Goodyera-ähnliche Species mit sammetig dunkelolivengrünen, wie broncirten Blättern, deren Rückseite purpurroth ist . . . . . — 25

**Peperomia argyrea**. Blätter fast zirkelrund, schief zugespitzt, sehr substantiös, einer Begonia albo-coccinea sehr ähnlich, silbergrau mit 8 breiten dunkelgrünen Streifen netzartig überzogen . . . . . 1 20

**Peperomia marmorata**. Kam unter dem Namen *P. arifolia* in den Handel. Durch Weir in Brasilien aufgefunden . . . . . 1 —

**Piper bicolor**. Mit *P. porphyroneuron* an Schönheit rivalisirend. Die Blätter sind sammetig hellgrün; Rückseite derselben, sowie Stamm und Blattstiele dunkelblutroth . . . . . 1 20

**Pisonia longirostris**. Höchst ornamentale Pflanze mit grossen, glänzend dunkelgrünen Blättern, auf deren Mittelrippe in ihrer ganzen Länge ein hellpurpurrother Streifen sich hinzieht. Die jungen Blätter und Blattstiele sind ganz roth . . . . . 1 15

**Scindapsus pictus**. Neue Aroidee von demselben Wachsthum wie *Pothos argyrea*, deren Blätter aber dreimal grösser werden, übrigens aber auch mit vielen grossen silbergrauen Flecken marmorirt sind. . . . . 1 20

**Selenipedium Pearcei** Rehb. fil. (*Cypriped. Pearcei* Veitch.) Ist nach einer Angabe in Dr. Koch's Wochenschrift (1866 Nr. 40) das vor langer Zeit schon eingeführt gewesene, aus den Gärten aber wieder verschwundene *Cypriped. caricinum*. Diese höchst interessante Species, die wir empfehlen, stammt aus Peru, wo sie von Herrn Pearce neuerdings aufgefunden wurde . . . . . 20 —



## Kalthaus und Freiland.

Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

**Alnus glutinosa var. aurea** (Verv. et fils). Varietät, die eine grosse Zierde für Gärten und Parks zu werden verspricht. Die breiten Blätter dieser Erlenspecies sind bei vorstehender Varietät



von goldgelbem Colorit mit regelmässigen grünen Streifen und grüner Nervatur. Von Herrn A. Verschaffelt in den Handel gegeben. Junge Veredelungen . . . . . 1 20

**Bletia hyacinthina R. Br. fol. albo striatis Sieb.**

Abgebildet in Dr. Regel's Gartenflora 1846, Decemberheft. Die Bl. hyacinthina ist eine Erdorchidee des südöstlichen Asiens und bringt schön carmin purpurrothe, ansehnlich grosse Blumen hervor. Die Lippe ist weiss gestreift. Eine Abart derselben, welche Lindley als Bl. hyacinth. Gebina beschrieben, hat unscheinbare, blassrosa Blumen.

Wir offeriren hiermit die echte Species, und zwar in einer neuen Form mit rein weiss gestreiften Blättern, welche Herr v. Siebold in einem einzigen Garten Jeddo's gefunden, und nachdem er sie in seinem jap. Garten zu Nurutaki mehrere Jahre cultivirt, in sein Etablissement zu Leyden eingeführt hat. Es dürfte die letzte Einführung dieses berühmten Naturforschers sein, der bekanntlich am 18. October v. J. in München dem Typhus erlegen ist.

Die glattrandigen Blätter dieser Orchidee erreichen, bei einer Breite von 1 bis 1½ Zoll, eine Länge von 1 bis 1½ Fuss, sind glänzend dunkelgrün und rein weiss gestreift und gerandet. In Folge dieser schönen Panachirung und der elegant überhängenden Blätter stellt diese Orchidee eine der zierlichsten buntblättrigen Pflanzen dar.

Die Blumen, von dem oben angegebenen schönen Colorit und ziemlich von der Grösse der *Cattleya pumila*, erscheinen zu drei bis vier an einem Blüthenstiel in den Monaten Mai bis Juni. Ihre Inflorescenz hat die lange Dauer von 6 bis 8 Wochen.

Es ist eine Orchidee für das Kalthaus, worin sie kräftig gedeiht, und kann in den Sommermonaten vielleicht sogar an einen passenden schattigen Platz des Gartens ausgepflanzt werden, worüber wir jedoch bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht haben.

*Wir haben die ganze Auflage dieser interessanten Neuheit von Herrn v. Siebold acquirirt und liefern von jetzt an junge kräftige Pflanzen für den Preis von*

12 Thaler = 45 Francs = 36 Shillings.

Jedem Auftrage wird eine colorirte Abbildung beigegeben.

**Fagara piperita fol. var.** Laubabwerfende Kalthauspflanze mit schönen dunkelgrünen, gelb panachirten fiedertheiligen Blättern. . . — 20

**Gazania splendens fol. var.** Sehr hübsche Varietät mit weiss gerandeten Blättern . . . . . — 8

**Gymnogramme japonica.** Durch J. Veitch von Japan eingeführte neue Art, welche grosse Aehnlichkeit mit *G. javanica* hat, aber hart ist und wahrscheinlich auch bei uns im Freien ausdauern wird . . . . . 1 15

**Ophiopogon spicatus var. fol. albo striatis.** Schön buntblättrige Pflanze, die dunkelgrünen Blätter mit zierlicher rein weisser Panachirung. Ist gleich *Ophiopogon Jaburan* Lodd. fol. varieg. eine Einführung v. Siebolds aus Japan . . . . . 3 —

**Philadelphus sp. Japan. (Sieb.)** Eine von Siebold sehr empfohlener Blütenstrauch mit ausserordentlich grossen Blumen. Junge Stecklingspflanzen . . . . . — 15

**Picea excelsa tenuifolia.** Mit feineren Nadeln und Zweigen als die Mutterform, und sehr elegantem Habitus. Junge Veredelungen 2 —

**Picea orientalis glauca.** Eine auffallend feinzweigige Varietät von ausgesprochener blaugrüner Färbung. Junge Veredelungen . . . 2 —

**Polygonum filiforme Thunbg fol. arg. var.** Sehr schöne und rein weiss panachirte Varietät von Japan . . . . . — 15

- Primula cortusoides var. amoena Veitch.** Diese weit reichlicher als die Species blühende Varietät bringt grosse Dolden dunkelrosafarbiger Blumen hervor, ist von leichter Cultur und wird jedenfalls eine beliebte (frühblühende) Handelspflanze werden. . . . 1 —
- Rhodea jap. macroph. luteo maculata.** Eine neue Varietät dieser Gattung, von welcher die ältere Rhod. jap. macroph. alb. marginata bekannt ist. Auf den dunkelgrünen Blättern der vorstehenden Art heben sich die gelben breiten Streifen, womit sie geziert sind, auffallend hervor . . . . . 1 25
- Selaginella japonica.** Ganz harte Species fürs Kalthaus. Eine der feinsten und zierlichsten Arten von intensiver hellgrüner Färbung — 15
- Thuja occidentalis Lawsoniana.** Dieselbe gleicht im Habitus und der Zweigbildung fast einem Cupressus Lawsoniana und zeichnet sich durch eine blaugrüne Färbung aus. Junge Veredlungen 1 15
- Thuja spec. Nord-West-Canada.** Gleicht im Wuchs dem Th. Menziesi, zeichnet sich aber durch viel breitere, bandartige Zweige und eine fast weisse Färbung auf der Rückseite aus. Junge Veredlungen . . . . . 2 —
- Weigelia purpurata (W. Middendorffiana var. purpurata Lemaire).** Neue von Herrn van Poppel, einem holländischen Kunstgärtner, aus Samen gewonnene Varietät, welche sich von der alten W. rosea durch ein weit dunkleres Colorit unterscheidet. Reichblühend und hart wie die anderen Sorten. Junge Stecklingspflanzen . . . . — 15
- Wellingtonia gigantea fol. aureo var.** Diese schöne Varietät, welche einer in Cork geschehenen grossen Aussaat dieser beliebten Conifere zu verdanken ist, macht in England ungeheures Aufsehen, und ihr Preis geht natürlicherweise mit ihrer Seltenheit gleichen Schritt. Die Mutterpflanze ist von regelmässigstem schlankem Pyramidenbau, die Panachirung ist goldgelb, sehr lebhaft und constant. Unter den Nadelhölzern stellt sie unbedingt die schönste buntblättrige Varietät dar.
- Wir liefern hiervon junge Herbstveredlungen auf kräftigen, gut bewurzelten Unterlagen. (Jeunes greffes d'automne.) . . . . . à 4 —

## Vorjährige Neuheiten,

sowie

eine Auswahl neuerer und seltener Pflanzen.

Plantes d'introduction récente et Plantes rares.

Warmhaus. — Serre chaude. — Stove.

- Abutilon vexillarium (A. megapotamicum St. Hil.)** Blumen in den deutschen Farben schwarz, roth, goldgelb . . . . . — 6
- Alocasia longigloba** . . . . . 6 —
- » **Lowii** . . . . . 3 à 5 —
- » **metallica** . . . . . 1 Thlr. 15 Ngr. à 6 —
- » **tigrina** . . . . . 6 —
- » **Veitchii** . . . . . 3 —
- » **zebrina** . . . . . 2 Thlr. 15 Ngr. à 6 —
- Sämmtlich ausgezeichnete Arten, die in keiner Sammlung fehlen sollten.
- Alternanthera amoena** . . . . . Reizende Amarantaceen, im Sommer vor — 6
- » **spathulata** . . . . . zügl. gut verwendbar zu Randverzierungen — 6
- » **(Teleanthera) versicolor** . . . . . von Gruppen des freien Landes. — 6



- Amaryllis procera** (Hippeastrum procerum). Die einzige blau blühende Amaryllis. Selten! . . . . . 8 —
- Anecochilus magnificus**. Hat für die Art sehr lange, lancettförmige, Spiranthes ähnliche Blätter von fast unbeschreiblicher Schönheit . . . . . 15 —
- » **spectabilis**. Wahrscheinlich eine Spielart von *A. cordatus*. Färbung ebenso schön, aber die Blätter grösser und breiter . . . . . 7 —
- Anthurium albo-costatum** Sind nächst *A. regale* (vide . . . . . 1 10
- » **Augustinianum** pag. 2) die prächtigsten { . . . . . 1 à 2 —
- » **coronarum** Species dieser Abtheilung { . . . . . — 10
- » **glaucescens** der Aroideen. Bilden unter { . . . . . — 15
- » **imperialis** den Blattpflanzen eine { . . . . . 1 à 2 —
- » **leuconeuron** Hauptzierde der Warm- { . . . . . 2 à 3 —
- » **magnificum** häuser u. Blumentische. { . . . . . 2 à 10 —
- » **Scherzerianum Schott.** Diese in Guatemala u. Costa Rica einheimische Aroidee weicht in ihrem äusseren Habitus von den vorstehenden Arten bedeutend ab. Es ist eine zwergige Pflanze mit für die Gattung kleinen, schmalen, dunkelgrünen u. glanzlosen Blättern. Dagegen ist ihre Inflorescenz prachtvoll. Die Blumen, auf die Pflanze überragenden Pedunculen getragen, sind gross u. von höchst intensivem Scharlachroth. Ihre Blüthedauer ist eine sehr lange . . . . . 7 à 20 —
- Aralia Seiboldii** fol. albo marg. Durch Grossartigkeit der Form u. wirklich schöne Panachirung wird diese Pflanze jederzeit ihren Werth behalten 3 à 5 —
- Begonia Bettina** von Rothschild (*Vilm.*). Eine Vervollkommnung der bekannten *B. splendida* . . . . . — 15
- Bertolonia maculata**. Im Habitus der *B. marmorata* sehr ähnlich. Blätter bräunlich olivengrün, in der Jugend mit ganz feinen maigrünen Punkten besetzt . . . . . — 25
- § **Bignonia argyrea** violescens. Die Blätter dieser rasch wachsenden Schlingpflanze sind von lieblichem Colorit: grün, violettrosa u. silberweiss 1 —
- Botryodendron macrophyllum** (*B. latifol. Endl.*) Eine der prachtvollsten Araliaceen . . . . . 4 —
- § **Calonyction sanguineum** Choix. Ebenfalls rankend. Die grossen Blumen sind leuchtend roth . . . . . — 20
- Chamaeranthemum Beyrichianum** { Gewächse, die durch buntes Co- — 8
- » **marmoratum** { lorit und die farbige Nervatur ihrer — 8
- Belaubung Beliebtheit erlangt haben. Die Blätter sind von eleganter länglich lanzettlicher Form.
- Cinchona nobilis**. Eine höchst decorative Species dieser wichtigen Pflanzengattung . . . . . 2 —
- § **Cissus amazonica**. Zierliche, fast herzförmige, in einer langen Endspitze auslaufende dunkelgrüne Blätter mit weisser Nervatur . . . . . — 15
- § **Clerodendron Balfourii**. Eines der schönsten rankenden Gewächse. Die Blätter sind herzförmig und dunkelgrün, der Kelch der Blume ist rein weiss u. die Corolle oder Blütenkrone leuchtend scharlachroth. Blüht sehr leicht u. lange. Ist entschieden eine Vervollkommnung von *Clerodendron Thompsonii*, übrigens auch eine ganz schätzenswerthe Species, deren Blumen aber weit kleiner sind, als die vorstehend empfohlene . . . . . — 15
- Coccoloba gigas** . . . . . 2 —
- » **macrophylla** { Die vier grossartigsten Species dieses { . . . 3 à 5 —
- » **majestica** { Genus. { . . . 3 à 6 —
- » **pubescens** { . . . 2, 4, 8 à 10 —
- Colea Commersonii** { Schon ältere, aber ihrer grandiosen ge- { 3, 6, 10 à 20 —
- » **floribunda** { fiederten Blattform wegen sehr geschätzte } 1, 2, 3 à 12 —
- Pflanzen von höchst decorativem Werthe.
- Cossignea borbonica** Dne. Die gefiederten smaragdgrünen Blätter dieses prächtigen trop. Baumes sind durch eine lebhaft orangenrothe Nervatur ausgezeichnet . . . . . 6 à 30 —

- Croton pictum superbum.** Ist unstreitig die am auffallendsten colorirte Varietät der Gattung. Die Blätter sind grün, leuchtend goldgelb und purpurrosa . . . . . 1 20
- Dibrachion peltatum Rgl.** (Mappa fastuosa *Lind. Cat.*) Eine der interessantesten Blattpflanzen mit wagerecht stehenden, von langen rothen Blattstielen getragenen, breit herzförmigen, grossen Blättern. Eine Euphorbiacee von den Philippinen . . . . . 1 15
- Dieffenbachia Baraquinii** Diese drei Dieffenbachien von neuer Einführung sind sämmtlich von grossen Dimensionen u. durch ihren schneeweissen Blatterschmuck u. durch theils ebenfalls rein weisse, theils marmorirte Stämme u. Blattstiele eine aussergewöhnliche Zier von Gewächshäusern etc. *D. gigantea* erreicht eine ansehnliche Höhe. Die sehr langen, dunkelgrünen Blätter sind mit entsprechend grossen, rein weissen Flecken geziert. *D. grandis* . . . . . 2 —
- Dioscorea anecochilifolia** } Zwei sehr schöne Arten, die erstere mehrfarbig, 2 —  
 „ *argyrea* } die andere silbergrau marmorirt. — 20
- Dracaena Cooperi.** Die Blätter sind, wie bei *Drac. latifolia pendula* von ihrer Mitte an hängend, jedoch nicht so breit, als diese, dagegen ist ihr Colorit weit lebhafter, nämlich dunkelgrün u. lila-roth, manche Blätter ganz von letzterer Farbe . . . . . 6 Stück Thlr. 4. — — 25
- *grandis Glend.* (*Drac. term. ros. var. latifolia stricta.*) Diese schöne Varietät ist von kräftigem aufrechtem Wuchse u. von sehr lebhafter Färbung der grossen breiten Blätter. . . . . 6 Stück Thlr. 4. — — 25
- *limbata.* Eigenthümliche, schmalblättrige Art, Blätter graugrün mit rothem Rande, Rückseite fast ganz dunkelgrau. Diese durch Habitus u. Färbung sonderbare Species ist für jede Sammlung unerlässlich . . . . . 1 —
- *nigrescens.* Blätter aufwärtsstehend, wie bei *Dr. grandis*, ziemlich breit, glänzend schwarzgrün, fast schwarz und hie und da durch dunkelrothe Streifen belebt. Diese auffallende *Dracaena* scheint eine ansehnliche Grösse zu erlangen, wodurch der Effect, den sie hervorbringt, wesentlich erhöht wird . . . . . 2 —
- *Porteana versicolor.* Erinnert durch ihren Habitus an *Drac. grandis*, das Colorit ihrer Blätter ist aber sowohl im Grün als auch im Roth dunkler, letzteres mit einem bläulichen Schimmer, welcher der Pflanze einen besondern Reiz verleiht . . . . . 6 Stück Thlr. 8. — 1 15
- *termin. ros. var. latifolia pendula.* Das Colorit dieser übrigens sehr decorativen Varietät ist wenig lebhaft, dagegen sind die Blätter auffallend breit u. von ihrer Mitte an elegant überhängend. 6 Stück Thlr. 2. 20. — 15
- *robusta.* Imposante Species von kräftigem Wuchse mit elegant zurückgebogenen sehr breiten Blättern von leuchtend hellgrüner Färbung mit rothem Saum. Wir halten diese Art für eine der decorativsten der Gattung . . . . . 2 —
- Eranthemum rubro-venium** } Beide mit carminrother, sehr lebhafter Nervatur — 6  
 „ *sanguinolentum* } — 6
- Fagraea auriculata** Die grossen, hellgrünen lederartigen Blätter mit ihren vierkantigen, starken Blattstielen bilden einen seltsamen Contrast zu der leicht gefiederten Belaubung anderer Warmhauspflanzen. . . . . 2 à 6 —  
 „ *imperialis.* Echt! . . . . . 8 —  
 „ *obovata* } 20 Ngr. à 2 —  
 „ *tahitiensis* } . . . . . 2 à 6 —
- Ficus Grellei** } Zwei sehr verschiedenartige neuere Species von grossartigstem Habitus. 1 20  
 „ *Porteana* } 1 15
- Franciscea calycina Benth.** Dürfte von allen Francisceen die grössten Blumen haben. Blüht schon bei 1 Fuss Höhe reichlich . . . . . 1 —
- *confertiflora Pohl* var. fol. albo var. Schön panachirte Varietät . . . — 25



- Franciseea Lindeniana.** Die Blume dieser vor zwei Jahren aus Brasilien eingeführten Art sind gross u. von lebhafter Färbung. Blüht schon als junge Pflanze. . . . . 1 15
- Goodyera Veitchii.** Blätter dunkelsammetgrün, schöne Varietät, gewonnen durch Befruchtung von *Macodes marmorata* mit *Goodyera discolor* . . . 8 —
- Grias cauliflora.** Ornamentale Blattpflanze, im Handel selten . . . . . 10 —
- Grischowia hirta Karsten.** Prächtige Melastomatee, heimisch auf den 5—6000 Fuss hohen Gipfeln des westlich von Caracas sich hinziehenden Gebirges, welche im Sommer im Freien, im Winter im temperirten Hause cultivirt wird u. vom November bis Februar ihre Inflorescenz reichlich entfaltet, auch durch einen warmen Standort nach erfolgter Knospenbildung schneller zur Blüthe gebracht werden kann. Die Blumen sind von einem seltenen Carmoisinrosa mit lang hervorragenden goldgelben Staubgefässen u. von der Grösse eines Thaler oder grösser. Die Pflanzen blühen schon bei 1 Fuss Höhe. Die Belaubung ist von einem saftigen Grün, die Blätter 7fach genervt u. fein behnart. Höchst schätzenswerthe Acquisition. Wir liefern hiervon starke Pflanzen . . . . . 1 10
- Gymnogramme Wettenhalliana.** Hübsche Varietät von compactem Wuchse, das Ende der Wedel straussartig u. überall hellschwefelgelb bepudert . . . — 15
- Jambosa magnifica.** Myrtacee, die sich durch ihren grossartigen Habitus von allen andern Arten dieser Gattung wesentlich unterscheidet . . . . . 3 —
- Lamprococcus Laurentianus C. Koch.** Diese Aechmea empfiehlt sich durch lebhafte Färbung (schwarz, blau u. leuchtend roth), ihre Blüthenrispen u. leichtes, dankbares Blühen während der Wintermonate . . . 1 15
- Livistonia rotundifolia Mart.** Wir offeriren hier die echte *L. rotundifolia*, welche so häufig mit *L. olivaeformis* (*L. subglobosa*) verwechselt wird. Die vorstehende ist von sehr gedrunenem Bau, ihre fächerförm., dichtgetheilten Wedel sind zirkelrund, von glänzender Textur und werden von den mit kurzen breiten Dornen dicht besetzten Blattstielen fast horizontal getragen. Vierjährige, sehr schöne gesunde Pflanzen . . . . . 5 —
- Machaerium firmum Benth.** (*Nissolia firma* Arab.) Das Veilchenholz liefernd . . . . . 2 15
- Manettia micans.** Sehr hübsche rankende Species, Blätter glänzend dunkelgrün. Blumen gross, orangegelb. Von Peru . . . . . — 20
- Maranta striata.** Wunderhübsche Zwergart, deren verhältnissmässig breite Blätter lebhaft weiss u. grün panachirt sind. Erreicht nur eine Höhe von 5—6 Zoll . . . . . 3 —
- Meyenia Vogeliana.** Die Blumen dieser herrlichen Species, welche den Namen des unglücklichen Dr. Vogel trägt, sind sehr gross u. von glänzend bläulichem Purpurroth . . . . . — 20
- Miconia pulverulenta.** Blätter gross, lederartig, dunkelgrün mit einem reinweissen Mittelstreifen; die braunfilzige Unterseite zeichnet sich durch eine regelmässige, scharf hervortretende Nervatur aus . . . . . — 15
- Oreopanax dactylifolia** (Zwei Araliaceen, ausgezeichnet durch gran- { 3, 4 à 30 —  
 » *peltata* { diose, vielgliederige, höchst interessante ) . 2 à 3 —  
 Blattformen.
- § **Passiflora fulgens.** Eichenblättr. Species, Blumen leucht. hellroth . . . — 15
- Pandanophyllum humile Hassk.** Breitblättrige Cyperacee, deren Blätter in der Form denen von *Pandanus latissimus* ähnlich sind, natürlicherweise ohne die enorme Breite u. Länge der Blätter des letzteren zu erreichen. Ist die einzige bis jetzt bekannte Species einer neuen Gattung . . . . . 1 15
- Philodendron bi-pinnatifidum Schott.** Höchst interessante Species mit vielfach gegliederten grossen Blättern, welche bei einem Durchmesser von 1½—2 Fuss eine Länge von 2—3 Fuss erreichen. Die verkleinerte xylograph. Abbildung eines ausgebildeten Blattes, von welcher auf Verlangen noch Exemplare zu Diensten stehen, haben wir unserem vorjähr. Kataloge No. 34 beigelegt . . . . . 3 —

- Phoenicophorum** Sechellarum *Wendl.* (*Astrocaryum aureo pictum*, A. Borsigianum, *Stevensonia grandifolia* u. *St. Sechellarum*). Ausgezeichnet schöne Palme von den Sechellen. Die dunkelgrünen Wedel, welche eine bedeutende Grösse erlangen, sind mit dunkelorangeenen Punkten übersät u. die gleichfarbigen Blattstiele mit langen, nadelförmigen, schwarzen Dornen dicht besetzt . . . . . 10 à 50 —
- Phrynium** majesticum. Eine, namentlich durch die Grösse ihrer Blätter imponirende Species mit doppelliniger, rother Panachirung; man stelle sich *Maranta regalis* in vier- bis fünffacher Vergrösserung vor . . . . . 2 15
- Physurus** nobilis. Sehr feine, distincte Art mit Silbernetz; von Brasilien . . . . . 6 —
- Piper** maculosum. Blätter gross u. fleischig, weiss bemalt . . . . . — 20
- Rhapis** flabelliformis fol. albo var. Sehr distincte weiss panachirte Varietät dieser bekannten Palme. Aeusserst selten! . . . . . 20 à 80 —
- Rogiera** gratissima. Schöne Species einer neuen Gattung mit Blättern einer *Camellia*. Die Blumen in grosse Dolden vereinigt, sind zart blassrosa u. blühen fast den ganzen Winter über. Im temperirten Hause zu cultiviren . . . . . 2 —
- Selaginella** Martensii albo varieg. Sehr lebhaft u. breit schneeweiss panachirte Varietät . . . . . — 10
- Smilax** zeyl. macrophylla albo maculata. Die schönen weiss marmorirten grossen Blätter dieser Art erheben sie, die sonst nur officinellen Werth hätte, zu einem höchst zierenden Gewächs des Warmhauses . . . — 15
- Sphaerogyne** cinnamomea. Schöne Melastomatee, in Blattform u. Habitus *Sphaer. latifolia* u. *Cyanophyllum magnificum* sich nähernd. Einen besonderen Reiz gewährt der zimmetbraune, feinwollige Flaum, mit dem die Blätter u. Blattstiele bedeckt sind . . . . . 2 —
- Staurotheca** grandiflora. Die grossen Blumen himmelblau mit gelbem Schlunde . . . . . — 10
- Theophrasta** imperialis. Von dieser prachtvollsten Species können wir mit grossen, starken Exemplaren dienen, die eine Höhe von 4—6 Fuss haben u. mit 20—26 ihrer herrlichen 2—3 Fuss langen Blätter garnirt sind . . . . . 40 à 50 —
- Verschaffeltia** splendida *Wendl.* (*Regelia princeps*, *Stevensonia viridifolia*). Prachtige Palme, deren Vaterland ebenfalls die Sechellen sind. Die sehr breiten grandiosen Blattwedel sind von einem hellen, leuchtend grünen Colorit, die Blattstiele u. Scheiden bräunlichroth, mit dichten, schwarzbraunen, sehr feinen Dornen . . . . . 18 à 25 —

## Kalthaus und Freiland.

### Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

- Araucaria** Rulei. Neue, sehr schöne Species dieser herrlichen Gattung, von Neu-Caledonien. Wir liefern hiervon mehrjährig cultivirte,  $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen . . . . . 15 —
- Aubrietia** purpurea fol. albo var. Zierliche Belaubung, Blätter mit breitem rein weissen Rande . . . . . — 20
- Aucuba**. Neuere, in den Handel gekommene Arten und Spielarten. Die Varietäten dieser interessanten Gattung finden durch die ausserordentliche Verschiedenheit ihrer Blattform und ihres Colorits, sowie durch den Umstand immer mehr Liebhaber, dass in Folge der in neuerer Zeit stattgefundenen Einführung männlicher Arten eine Befruchtung der verschiedenen Arten sich sehr leicht bewerkstelligen lässt, wodurch die weiblichen Pflanzen einen neuen Reiz in dem Schmuck ihrer zahlreichen, blendend corallenrothen, grossen Fruchtblätter erhalten, auch eine Vermehrung und Vervielfältigung der Varietäten leicht und schnell bewirkt werden kann.



	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Aucuba himalayea foem.</b> . . . .	— 10	<b>A. jap. macrodendata</b> . . . . .	— —
„ „ <b>macrophylla foem.</b> . . . .	— 25	„ „ <b>maculata masc.</b> . . . . .	2 —
„ <b>japonica</b> (Typus) <b>A. viridis foem.</b> . . . .	— 10	„ „ <b>ovata masc.</b> . . . . .	1 15
„ „ „ „ „ <b>masc.</b> . . . .	— —	„ „ „ <b>aureo punctata</b> . . . . .	2 —
„ „ <b>angustifolia foem.</b> . . . .	— —	„ „ <b>picta foem.</b> = <b>fol. aur. marg.</b> . . . .	1 —
„ „ „ <b>maculata f.</b> . . . .	4 —	„ „ <b>pygmaea masc.</b> . . . . .	2 —
„ „ <b>arborea foem.</b> . . . .	4 —	„ „ <b>salicifolia</b> . . . . .	— —
„ „ <b>bicolor. masc.</b> . . . .	— 15	„ „ <b>sulphurea foem.</b> . . . .	— —
„ „ <b>in medio aureo picta m.</b> . . . .	2 —	Hiezu die alten Sorten:	
„ „ <b>limbata foem.</b> . . . .	3 —	„ „ <b>punctata (A. communis)</b>	
„ „ <b>longifolia foem.</b> . . . .	2 —	foem. . . . .	— 6
„ „ <b>aureo varieg. foem.</b> . . . .	4 —	„ „ „ <b>latimaculata foem.</b> . . . .	— 10
<b>Centaurea babylonica.</b> Pyramidenförmig wachsende Species, die eine Höhe von 7—8 Fuss erreicht, daher auf Rasenplätzen von grosser Wirkung ist. Die Blätter sind gross, lyra- u. wellenförmig und schön graugrün. Ihr Vaterland ist Palästina . . . . .			
			— 15
§ <b>Clematis Reginae.</b> Neue Hybride zwischen <i>Cl. aurea grandiflora</i> und <i>Cl. lanuginosa</i> . Die Blumen sind gross ( $4\frac{1}{2}$ —5 Zoll Durchmesser) und von dunkellila Colorit. Die untere Seite der Blumenbl. ist fein behaart			
			2 —
— <b>Jackmanii.</b> Blumen gross und blau . . . . .			
			— 20
— <b>rubro-violacea.</b> Blumen violetroth . . . . .			
			— 20
<b>Cordylone indivisa vera (Drac. aureo-lineata).</b> Obgleich schon seit einigen Jahren eingeführt, ist diese schönste aller Dracaenen immer selten. Wir liefern davon schöne, starke u. gesunde Pflanzen . . . . .			
			5 à 15 —
<b>Cupressus Lawsoniana</b> var. <i>argenteo glaucescens</i> . Eine unter unsern Aussaaten gefundene Varietät von grosser Schönheit, deren Tracht schimmernd weisslich blaugrün ist. Auch sind die Blätter feiner u. zierlicher, als bei der Species . . . . .			
			1 à 2 —
<b>Hydrangea jap. rosalba Hort.</b> Die Blumen dieser jap. Spielart sind, wenn sie auf naturgemässe Weise cultivirt wird, lebhaft carminrosa. Wird die Pflanze jedoch im Winter forcirt, so ist ihre Inflorescens schneeweiss. Dieser Umstand gab anfangs zu der Meinung Anlass, dass es zwei verschiedene Varietäten seien. (Abbild. im vorjähr. Februarhefte d. Flora.)			
			— 8
— <b>jap. var. macrosepala Rgl.</b> Vorstehender Form nahe, werden die Sepalen der sterilen Blumen aber bis $1\frac{1}{3}$ Zoll breit. Bei der Cultur im Freien färben sich die sonst weissen Blumen carminrosa . . . . .			
			1 —
— <b>jap. var. coerulescens Rgl.</b> (Hydr. <i>Impératrice Eugénie Hort.</i> ) Sterile Blumen weiss u. blassrosa, fruchtbare Blumen schön himmelblau . . . .			
			— 20
— <b>jap. plena Rgl.</b> Diese gefüllte Varietät hat viel Aehnlichkeit mit der bekannten Hydr. <i>Hortensia D. C.</i> u. bildet den Uebergang zu dieser, deren Stammthum ebenfalls <i>Hydrangea japonica</i> ist. Die einzelnen Blumen der vorstehenden gefüllten Abart sind jedoch weit grösser, als die von Hydr. <i>Hortensia</i> . . . . .			
			— 8
<b>Iris cristata Sieb.</b> u. <b>Iris Kaempferii Sieb.</b> Beide japanische Species à			
			— 10
<b>Linum Macraei.</b> Sehr schöne neue u. reichblühende Species von Chili, mit grossen Blumen von dunkelorange-rothem Colorit . . . . .			
			— 15
<b>Macleya cordata R. Br.</b> var. <i>Yokuhama v. Sieb.</i> ( <i>Bocconia jap. Bouché</i> ). Eine Pflanze von grossartigen Dimensionen. Sie erreicht unter günstigen Verhältnissen eine Höhe von 8 Fuss, bei verhältnissmässiger Breite. Die Blätter, welche eine Breite und Länge von $1\frac{1}{2}$ Fuss erreichen, sind stumpf herzförmig, tief gebuchtet, dunkelgrün, die Rückseite grau, auf 1 Fuss langen Blattstielen stehend.			
Die ganze Pflanze ist mit einem blaugrauen Reif bedeckt. Eine noble Decorationspflanze, zur Einpflanzung auf Rasen . . . . .			
			15 Gr. à 1 —
<b>Myosotis Kaiserin Elisabeth.</b> Unbezweifelt das schönste, reichblühendste Vergissmeinnicht, welches bis jetzt existirt . . . . .			
			— 10

- Pardanthus chinensis Ker.** (*Moraea chinensis Thumb.*) Iridee mit breiten schwertförmigen Blättern, welche sich fächerförmig ausbreiten, und getiegeten, äusserst wohlriechenden Blumen. Durch mässiges Antreiben kann man sie schon im Monat Februar und März zur Blüthe bringen. Schöne, ganz harte Zimmerpflanze . . . . . — 5
- Retinispora obtusa aureo variegata.** Eine der schönsten, bunten Coniferen. Die jungen Triebe u. Zweige sind leuchtend gelb u. schattiren sich, wenn sie älter werden, in rahmweiss ab, so dass immer zweierlei Colorit sichtbar ist. Von Japan . . . . . 1 20
- Tricyrtis hirta var. nigra.** Blumen lila mit schwarzen Flecken . . . . . — 20
- Xylosteum Phylomele Sieb.** Neue von Japan eingeführte *Lonicera*, compacten Wuchses und von frühzeitiger Vegetation. Die in ausserordentlicher Menge erscheinenden, für die Gattung grossen Blumen sind sehr lebhaft dunkelroth u. von schönem Effect . . . . . — 20
- Zea japonica. fol. var. (Benary).** Breitblättriger bunter Mais . . . . . — 5
- Zea Caragua fol. var. (Krüger).** Schmalblättriger bunter Mais . . . . . — 5

## Blumistische Neuheiten.

Nouveautés en plantes de Fleuristes.

### Neueste Camellia's,

Abgebbar in gutbewurzelten, kräftigen Herbstveredelungen. (Livrables en jeunes greffes d'automne.)

425. **Archiduc Etienne (A. Versch.).** Colorit rosa fleischfarben von musterhaftem Bau . . . . . — 20
426. **Comtesse Pasolini (Antonelli).** Von eigenthümlich röthlich-rosa Colorit, nach dem Rande zu fast weiss; von nicht ganz regelmässig imbricirtem Bau . . . . . — 10
427. **Dionysia Poniatowski (Comte Boutourlin).** Von vollendet imbricirtem Bau, gross, weiss mit einem leichten Anhauch von zartrosa, zuweilen mit einigen carminrothen Streifen. Sehr schön! . . . . . — 20
423. **Giardino Schmitz (Schm.).** Von regelmässigem Bau, zartrosa, in der Mitte u. an den Rändern lebhafter gefärbt . . . . . — 15
428. **Isabella Orsini (Franchetti).** Frischrosa, im Centrum röthlich, von gutem Bau mit sehr grossen breiten Petalen . . . . . — 20
268. **Mistriss Dombraïn (J. van Eeckhaute).** Vollendet imbricirter Bau in schönem zartrosa Colorit . . . . . — 20
308. **Planipetala.** Sehr grosse, flach u. regelmässig imbricirte Blume, weiss mit gelblicher Schattirung . . . . . — 20
429. **Roma Risorta (Del Grande).** Blume sehr gross von prächtigem Centifolienbau mit sehr breiten ovalen Petalen, leuchtend rosa und mit carmoisin gestreift, gespritzt und gestrichelt. Eine der schönsten neuen Camellien . . . . . — 20
430. **Camellia jap. elegant. picta.** Sehr schöne neue buntblättrige Varietät, von Hrn. von Siebold kürzlich aus Japan eingeführt . . . . . 1 —

Die ebenfalls noch neuen buntblättr. Camelliensorten *C. jap. argenteo var.*, *C. myrtifol. luteo var.* u. *C. Sasanqua albo var.* beliebe man unter der Rubrik »buntblättrige Pflanzen« nachzusehen.





1. Fata Morgana. 2. Madame Rambousek. 3. Custozza, 4. Vice-Admiral v. Tegetthoff.  
5. Graf C. v. Sternberg. 6. Mr. Laurentius.





## Neueste Chrysanthemum.

### Zwergsorten oder Lilliputen.

*Durch Hybridisation gewonnen von Lebois in Toulouse und in den Handel gebracht von A. Verschaffelt.*

- 150. **Donna Carmen.** Pompon-Sorte. Fast rein weiss, nur wenig hellgelb schattirt.
- 153. **Soliman.** Miniatur-Pompon. Ziegelroth mit goldgelben Rändern. Vom schönsten Dachziegelbau.
- 148. **Aminda.** In Färbung und Bau der vorstehenden Sorte ähnlich, jedoch von weit grösserer Blume.
- 149. **Damiette.** Hellviolet, dunkler nuancirt, nach der Mitte zu weiss. Pompon.
- 154. **Telitz.** Lila roth mit ponceau schattirt, Ränder und Mitte gelb. Pompon von röhrenförmigem Bau.
- 151. **Lucinde.** Blumen halb gelb, halb weiss, zuweilen auch ganz weiss. Pompon von lockerem Bau.
- 152. **Rosabella.** Mittलगrosse Blume (2 Zoll im Durchmesser) von regelmässigem imbriquirten Bau mit breiten Petalen. Zart lila, der mittlere Theil der Blume weiss.

Die Sorte 12 Gr. — Die Collection 2 Thlr. 10 Gr.

## Neueste Fuchsien. — Fuchsia's nouveaux.

### Collection Twrday.

*Man vergleiche die beigegeführten Abbildungen. Voyez les figures ci-ajoutées.*

- 173. **Custoza.** Blume erster Grösse, Sepalen kronenartig zurückgerollt; Corolle enorm, ungemein gefüllt, weiss, roth geadert und getuscht. Die grösste und gefüllteste der weisscorolligen. (Fleur de première grandeur, sépales relevées en forme de couronne larges et d'un rouge cramoisi brillant; corolle enorme, extrêmement double blanche, veiné et teinté de rouge. La plus grande et la plus double de toutes les variétés à corolles blanches.)
- 174. **Fata Morgana.** Kelch und Sepalen glänzend dunkel carmin, letztere ganz zurückgeschlagen; Corolle dicht gefüllt, weiss mit rosa getuscht, breit hochroth geflammt und fast bis zum Rande bandirt, die Ausschnitte der Petalen violet gezeichnet. (Tube et les sépales d'un carmin foncé brillant, les dernières tout réfléchis; corolle très pleine blanche teinté de rose, flammé de rouge clair et rubanée presque jusqu'au bord des pétales; les coupes des pétales sont marqués et maculés de violet.)
- 175. **Graf C. v. Sternberg.** Sepalen breit und zurückgebogen, leuchtend scharlach; Corolle breit und sehr gefüllt, leuchtend hellblau, sehr reichblühend. (Sépales larges et relevées, écarlate brillant, corolle large, très pleine d'un bleu clair luisant, très florifère.)
- 178. **H. Laurentius.** Eine Neuheit von ausserordentlicher Schönheit und ohne Zweifel die grösste aller Fuchsien. Kelch und die breiten Sepalen von glänzendstem Scharlachroth; Corolle rein himmelblau, mit weisslichem Reflex, sehr gross und sehr gefüllt. (Nouveauté d'une grandeur extraordinaire, sans doute la plus grande Fuchsia jusqu'à ce jour connue. Tube et les larges sépales d'un écarlate brillant; corolle d'un bleu clair celeste aux reflets blanchâtres, très grande et très pleine.)
- 176. **Madame Rambousek.** Grosse Blume, Sepalen vollkommen zurückgebogen; Corolle sehr regelmässig gefüllt, schneeweiss. (Fleur très grande, sépales parfaitement relevées, corolle très pleine, d'une forme régulière et blanche de neige.)
- 177. **Vice-Admiral v. Tegetthoff.** Sepalen leuchtend scharlach lang und horizontal; Corolle sehr gross und sehr gefüllt, weiss mit rosalila Hauch, dunkelcarmoisin geadert und getuscht, ganz neues Colorit. (Sépales écar-

lates, longues et horizontalement relevées; corolle très grande et très pleine blanche teinté de rose lilacé, veiné et ombré de eramoisi foncé, colorit nouveau.)

*Abgebar vom 15. März an, die Sorte 25 Gr. (mit Ausnahme von Nr. 178, welche 1 Thlr. 10 Gr. kostet) und die Collection 5 Thlr., — und vom 15. Juni an die Sorte 20 Gr. und die Collection 3 Thlr.*

*Livrables à partir du 15. Mars chaque variété 25 Gr. (à l'exception du numéro 178, qui est coté 1 Thlr. 10 Gr.) et la collection 5 Thlr., — et à partir du 15. Juin la pièce 20 Gr. et la collection 3 Thlr.*

## Neueste Sorte. — Dernière Nouveauté.

Fuchsie mit zwei Corollen. — Fuchsia à deux corolles.



**Freund J. Dürr.** (*Lange et E.*) Eine der interessantesten und durch ihre Form auffallendsten Fuchsien, die bisher gezogen wurden. Die Blumen repräsentiren nämlich die gefüllte wie die einfache Corollenform zu gleicher Zeit, indem vier der Staubfäden der ersteren sich so ausserordentlich kräftig entwickeln, dass sie auf ihren langen, die gefüllte Blumenkrone weit überragenden Filamenten vier ziemlich grosse zusammenhängende Petalen darstellen, welche eine zweite Corolle von einfacher Form bilden. Die Verwandlung der Antheren in blumenblattähnliche Producte ist zwar nichts Neues bei diesem Genre; jedoch giebt es noch keine Fuchsie, bei welcher die bezeichnete prolifirende Kraft in solcher Grösse und regelmässigen Form sich gezeigt hätte, als in dieser neuen Varietät.

Sepalen ziemlich breit, abstehend, an der Spitze zurückgebogen, hell-scharlachroth; Corolle stark gefüllt mit grossen breiten Petalen, auffallend lang, von tiefblauer Farbe und carmin fein geadert; die durch die Antheren gebildete zweite einfache Corolle ist von purpurblauem Colorit und mit lebhaft carminrothen Adern durch-



zogen, von starker Textur und die gefüllte Corolle weit überragend. Vorzüge dieser schönen Fuchsie sind ausserdem höchst kräftiges Wachsthum und ausserordentlich reiches Blühen.


Diese auffallende Varietät wurde von den Herren Lange und Espenhahn in Eutritzsch, höchst geschickten und eifrigen Fuchsienzüchtern, vor zwei Jahren aus Samen gewonnen und die ganze Auflage von uns acquirirt. *Preis 2 Thaler.*

(Variété des plus intéressantes par sa forme marquante. Les fleurs présentent en même temps deux corolles — une corolle pleine et une corolle simple — quatre des étamines de la fleur se développant si vigoureusement qu'ils portent sur leurs longs filaments des produits larges semblables à des pétales d'une texture ferme et ainsi formant une deuxième corolle. Quoique la prolifération des étamines se montre souvent dans ce genre, nulle variété en a représentée jusqu'à ce jour cette forme prolifère aussi constante, aussi solide et aussi large que dans celle-ci que nous offrons aujourd'hui aux amateurs de ce beau genre.

Fleurs grandes et très longues (7 à 8 centim.), sépales larges et relevés et d'un rouge écarlate clair; la première corolle très longue et très pleine aux pétales amples est d'un bleu foncé finement strié de carmin; la deuxième corolle qui dépasse beaucoup la première et se constituant de quatre pétales assez larges, est d'un bleu pourpré et veiné fortement de rouge carminé très vive. En outre cette Fuchsia est très florifère et d'une croissance très vigoureuse.

Cette variété hors ligne a été gagnée par suite des hybridations soigneuses, il-y-a deux ans, par M. M. Lange und Espenhahn, semeurs et cultivateurs de Fuchsias très habiles. En ayant acquis toute l'édition, je la mettrai au commerce dès le 15 Mars en belles boutures vigoureuses

au prix de fr. 7 50 c. la pièce.



## Neueste Georginen,

abgebbar vom 15. April an in jungen, kräftigen und gutbewurzelten Pflanzen.

### Dahlias nouveaux,

mises au commerce pour la première fois, et livrables en jeunes plantes vigoureuses dès le 15 Avril.

#### a. Grossblumige (à grandes fleurs).

104. **Amateur Rosé (Bruant).** Orangeroth mit goldgelben Spitzen, Bl. sehr gross, von gutem Bau u. schöner Haltung. (Écarlate orange pointé d'or, très grande et de forme parfaite. La pl. s'élève peu.)
97. **General von Moltke (Deegen).** Schwarzbraun mit hellpurpur Rändern, ähnlich, aber lebhafter als »Wacht am Rhein«. (Marron noir marginée rose pourprée; fleur magnifique, de forme parfaite. Haute 3 pieds 3 pouces.)
98. **Graf von Bismarck (Deegen).** Goldfarben mit carmoisin-scharlach reich überflammt, Leuchtende Blume von edelstem Bau u. reichblühend, (Comte de Bismarck. Fond doré richement flammé cramoisi écarlate. Fleur luisante d'une forme noble. Haut 5 pieds 4 p.)
99. **Hans Andersen (Deegen).** Ocher mit rosa geflammt oder rosa Ränder mit weissen Spitzen. Kugelrunder Bau. Blume mittelgross. (Ocre flammé rose ou rose marginé pointé blanc, fleur d'un grandeur moyenne de forme parfaite globuleuse. Haut 3 pieds.)
100. **Heinrich Heine (D.).** Goldorange mit zinnoberroth übertuscht u. geflammt; reichgefüllte fast runde Blume. (Orange ombré et flammé cinabre; forte fleur richement pleine globuleuse. 4 pieds.)
101. **Ludwig Börne (D.).** Licht mennigroth, nach innen blasser, Blume hochgewölbt u. fast kugelrund. (Minium clair à l'intérieur plus pâle; forte fleur bombée. Haut 5 p. 3 p.)

105. **Mad. Ed. André** (*Bruant*). Schneeweiss. Blume sehr gross, von tadelloser Form u. Haltung. (Blanc de neige, fl. très grande, de forme et tenue irréprochable. La plante s'élève peu.)
69. **Mattilda Poggio** (*Cavagnini*). Hellgelber Grund mit weissen Spitzen, stark ziegelroth gestrichelt u. gestreift, zuweilen auch ziegelroth mit graurosa Spitzen. Von musterhaftem regelmässigen Bau. (Fond jaune clair pointé blanc, fortement rubané et strié couleur de brique, quelquefois rouge de brique pointé rose pâle. Haut 4 pieds.)
103. **Rosalba** (*D.*) Rein weiss in grossen Blumen u. schöner Rosenform. (Blanc pur fleur grande en forme de rose. Haute 3 pieds 4 pouces.)
- Die Sorte à 1 Thaler. — 6 Sorten nach unserer Wahl 4 Thaler. Chaque variété au choix à 1 Thaler. — 6 variétés à notre choix 4 Thaler.

### b. Zwerg-Georginen und Lilliputen.

(*Dahlias nains et Lilliputiens*. — *Dwarf Dahlias and Lilliputs*.)

Die Varietäten dieser so beliebt gewordenen Unterabtheilung der Georginen blühen grösstentheils schon bei einer Höhe von 1 Fuss, sind sehr compacten Wuchses u. vielblumig. Dieser Eigenschaften wegen eignen sie sich ganz vorzüglich zu kleinen Gruppen, zu Einfassungen grosser Georginengruppen, sowie besonders auch zur Topfcultur. Die Blumen dieser Section sind von sehr lebhaftem Colorit und, entgegengesetzt den Lilliputen, ziemlich gross, auch von regelmässigem guten Bau.

Die nachstehenden neuen Sorten sind die besten, die man bisher hiervon durch künstliche Befruchtung erzeugt hat.

Thlr. Gr.

229. **Alona** (*Deegen*). Purpurbraun mit blassrosa Spitzen; reichblühender Lilliput. (Marron pourpré pointé rose pâle, Lilliputien très multi-flore. Haut 2 pieds 2 pouces.) . . . . . 1 —
235. **Fürst der Zwerge** (*Sieckm.*). Hellweinroth mit chokoladenbraun gefleckt, Rückseite lilarosa. Neue Färbung; Blume gross in Muschelrosenform. (Prince des Nains. Prince of the Dwarfs. Rouge vineux clair maculé chocolate à révers lila-rose. Coloris nouveau. Fleur grande en forme de rose moule. Haut 1½ pieds.) . . . . . 1 —
228. **Gem of the Dwarfs** (*Bull.*). Carmoisinroth mit weissen Spitzen, schönem Bau. (Cramoisi pointé blanc, de forme parfaite. Haut 1½ pieds.) . . . . . — 10
230. **Gustav Vaëz** (*Deegen*). Safranorange, leuchtende Färbung in grosser Blume u. schöner Rosenform, den niedrigen Strauch überragend. (Orange safrané, grande fleur luisante en forme de rose. Haut 1 pied 10 pouces.) . . . . . 1 —
238. **Mathias Claudius** (*D.*). Licht purpur, oft mit weissen Spitzen, leuchtende, gewölbte Blume, den Strauch überragend. (Pourpre claire, souvent pointé blanc; forte fleur luisante bombée s'élevant au dessus de l'arbuste. Haut 2 pieds 9 pouces.) . . . . . 1 —
236. **M. Neven** (*S.*). Hellschwefelgelb, sehr constant, Zellenform. (Couleur de soufre clair, très constante et en belle forme cellulaire. Haut 1 pied.) . . . . . 1 —
223. **Moonbeam**. Lila-rosa, nach der Mitte lichter. Blume mittelgross u. voll. (Rose-lilacé à l'intérieur plus clair, fleur d'une grandeur moyenne. Haute 1 pied 8 pouces.) . . . . . — 15
257. **Neue Perle** (*S.*). Rein weiss. Muschelrosenform. Ersatz für Mardner's Perle. (Perle nouvelle. New Pearl. Blanc pur, forme de rose moule. Perfectionnement de la Perle de Mardner. (Haute 2½ pieds.) . . . . . 1 —
224. **Pipin** (*M.*) Lila. (Couleur lila. Haute 1½ pieds.) . . . . . — 10
231. **Prachtröschen** (*D.*). Weiss mit blutrothen Rändern, bunt u. beständig von guter Form u. Stellung. (Petite Rose magnifique. Blanc marginé rouge de sang, de couleurs vives et constantes; Lilliputien brillant. Haute 2 pieds 2 p.) . . . . . 1 —



227. **Princess Alice** (*Mardner*). Neue Zwergsorte, von kräftigem Wachsthum u. reich blühend, welche überhaupt alle Eigenschaften einer Dahlia ersten Ranges besitzt. Die Blume ist prächtig purpurrosa u. von sehr schönem Bau. Stammt von der bekannten Zwergdahlia »Perle«, ist jedoch vielblumiger als diese. Da Gebr. Mardner eine Knolle dieser Dahlia zu dem hohen Preise von 8 Thlr. berechnet haben, so können wir diese Neuheit nicht anders als zu dem beigefügten Preise ablassen. (Rose pourprée magnifique et de forme parfaite. Variété de premier rang, très florifère vigoureuse. Haute 2 pieds. M. Mardner ayant coté un tubercule de cette Dahlia au prix haute de 30 francs, nous ne pouvons fournir une plante d'autrement qu'au prix de . . . 2 —
225. **Prinz Eugen** (*M.*). Dunkelkastanienbraun. (Marron foncé unicolor. Haut 2 pieds.) . . . — 10
232. **Röschen von Köstritz** (*D.*). Ocher mit carmoisin umranderten Spitzen in schöner Rosenform. Reich blühender Lilliput. (Petite Rose de Köstritz. Ocre marginé et pointé cramoisi en belle forme de rose. Lilliputienne très florifère. Haute 2 pieds 8 p.) . . . 1 —
220. **Sambo** (*Hend.*). Dunkelbraun, mittelgrosse Blume von gutem Bau. Contrastirt gut mit den Zwerggeorginen Alba floribunda nana und Perle. (Marron foncé, fl. de grandeur moyenne, contrastant bien à la D. alba floribunda nana et Perle. Haute 2 pieds.) . . . — 15
221. **Scarlet Tom Thumb** (*Hend.*). Eine der zwergigsten Sorten, nur 12—15 Zoll hoch werdend. Blume gut gefüllt u. dunkelscharlach. Contrastirt gut mit dem schwarzbraunen Tom Thumb. (Ecarlate foncé, contrastant bien au Tom Thumb noir. Une des plus petites variétés. Haute 12—15 pouces.) . . . — 15
222. **Tarantelle** (*Hend.*). Lebhaft scharlachroth, gut gefüllt, kugelförmig. Schön zu Gruppen u. Einfassungen. (Ecarlate brillant, de forme globuleuse étant propre particulièrement aux bordures.) . . . — 15
234. **Zinnoberprinz** (*S.*). Leuchtend hell zinnober, noch leuchtender als Glühwürmchen. (Prince Cinabre. Ecarlate clair éclatant. Lilliputien de belle forme. Haute 2 pieds.) . . . 1 —
226. **Zwergkönigin** (*M.*). Violet mit weissen Spitzen. (Reine des Nains. Queen of the Dwarfs. Couleur violet pointé blanc. Haute 1½ à 2 pieds.) . . . — 15
- Diese ganze Collection von 18 Sorten für Thlr. 12. — Toute cette collection de 18 variétés pour 12 Thalers.

## Geranium zonale.

*Neue Auswahl. — Dernières Nouveautés.*

197. **Couronne des Massifs** (*Bruant.*). Blume u. Dolden mittelgross, leuchtend orangeroth mit grossem weissen Auge. Sehr reich blühende, gedrungen sich bauende u. zwergige Sorte, weshalb sie sich ganz besonders zu Einfassungen eignet . . . — 20
198. **Mad. Guérinière** (*Bruant.*). Dolden u. Blumen sehr gross u. vom reinsten Weiss. Blüht ausserordentlich reichlich den ganzen Sommer über im Lande u. zeichnet sich durch die Reinheit der Farbe vor allen andern weissblühenden Geranien aus . . . — 20

## Neue Geranium zonale

von Twrdy.

192. **Doctor Giskra.** Feurigstes Dunkelscharlach, sammetartig, mit weissem Centrum. (Écarlate foncé brillant à centre blanc; belle forme.)
193. **Feuer von Lissa.** Bl. sehr gross, vollk. rund, leuchtend carminscharlach, in kolossalen Dolden. Diese Sorte ist als Gruppenpflanze, wie zur Topfcultur ausgezeichnet u. wird so leicht nicht übertroffen werden. (Feu de Lissa. Fl. très grande, de forme parfaite, écarlate carminé brillant et velouté, ombelles énormes. Cette variété surpasse par l'effet qu'il produit toutes les autres, et sera pour massifs comme pour la culture en pots sans pareil.)
194. **Goethe.** Sehr grosse, vollk. runde Blume, glänzend lachsrosa, orange getuscht mit weissem Centrum u. reichblühend. (Fl. très grande, parfait runde, rose saumon vif ombré orange à centre blanc. Très beau et florifère.)
195. **Leonidas.** Runde feurig orange Blume mit grossem weissen Auge; sehr vielblumig. (Fleur runde, orange feu à large oeil blanc, très florifère.)
196. **Rosenball.** Zartes reines Rosa mit weissen Flecken auf den oberen Petalen. Dolden ausserordentlich gross. (Rose clair tendre, les pétales supérieurs maculés blanc; bouquets énormes.)

Die Sorte 25 Gr.

Die Collection 3 Thlr. 10 Gr. — Les 5 variétés ensemble Thlr. 3. 10 Gr.

## Neueste Pelargonium.

Thlr. Gr.

310. **Acidalie.** (*H. Demay.*) Blass lila, dunkler geadert, Centrum und Saum weiss, obere Petalen schwarzbraun gefleckt. Diadematum. — 20
259. **Adonis.** (*H. D.*) Obere Petalen dunkel chocoladebraun mit schwarzem Reflex und feinem purpurnen Saum; untere Petalen dunkelrosa, purpur gefleckt, marmorirt und geadert. Engl. grossblum. . . . . — 20
254. **Alexandre de Castro-Pereire.** (*Bouch.*) Obere Petalen kohlschwarz, ponceaurosa gesäumt; untere Petalen pfirsich-rosa, purpur geadert und gefleckt. Engl. grossbl. . . . . — 25
312. **Brillant.** (*H. D.*) Feurig scharlach, Centrum helllila, jedes Blumenblatt an der Basis braun geadert. Diad. . . . . — 25
262. **Espérance.** (*H. D.*) Hell orange-rosa mit zinnober Reflex, die fünf Petalen leicht gefleckt, die oberen stärker. Centrum weiss. Odier oder fünffleckig. . . . . — 25
294. **Fénélon.** (*H. D.*) Obere Petalen kastanienbraun, carmoisin gesäumt; untere Petalen leuchtend carmoisin, lila-rosa gesäumt, kastanienbraun gefleckt und geadert. Odier. . . . . — 20
263. **Figaro.** (*H. D.*) Rosa-carmin verwaschen und purpur geadert, mit grossen schwarzpurpur Flecken, die ganze Blume zart fleischfarben gesäumt. Engl. grossbl. . . . . — 20
322. **Gloire de Monplaisir.** (*Alég.*) Obere Petalen dunkel rosa-carmin und purpur marmorirt, schwarz belegt; untere Petalen fleischrosa, carmin gefleckt. Blätter stark duftend. Engl. grossbl. . . . . — 25
255. **H. Laurentius.** (*Boucharlat.*) Obere Petalen carmoisin mit bläulichem Schein, schwarz belegt; untere Petalen carminrosa, schwarz gefleckt, Centrum weiss, braun geadert. Odier. . . . . — 25
264. **Illustration.** (*H. D.*) Carminrosa, stark purpur geadert, jedes Blumenblatt schwarzbraun belegt und rosa umsäumt. Engl. grossbl. — 20
320. **La ville de Caën.** (*Errard.*) Obere Petalen feurig carmoisin, fast zwei Drittel der Petalen schwarz belegt und geadert; untere Petalen leuchtend carmin mit schönen runden schwarzbraunen Flecken und



- dunkleren Adern, im Centrum rosa. Blumenblatt gewellt. Um die Blume herum geht ein  $\frac{1}{8}$  Zoll breiter schneeweisser Saum. 6 bis 8 Petalen. Grosse Dolden. Sehr kräftiger Wuchs. Odier. **Extra!** . . . . . 2 —
257. **Leonie Desvial.** Obere Petalen violet, schwarzpurpur gefleckt; untere Petalen violet-rosa, carmin geädert. Odier. . . . . — 20
256. **Les Lys.** (*Bouch.*) Die ganze Blume atlasweiss, obere Petalen leicht violet gefleckt. Engl. grossbl. . . . . — 25
265. **Lucifer.** (*H. D.*) Kastanienbraun, jedes Blumenblatt schwarz belegt. Centrum bläulich, rosa geflammt; sehr gute Blume. Engl. grossbl. — 25
258. **M. Wood.** (*B.*) Weiss, rosa angehaucht, obere Petalen carmin und rosa bemalt, kastanienbraun gefleckt und geädert; untere Petalen carmin gefleckt, leicht rosa bemalt. Odier. . . . . — 20
300. **Omphale.** (*H. D.*) Rein weiss mit fünf violetbraunen Flecken. Odier. . . . . — 25
267. **Séduction.** (*H. D.*) Cochenilleroth mit bläulichem Anflug, obere Petalen schwarz gefleckt. Saum und Centrum weiss. Engl. grossbl. — 25

### Fancy P.

269. **Ceres.** (*H. D.*) Obere Petalen carmoisin mit bläulichem Schein; untere Petalen lebhaft rosa, geädert und verwaschen. Saum und Centrum weiss. . . . . — 20
321. **Lady Victoria Kerr.** (*Carstair.*) Rein weiss und gefüllt. Das einzige gefüllte Pelargonium\*) und von regelmässigem, schönem runden Bau der Petalen, **extra!** . . . . . 3 —
271. **Niobe.** (*H. D.*) Trüb weinroth, Centrum und Saum weiss. . . . . — 20

## Interessante Neuheit! — Dernière Nouveauté.

### Grossblumiges remontirendes Pelargonium

mit fünf Flecken (*Odier*).

335. **Eléonore Petit.** (*Petit.*) Pflanze von gewöhnlicher Vegetation, sich sehr gut verästelnd; Blume gross, von schönem runden Bau, dunkel kirschroth mit Purpurschimmer, die fünf Petalen schwarzbraun gefleckt, die ganze Blume von sehr feurigem Colorit.

Diese auffallende Pelargonie übertrifft in jeder Beziehung das bekannte Pel. »Gloire de Paris« und wird in der Gartenwelt eine grosse Rolle spielen, nicht blos bezüglich der Topfcultur, sondern auch, bei Anlegung von Freilandgruppen, als Concurrent der Geranium zonale, weil es wie diese bis zum Eintritt des Frostes ununterbrochen blüht.

Es wurde 1864 von Herrn F. Petit, einem Privatgärtner in der Nähe von Paris, aus Samen gewonnen, erhielt im Juni desselben Jahres von der kaiserlichen Gartenbaugesellschaft zu Paris bei Gelegenheit einer Sitzung derselben eine Prämie erster Classe und wurde im August 1866 von den Preisrichtern der im Bois de Boulogne stattgefundenen Ausstellung mit einer grossen silbernen Medaille gekrönt. . . . .

1 15

\*) Die gefüllten Geranium zonale gehören einer anderen Abtheilung an.

# Remontant-Nelken.

Oeillets perpétuels.

## a. Neue Sorten.

### I.

57. **Coquelicot.** (*Alég.*) Besonders schön leuchtend roth, Zwergsorte von kräftigem Wuchse und vielblumig.
58. **Enfant de Lyon.** (*Bouch. jeune.*) Feuerroth. Zwergsorte.
59. **Francesco Liverani.** (*A.*) Ponceau, carmoisinroth gestreift und gebändert.
60. **Henri Beurrier.** (*A.*) Scharlach, Petalen rund.
61. **Mad. Gauthier.** (*A.*) Lachsfarbig mit breitem rothen Rande.
62. **Rose et Blanche.** (*A.*) Rein weiss mit rosa Staubfäden, reizende, immerwährend blühende Zwergsorte.
63. **Surpasse Atim.** (*A.*) Blassrosa, hellroth gestreift und gebändert.  
Jede Sorte 15 Sgr.

### II.

#### **Dianthus siderocaulis. — Eisenstielige Zwergsorten.**

Von dieser neuen Abtheilung sind die drei nachstehenden Hybriden die ersten Gewinne, welche erzeugt wurden. Sie unterscheiden sich dadurch von allen anderen Nelken, dass die Blumenstiele jederzeit fest und aufrecht stehen, jeder Witterung trotzen und selbst, wenn die Blumen bei anhaltendem Regen mit Wasser überbürdet sind, dennoch ihre feste verticale Richtung behalten.

Die Pflanzen dieser neuen Abtheilung sind von kräftigem Habitus und bilden einen compacten Strauch, welcher von zahlreichen Blumenstielen mit dicken kurzen, runden Knospen überragt wird. Sie blühen fast ununterbrochen. Thlr. Gr.

101. **Charles Darwin.** (*Alég.*) Dunkelpurpurroth . . . . . — 25
102. **Jean Sisley.** (*A.*) Scharlachroth, sehr compact und vielblumig . . — 20
103. **William Bull.** (*A.*) Lebhaft hellponceau, carmoisin gestreift. Die Pflanze wird ein wenig höher als die vorstehenden. Derselbe Typus, prächtig! . . . . . 1 —

Unsere Auswahl guter älterer Sorten von Remontant-Nelken, worunter sich viele neuere Sorten befinden, beliebe man in der nächsten Abtheilung des Katalogs nachzusehen.

# Neueste Rosen für 1867.

(Auswahl.)

Abgebbar vom 1. April an.

Auf zwei bis dreijährige, in Töpfen gezogene und stark bewurzelte Wildlinge niedrig veredelt.

Originalpflanzen der Züchter dieser Neuheiten liefern wir ebenfalls zu den dabei in Franken bemerkten Originalpreisen.

## Remontant-Rosen.

1067. **Adrien Marx.** (*Granger.*) Blume sehr gross ( $3\frac{1}{2}$  bis 5 Zoll im Durchmesser), stark gefüllt und von gutem Bau; Colorit leuchtend kirschroth, Blumenstiele sehr kräftig. Frs. 25 . . . . . — 25
1064. **Charles Verdier.** (*Guillot père.*) Blume sehr gross, stark gefüllt, von gutem Bau, schön rosa mit weisslichen Randpetalen. Sprössling der Rose V. Verdier. Frs. 25 . . . . . — 25



1069. **Claire Renard.** (*Oger.*) Blume gross, voll, becherförmig, sehr lebhaft rosa. Frs. 15 . . . . . — 20
1053. **Euryanthe.** (*Peters.*) Blume gross, fast voll, kugelförmig und von guter Haltung, dunkelroth, sammetig schwarz belegt, im Verblühen blau-violet. Ebenso schönes als seltenes Colorit. Thlr. 4 . . . . . — 20
1059. **François Treyve.** (*Liabaud.*) Blume gross, voll, Centifolienbau, brillant dunkel scharlachroth, von neuem Colorit. Frs. 25 . . . . . — 25
1065. **Mad. Bellenden Kerr.** (*Guill. p.*) Vielblumige Sorte vom reinsten Weiss. Frs. 15 . . . . . — 20
1075. **Mad. la Comtesse de Morges.** (*Pernet.*) Auf kräftigem aufrechten Blumenstiel lebhaft rothe Blume, jedes Petalum in der Mitte weiss schmal gestreift. Frs. 25 . . . . . — 25
1068. **Mad. Martin Debessé.** (*Granger.*) Blume gross, voll, von schöner Becherform, weiss, mit rosa leicht verwaschen. Frs. 25 . . . . . — 25
1060. **Mlle. Jeanne Marix.** (*Liabaud.*) Blume sehr gross, voll, becherförmig, lebhaft rosa, purpurroth marmorirt. Wird als eine der schönsten bis jetzt bekannten Hybriden gerühmt. Frs. 25 . . . . . — 25
1061. **Mlle. Thérèse Coumer.** (*Liabaud.*) Grosse, volle Blume, seidenartig glänzend, lebhaft rosa mit rein weisser Mitte. Frs. 25 . . . . . — 25
1062. **Mons. Chaix d'Est-Ange.** (*Lévêque.*) Die grossen, vollen, gutgebauten Blumen schön zinnberroth. Reichlich blühend. Frs. 20 . . . . . — 25
1066. **Mons. Noman.** (*Guill. P.*) Blume gross, voll, zart rosa mit weissem Saum, von schöner Haltung; Sprössling der Rose Jules Margottin. Frs. 20 . . . . . — 20
1056. **Panaché de Luxembourg.** (*S. et N.*) Blume mittelgross, schön gebaut, violet-purpur mit lachsrosa gestreift und gebändert. Frs. 25 . . . . . — 20
1073. **Président Porcher.** (*Vigneron.*) Blume sehr gross, blassrosa mit carmin schattirt, auf festem Stiel getragen, überhaupt von schöner Haltung. Sprössling der Rose »Triomphe de l'exposition«. Frs. 25 . . . . . — 25
1055. **Ruhm von Thallwitz.** (*Peters.*) Blume mittelgross, voll, blendend carmin-scharlachroth mit lackrothem Widerschein. Das Colorit dieser neuen Sorte ist heller und weit leuchtender, als das der Rose Président Lincoln. Thlr. 5.10 . . . . . — 25

### Bourbon-Rosen.

1070. **Oeillet flammand.** (*Oger.*) Blume mittelgross, voll, von flacher Form, lebhaft rosa, rein weiss gestrichelt und panachirt. Frs. 15 . . . . . — 25
1057. **Petite Amande.** (*Soup. et N.*) Mittelgross, stark gefüllt, recht frisch rosa mit carminrothen Reflexen. Von kräftigem Wuchse. Frs. 20 . . . . . — 20

### Thee-Rosen.

1074. **Belle Cuivrée.** (*Pernet.*) Theerose von kräftigem Wuchse, Blumen gross, fast voll, sehr lebhaft kupferfarbig. Frs. 25 . . . . . — 25
1055. **Isabelle Sprunt.** (*A. V.*) Schöne gelbe Rose von ansehnlicher Grösse, amerikanischen Ursprungs. Die Blumen sind gut gefüllt und von dunkelgelbem Colorit . . . . . — 25
1071. **Lucrèce.** (*Oger.*) Blume gross, stark gefüllt, in der Mitte rosettenförmig, lachsfarbig rosa, in dunkelrosa übergehend. Frs. 15 . . . . . — 20
1063. **Mons. Furtado.** (*Laffey.*) Blume mittelgross, voll, von gutem Bau, in Dolden blühend, schönes Hellschweifelgelb. Frs. 25 . . . . . — 25

**Rosa microphylla.**

Thlr. Gr.

1058. **Premier Essai.** (*R. Geschwind.*) Blume mittelgross, voll, fleischfarbig mit lebhaft carminrother Mitte. Frs. 15 . . . . . — 20  
 12 Stück nach unserer Wahl Thlr. 8.  
*Vorjährige, sehr empfehlenswerthe Neuheit:*
1072. **Elisabeth Vigneron.** (*Vign.*) Remontant-Hybride von kräftigem Wuchse, Blume sehr gross, voll und von recht frischem, schönen Rosa. Eine remontirende Centifolie! . . . . . — 20  
 Ferner die Thee-Rose (1865):
1008. **Maréchal Niel.** Die Blumen dieser gesuchten Rosensorte sind gross, voll und leuchtend gelb, dabei nicht so empfindlich gegen rauhe Witterung, als viele ältere Theerosen. . . . . — 20

**VERBENEN (Verveines).**

Auswahl der besten Neuheiten. — Nouveautés choisies.

*Collection Twrdy.*

49. **Franz Deák.** Enorme Blume, violettercarmin mit grossem weissen Auge. (Fleur énorme, violet carmin à large oeil blanc.)
48. **General John.** Sammetig dunkelcarmin mit weissem Auge in grosser Blume. (Fl. grande, rouge carminé très foncé velouté à large oeil blanc.)
50. **Granate.** Sammetig purpur mit dunkelvioletem Centrum; Dolde u. Blume sehr gross. (Pourpre velouté à centre violet foncé, fleurs et bouquets grands.)
51. **Illustrata.** Blume von gutem runden Bau, braunviolet mit weissem Auge. (Fl. de forme parfaite ronde, violet brunâtre à oeil blanc.)
52. **Rubra magna.** Sehr grosse, gut gebaute Blume, glänzend zinnoberroth mit weissem Auge. (Fl. très grande et bien faite, cinabre brillant à centre blanc.)
53. **Sirene.** Glänzend sammtig carmin gegen die Mitte dunkler, mit blendend weissem Auge. (Carmin brillant velouté plus foncé vers le centre à oeil blanc de neige.)

Jede Varietät 15 Ngr.

Die Collection Thlr. 2. 15. — Les 6 variétés ensemble Thlrs. 2. 15.

**Bunte, sogenannte italienische Sorten.***Verveines rubanées et striées.*

121. **Adonis** (*Boucharlat*). Kräftige Sorte mit grosser Dolde, weiss mit purpurrothen Streifen.
113. **Ch. Baltet** (*Bouch.*). Bl. u. Dolde ausserordentl. gross, vollkommener Bau, Grundfarbe weinroth, rein weiss panachirt.
114. **Delicatissima** (*Bouch.*). Milchweiss mit hübschen zartrosa Bändern.
115. **Gustave Zaubitz** (*Bouch.*). Bl. u. Dolde sehr gross, rein weiss, hellroth gebändert u. gestreift.
116. **H. Laurentius** (*Bouch.*). Sehr grosse Dolden mit grossen runden Blumen, Grundfarbe hell amaranthroth mit rein weissen Bändern.
117. **Louis van Houtte** (*Bouch.*). Scharlachroth mit weissen Bändern, Dolde u. Blume gross und von gutem Bau.
118. **Mad. Alph. Dufoy** (*Bouch.*). Bl. sehr gross, porcellanweiss, mit zart violeten Adern u. Flecken.
119. **Sans Pareille** (*Bouch.*). Bl. u. Dolde sehr gross, rein weiss u. überall carmoisinroth punktirt.
120. **Tapageuse** (*Bruant.*). Blendend hell mennigroth mit dunkelpurpur Streifen u. grossen weissen Augen. Bl. u. Dolde gross.

Jede Varietät 15 Ngr. — 6 Sorten nach unserer Wahl Thlr. 2. —



## Exhibition-Verbenen.

Die sogenannten Ausstellungs-Verbenen sind Sorten von sehr kräftigem aufrechten Wachstum mit grossen Blumendolden von lebhaftem Colorit. Sie eignen sich daher vorzüglich zur Zucht in Töpfen und liefern, von Ausstellungszwecken ganz abgesehen, prächtige Marktpflanzen.

Thlr. Gr.

157. **Anatole Leroy (Br.)**. In jeder Beziehung aussergewöhnliche Varietät, starkstämmig mit dicken Blättern u. langen, kräftigen Blumenstielen, welche die Pflanze gut überragen. Bl. u. Dolden sind enorm gross, ganz dunkelpurpur, sammet-schwarzbraun schattirt mit grossem weissen Centrum . . . . . — 15
150. **Antonio**. Hellocarmoisin mit lilarosa Auge . . . . . — 15
151. **Beauty of England**. Hr. Henderson, welcher die Auflage dieser Verbenen zu einem hohen Preise von dem Züchter gekauft hat, widmet der Beschreibung derselben über eine halbe Seite seines enggedruckten Katalogs, hat aber dennoch vergessen, das Colorit ihrer Blume anzugeben! Jedenfalls ist es eine sehr kräftige wenig empfindliche Sorte, die weniger den verschiedenen Krankheiten ausgesetzt sein soll, an welchen so viele andere Varietäten leiden. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchse, die Blume sehr gross, das Colorit feurig purpurscharlach mit grossem weissen Auge . . . . . — 20
152. **King of Scarlets**. Glühend scharlachroth mit grossem runden, weissen Auge, grosser Dolde u. von sehr kräftigem Wuchse . . . — 15
153. **Pluto**. Brillant dunkelblau mit grossem gelben Auge . . . . . — 20
154. **Queen of England**. Rein lachsfarbig mit grossem feuerrothen Centrum . . . . . — 15
155. **Sant Jago**. Feuriges u. scharlachschimmerndes Carmoisin mit grossem weissen Auge . . . . . — 15

## Neue Gruppen-Verbenen.

*Verveines à coloris unis.*

61. **Bleu impérial (Bouch.)**. Gutgebaute, grosse Blume, Colorit schön, tief Berliner Blau. Gute blaue Gruppenverbene . . . . . — 12
55. **Bonne Villageoise (Bruant.)**. Sehr grosse Bl. u. Dolde, lebhaft carminrosa mit grossem weissen Centrum . . . . . — 15
46. **Celestial Blue (H.)**. Die schönste blaue Verbene von sehr kräftigem Wuchse mit grossen Blüthendolden, die in der vollen Sonne sich frisch u. constant erhalten . . . . . — 15
56. **La Fraicheur (Br.)**. Rein weiss mit sehr grossem, violetcarminrothen Centrum . . . . . — 10
57. **Mad. V. Lemoine (Br.)**. Die grossen Bl. u. Dolden vom schönsten Bau, blendend purpurroth mit grosser schneeweisser Mitte. Sehr kräftige Sorte u. reichlich blühend . . . . . — 10
202. **Princess Victoria (J. Wills)**. Neue Maonetti-Hybride, gewonnen durch Befruchtung der Verb. Impératrice Elisabeth mit der schönen Verb. Velvet Cushion. Habitus zwergig u. compact, die aufrechtstehenden Blüthendolden rosaviolet (Magenta) . . . . . — 10
59. **Really Blue (Bull)**. Verbene von lebhaftestem echt dunkelblauen Colorit in grosser Dolde. Reichblühende u. höchst gedungen wachsende Gruppen-Verbene . . . . . — 20
60. **Reine des Blanches (Bouch.)**. Wird als die schönste, beste, zu Gruppen geeignetste weisse Verbene gerühmt, welche ihre reine Farbe bis zum völligen Abblühen beibehält. Die Pflanze ist kräftig mit festem, aufrechten Blumenstiel u. reichblühend . . . . . — 10

## Neueste Veronica.

Thlr. Gr.

20. **V. imperialis** (*Boucharlat jeune*). In Folge der fortgesetzten Hybridisirung dieser geschätzten Florblumengattung durch Hrn. Boucharlat jun. hat dieselbe, man kann es ohne Uebertreibung sagen, fast ein ganz anderes Ansehen gewonnen. Die Pflanze ist von besserem gedrungenerem Bau, die Blumen u. Blumenrispen grösser, umfangreicher, im Colorit schöner u. hauptsächlich mannichfaltiger geworden.

Die neue Veronica, von welcher hier die Rede ist, ist von sehr compactem, fast zwergigen Habitus, hat breite, dichte Blütenrispen von 4—5 Zoll Länge u. ist von brillant magentarothen, schön mit purpurcarmin untertuschem Colorit. Die weissen Antheren, die auf der lebhaft dunkeln Färbung stark hervortreten, bringen bei dieser Varietät die Aehnlichkeit einer Metrosideros-Blumenrispe täuschend hervor. Sie wurde im verflossenen October von der Pariser k. Gartenbaugesellschaft durch eine grössere Prämie ausgezeichnet u. ist im letzten Novemberhefte der „Revue des champs et des jardins“ abgebildet worden . . . . . — 25

Ferner empfehlen wir folgende neuere Sorten von demselben Züchter:

18. **Admiration.** Hellamaranthroth, violet schattirt. Grosse Blütenrispe. 1866. . . . . — 10  
 19. **Nec plus ultra.** Blütenrispe 5—6 Zoll lang u. sehr breit. Colorit rein lila u. purpur schattirt. 1866. . . . . — 10  
 15. **Reine des Massifs.** Leuchtendroth. Compacte Zwergsorte. 1865. — 6  
 16. **Rosa Bonheur.** Rosig lila mit weissen Spitzen. Compact, zwergig — 6

## ERDBEEREN.

Fraisiers.

Strawberries.

In kleinen Töpfen cultivirt.

Nachstehende Erdbeersorten (wovon wir der Form wegen einige haben abbilden lassen) sind die besten und empfehlenswerthesten, welche in der Neuzeit in den Handel gekommen sind. Eine Collection hiervon dürfte den Freunden dieser herrlichen Frucht, nach verschiedener Richtung hin, das Beste bieten, was bisher hiervon erzeugt worden ist. (Man vergleiche auch die nebenstehenden Abbildungen. Voyez les figures.)

### a. Neueste Sorten.

5. **Alice Nicolson.** (Fig. 3.) Grosse Frucht von conischer Form, nach oben halsartig, Kelch zurückgeschlagen, Farbe der Frucht lebhaft rosa-orange. Das Fleisch ist rahmweiss, voll, fest, schmelzend, zuckersüss, ausnehmend hart und vorzüglich wohlriechend. Die Pflanze ist hart, sehr fruchtbar, mittelfrühe Reifzeit . . . . . — 15  
 6. **Ananas perpétuel.** (Fig. 1.) Eine immerwährend tragende, grossfrüchtige Ananas-Erdbeere war von den zahlreichen Erdbeerfreunden bisher vergeblich gesucht. Herr Gloede hat das Glück, denselben jetzt eine solche unter obigem Namen anbieten zu können.

Hat man auch hier und da unter den grossfrüchtigen Sorten einige, die im Herbste nochmals wenige kleine Früchte liefern, was in Folge feuchter Witterung nach anhaltender Dürre häufig vorkommt, so kann man damit keine immertragende Erdbeere bezeichnen.

Die Ananas perpétuel liefert dagegen in der ersten Saison reichlich Früchte und fährt fort bis zum Herbste zu blühen und





Früchte zu geben, durch welche Eigenschaft eine bemerkenswerthe Lücke in den vorhandenen zahlreichen Erdbeersorten ausgefüllt wird.

Die Pflanze ist von unersetztem kräftigen Wuchse, hart und vermehrt sich leicht. Die Frucht ist von guter Grösse, von runder oder ovaler Form, zuweilen gelappt, von lebhaft zinnoberrother Farbe, das Fleisch ist weiss oder blassrosa, saftreich, zuckersüss und sehr aromatisch, so dass diese Erdbeere die Eigenschaften der besten bekannten Sorten besitzt. Eine Pflanze . . . . . — 15

6 Stück Thlr. 2. 15 Ngr.

25 Stück Thlr. 8. —

12. **Baron de Quadt.** Frucht ziemlich gross, von länglicher Form u. lebhaft roth; das Fleisch ist rosafarbig, voll, saftig, zuckersüss und von exquisitem Arom. Die Pflanze bleibt niedrig, ist hart, liefert wenig Ausläufer, ist aber von ausserordentlicher Fruchtbarkeit und mittlerer Reifzeit . . . . . — 15

12 Stück Thlr. 4.

13. **Carniola magna.** (Fig. 7.) Schöne Frucht erster Grösse von ovaler Form, lebhaft glänzend zinnoberroth. Das Fleisch ist rosa mit rothen Adern durchzogen, in der Mitte hohl, fest, saftreich, schmelzend, zuckersüss und genügend aromatisch. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchse und fruchtbar . . . . . — 12

6 Stück Thlr. 2.

14. **La Mauresque.** Die schwarze Erdbeere. Frucht mittelgross, oval, bei völliger Reife schwarzbraun; Fleisch blutroth, voll, fest, saftig, ganz zuckersüss und von prononcirtem Muscatellergeschmack. In jeder Beziehung vorzügliche Sorte, hart, sehr fruchtbar und von mittlerer Reifzeit . . . . . — 10

6 Stück Thlr. 1. 15 Ngr.

25 Stück Thlr. 5. 15 Ngr.

16. **La Paysanne.** Die Frucht ist gross, von regelmässiger ovaler Form u. zinnoberroth; Fleisch lachsfarbig, voll, saftig, weinsäuerlich-süss, nicht sehr aromatisch. Pflanze mehr kräftig als hart, von grosser Fruchtbarkeit und mittlerer Reifzeit . . . . . — 10

4. **Louis Vilmorin.** (Fig. 6.) Mittelmässige Frucht von verschiedener Form und glänzend dunkelrother Farbe; Fleisch voll, roth, saftig, weinsäuerlich-süss. Die Pflanze wächst stark, trägt dankbar, reift sehr zeitig und lässt sich gut treiben . . . . . — 8

12 Stück Thlr. 2. 12 Ngr.

15. **Menagère.** Grosse länglich geformte, lebhaft rothe Frucht; das Fleisch ist rosafarben, voll, fest, saftig, zuckersüss und von aromatischem Geschmack. Die kräftig wachsende Pflanze ist sehr fruchtbar, reift ihre Früchte nach und nach, so dass sie fast die ganze Saison hindurch Früchte liefert . . . . . — 15

17. **Topsy.** (Fig. 2.) Die Frucht ist gross, von eigenthümlicher sehr langer Form und glänzend orangeroth. Das Fleisch ist rosafarben, fest, voll, saftig, zuckersüss und sehr aromatisch, harte, kräftige Sorte, fruchtbar und von mittlerer Reifzeit . . . . . — 8

11. **White Pineapple.** (White Albion.) Neue Sorte amerikanischen Ursprungs. Die Frucht ist gross, völlig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa; das Fleisch voll, weiss, schmelzend, zuckerig und sehr aromatisch. Kräftig wachsend und sehr fruchtbar . . . . . — 12

## b. Vorjährige und ältere Sorten.

7. **Carolina superba.** (Fig. 4.) Frucht gross, herzförmig, orange-roth; Fleisch fest, rein weiss, duftend, sehr zart. Fruchtbare und harte Varietät von mittlerer Reifzeit, die in keinem Garten fehlen sollte . . . . . 12 Stück — 24



2. **Docteur Nicaise.** Frucht sehr gross von barocker Form, orange-roth; Fleisch blassrosa, hohl, seifig, von mittelmässiger Güte im Geschmack. Reift zeitig . . . . . — 5
8. **Janus.** (Fig. 5.) Eine Monats-Erdbeere, u. zwar die beste, welche existirt; von länglicher, häufig gelappter Form. Die Pflanze ist ausserordentlich fruchtbar und liefert Früchte vom Frühling an bis zum Eintritt des Frostes. 12 Stück . — 24  
100 Stück . 5 —
0. **La Constante.** Mittलगrosse Frucht von conischer Form, lebhaft roth; Fleisch blassrosa, voll, fest, zuckerig und wohlriechend. Reift spät, sehr fruchtbar . . . . . 12 Stück — 24
9. **Marquise de Latour-Maubourg.** Mittलगrosse, runde oder ovale lebhaft zinnoberrothe Erdbeere; Fleisch blassrosa, voll, saftig, zuckerig u. aromatisch. Frühreifende sehr fruchtbare Sorte. 12 Stück — 10  
50 Stück 1 5
10. **Sir Harry.** Grosse Frucht von runder, platter Form, purpurroth und zeitig reifend; Fleisch blassrosa, voll, fest, zuckersüss, saftig. Harte Sorte von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. 12 Stück — 24  
100 Stück 5 —
1. **Triomphe de Hollande.** Grösste Monats-Erdbeere. 12 Stück — 24

## II. ABTHEILUNG.

### Sortimente von Flor- und Modeblumen.

(Blumistik.)

Collections de Genres de Fleuristes.

### ALTHAEA ROSEA.

MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÉMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Ranges, und grösstentheils Hybriden ausgezeichneter englischer Züchter. Wir liefern dieselben in jungen, gutbewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt.

Die Sorte à 8 Ngr.

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 10 Ngr.

1. **Admiration (Chater).** Purpurroth mit weiss.
2. **Alice (Downie).** Rosenroth.
3. **Beauty of Walden (Chater).** Rosa carmin.
4. **Black Prince (Gibbon).** Die schönste schwarze gefüllte.
5. **Electra (Paul).** Schön gelb mit brauner Basis.
7. **Elegantissima (Chater).** Weiss mit lila.
8. **Fortuna (Chater).** Rosig chamois.
9. **Géant des batailles Surpasse (Chater).** Brillant brauncarmoisin.
10. **King of Oude (Chater).** Rahmweiss mit braunroth.
11. **Leucantha (Chater).** Prächtig schwefelgelb, colossale Blume.
12. **Memnon (Paul).** Helldarmoisin.
13. **Neptun (Chater).** Violetroth.
14. **Purple King (Chater).** Purpurroth.
15. **Regina (Chater).** Carmoisinrosa, sehr grosse Blume.

16. **Sceptre d'or** (*Chater*). Gelb auf rothem Grunde.  
 17. **Sulphur Queen improved** (*Chater*). Schwefelgelb.  
 18. **Thekla** (*M.*) Gelb mit chamois.  
 19. **Walden Gem.** (*Chater*). Rubinroth.

## ANTIRRHINUM (Löwenmaul)

mit gefüllten Blumen.

	Thlr.	Gr.
36. <b>ARNOLDO DA BRESCIA</b> ( <i>C.</i> ). Amaranthroth . . . . .	—	5
33. <b>GENERAL MENARRA</b> ( <i>C.</i> ). Hellroth nach der Mitte zu dunkler . . . . .	—	5
34. <b>TRIONFO DA BRESCIA</b> ( <i>C.</i> ). Orange, abwechselnd mit roth . . . . .	—	5
35. <b>VITTORIO EMMANUELE</b> ( <i>C.</i> ). Weiss mit rothbraun gestreift . . . . .	—	5

Die Collection 18 Ngr.

## AZALEEN, vide Kalthauspflanzen.

## BOUYARDIEN.

Beliebtes Genre mit reizenden, lieblichen, sehr verschiedenfarbigen Kelchblumen, für Topfcultur und Freiland.

14. <b>Angustifolia</b> . . . . .	—	8
2. <b>Brillant</b> . . . . .	—	10
1. <b>Delicata</b> . Zart blassroth . . . . .	—	6
22. <b>Flava flore albo</b> . . . . .	—	6
8. <b>Hogarth</b> . Grosse, scharlachrothe Dolden, sehr empfehlenswerth! . . . . .	—	6
13. <b>Humboldtii</b> . Zwergig, kleinblättrig, Blumen lang, schneeweiss . . . . .	—	8
9. <b>Laura</b> . Zart rosa . . . . .	—	5
5. <b>Leiantha</b> . Hellscharlach, im Winter blühend . . . . .	—	5
24. <b>Leiantha grandis</b> . . . . .	—	10
7. <b>Leiantha splendida</b> . Blume gross, brillant scharlach . . . . .	—	6
25. <b>Leiantha longiflora</b> . . . . .	—	10
18. <b>Oriana</b> . . . . .	—	10
21. <b>Oriana lutea</b> . . . . .	—	10
11. <b>Rosalinde</b> . Lachsfarbenrosa . . . . .	—	6
20. <b>Roseo Salmonea</b> . . . . .	—	8
27. <b>Splendens</b> ( <i>stricta</i> ) . . . . .	—	8
4. <b>Van Houttei</b> . Gesättigt hochroth . . . . .	—	4

Wir liefern 6 Sorten nach unserer Wahl zu 1 Thlr.

12 Sorten zu 1 Thlr. 15 Gr.

## CALCEOLARIEN.

(Strauchartige.)

1. **Etna**. 5 Gr. — 2. **Cloth of Gold**. 5 Gr. — 3. **Geant of Gold Cap**. 5 Gr.  
 4. **General Maudhuy**. 8 Gr. — 5. **Retoul**. 8 Gr. — 6. **Sparkler**. 5 Gr.

## CAMELLIEN, vide Kalthauspflanzen.



# Chrysanthemum indicum.

Von dieser schönen Flor- und Mode-Blume, die durch künstliche Befruchtung zu so ausserordentlicher Vollkommenheit gebracht worden, und deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Herbst- und Wintermonaten blüht, offeriren wir nachstehend eine reiche Auswahl neuer sowie auch älterer Sorten.

Zu Winterbouquets ist dieses so reichlich blühende Genre eine ebenso nützliche Ressource für den Gärtner, als es ihm zugleich die schönste Gelegenheit bietet, sich als Cultivateur zu zeigen, indem sich fast keine andere Blumengattung so leicht, und zugleich so lohnend zu Schaupflanzen heranziehen lässt. —

## I. Vorjährige Neuheiten.

### a. Kleinblumige französische (*à petites fleurs*),

von dem vorzüglichsten Züchter in diesem Genre, Lebois in Toulouse, durch künstliche Befruchtung aus Samen gewonnen. Wahre Lilliputen, die kleinsten bis jetzt bekannten Blumen dieser Gattung, und in den muntersten Farben leuchtend.

- |                       |                     |                       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 142. Ami Feille.      | 143. Esther Himmes. | 146. M. Schmidt.      |
| 144. Justine Tessier. | 145. Mimi Crouzat.  | 147. Pâques fleuries. |

Die Sorte 8 Gr. — Die Collection 1 Thlr. 10 Gr.

141. Louise Honoraty (*Huber*). Hauptsächlich zu Gruppenpflanzungen sich eignende Varietät, welche kugelförmige Büsche von 1—1½ Fuss Höhe und eben solcher Breite bildet.

Die kleinen purpurroten Blumen kommen in so grosser Anzahl hervor, dass sie gewissermassen nur ein Bouquet bilden.  
1 Stück 6 Gr. 12 Stück 1 Thlr. 25 Gr. 25 Stück  
3 Thlr. 10 Gr.

### b. Anemonenblumige Pompon Chrysanthemum

(*à fleurs d'Anemones*).

- |   |  |
|---|--|
| 181. Princesse Dagmar ( <i>Hend.</i> ). Rein weiss, von schönem, vollem, gewölbtem Bau. (Certificat I. Classe.) | 182. Mrs. Campbell ( <i>Hell.</i> ). Gutgebaute, runde und volle Pomponblume, von hellcarmoisinrothem Colorit. |
|---|--|

Die Sorte 8 Gr., beide 12 Gr.

## II. Sorten früherer Jahrgänge

in den beiden nachstehenden grossen Collectionen.

### a. Grossblumige.

- |  |  |
|--|--|
| 9. Cassandra ( <i>P.</i> ).  | 21. Madame Bachoux ( <i>P.</i> ). Lila rosa.   |
| 12. Conqueror ( <i>S.</i> ).   | 17. Madame Barthère ( <i>Pert.</i> ). Carminroth, Rückseite mit goldgelben Spitzen.            |
| 13. Etoile filante ( <i>Pert.</i> ). Glänzend weiss und lila, imbrükt, gewölbt.      | 5. Madame de St. Cyr ( <i>Bon.</i> ).  |
| 14. Grand-Papa ( <i>Pert.</i> ). Dunkelorange, sehr voll, von schönem Bau.           | 3. Madame Lagarrigue ( <i>Pert.</i> ). Amaranthrosa.   |
| 1. Ida ( <i>Lebois</i> ). Schwefelgelb, sehr gross u. voll.                          | 19. Miss Augusta ( <i>Hend.</i> ). Citrongelb, von schönem Bau, reichblühend.                  |
| 4. Julie Lagravère ( <i>Bon.</i> ).  | 7. Mlle. J. Constantia ( <i>Bon.</i> ).  |
| 24. Le Camoens ( <i>Leb.</i> ). Mitteltgross, hilaroth mit weissen Spitzen.          | 18. Mlle. Mars Barthère ( <i>Barth.</i> ). Lebhaft rosa, Spitzen rein weiss, gewölbt, imbrükt. |
| 26. Le Docteur Clos ( <i>Leb.</i> ). Rosa.   | 6. Mlle. Thérèse de Voisin ( <i>Bon.</i> ).  |
| 23. Les Lilas globuleux ( <i>Barth.</i> ). Röthlich lila.                            | 22. Monsieur Jacques ( <i>P.</i> ).  |
| 15. Le Trouvère ( <i>Barth.</i> ). Blass fleischfarben, gewölbt, imbrükt, sehr voll. | 10. Mount Vesuvius ( <i>S.</i> ). Feurig roth.   |
| 16. Louis Barthère ( <i>Barth.</i> ). Lebhaft carmoisin, imbrükt, sehr voll.         | 11. Queen of England ( <i>S.</i> ).  |
| 20. Madame Alphonse Dufoy ( <i>P.</i> ). Rein weiss, schön nachahmt.                 | 2. Sabrina ( <i>Salt.</i> ). Rein weiss.   |
|  | 8. Saint-Juste ( <i>S.</i> ). Dunkelzimmtbraun.  |
|  | 25. Souvenir d'un ami ( <i>Leb.</i> ). Weiss, roth gestrichelt.                                |

### b. Zwerg- oder Pompon (kleinblumige).

- |  |  |
|--|--|
| 119. Albert de Gaujac ( <i>Bon.</i> ).                                 | 122. Comtesse de Circourt ( <i>Bon.</i> ).   |
| 121. André Fourcade ( <i>Bon.</i> ).                                   | 107. Comtesse Ventura ( <i>Leb.</i> ). Lila. |
| 132. Athos ( <i>Leb.</i> ). Rosa, purpurn schattirt und weiss gesäumt. | 130. Coquette ( <i>Leb.</i> ). Purpurilla.   |
|  | 109. Docteur Mazary ( <i>Leb.</i> ).         |

108. **Doria** (*Pert.*). Goldgelb, imbrüirt.  
 101. **Fanferluche** (*Leb.*). Lila, sehr kleine Blume.  
 110. **Filetto** (*Pert.*).  
 111. **Graziencette** (*Bon.*).  
 102. **Guillerii** (*Leb.*). Goldgelb, fleischfarben ausgestrahlt. Zellenform.  
 137. **Jacques Himmès** (*Leb.*). Hellkirschroth.  
 131. **Lara** (*Leb.*). Weiss.  
 133. **Laure** (*Leb.*). Zimmetbraun auf gelb. Grunde.  
 139. **Le Vésuve** (*Leb.*). Chromgelb.  
 117. **Madame Donos** (*Bon.*).  
 118. **Madame Dupont** (*Bon.*).  
 123. **Madame Edmond Vital** (*Bon.*).  
 136. **Mad. Emile de Girardin** (*P.*).  
 135. **Madame Fourcade** (*P.*). Rosa mit gelben und rothen Spitzen.  
 124. **Madame Houlet** (*Bon.*).  
 125. **Madame Léon Dratt** (*Bon.*).  
 134. **Madame Leverrier** (*P.*). Weiss. Rückseite rosa mit gelben Spitzen.  
 106. **Madame de Granié** (*Bon.*). Canariengelb.  
 103. **Manetta** (*Leb.*). Goldgelb und hellisabellenfarben. Zellenform.  
 138. **Marie Cronzat** (*Leb.*). Carmoisin.  
 126. **Marie de Paulat** (*Bon.*).  
 113. **Marmouset** (*Leb.*). Bräunlichecarmin.  
 104. **Marquis d'Alfarasi** (*B.*). Gelb, sehr klein.  
 128. **Masaniello** (*Pelé.*). Lachsfarben.  
 114. **Mr. Lebolis** (*Leb.*). Rosacarmin.  
 120. **Mlle. A. Fourcade** (*Bon.*).  
 112. **Mlle. Olympe de Cambières** (*Bon.*).  
 105. **Pompon d'or** (*Leb.*). Goldgelb. Kugelform.  
 127. **Procida** (*Leb.*).  
 115. **Reine des Panachées** (*P.*). Weiss.  
 116. **Signora Pepin** (*Leb.*). Lebhaft carmin.  
 129. **Sunset** (*Pelé.*). Orange, vielblumig.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten für 1 Thlr.

25 Sorten für 2 Thlr.

60 Stück in 40—50 Sorten für 4 Thlr.

Einzeln die Sorte à 3 Gr.

### III. Japanesische Chrysanthemum.

Spielarten des indischen Chrysanthemum.

Im Jahre 1863 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt.

- |                    |                            |                |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| 82. Bronze Dragon. | 87. Grandiflorum.          | 81. Japonicum. |
| 84. Laciniatum.    | 83. Roseum albo punctatum. | 85. Striatum.  |
|                    | 86. Yellow Dragon.         |                |

Einzelne Sorten à 4 Gr. Die Collection 25 Gr.

### IV. Buntblättrige Chrysanthemum.

201. **Nanum fol. aur. varieg.** Schön gelb panachirt . . . . . — 8  
 202. **Sensation** (*Bull.*). Aeusserst zierlich panachirte Varietäten von sehr gedrungenem Bau, deren Blätter regelmässig breit, weiss gerandet sind. Die Blumen sind ebenfalls rein weiss und gut gefüllt . . . . . — 8

## CRASSULA COCCINEA (Rochea versicolor DC.)

### Vorzügliche Varietäten,

zum Theil abgebildet in der *Flore des Serres* etc.

- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>Boyeldieu.</b> Rein carminroth.                                  | 10. <b>Madame Desbordes Valmore.</b> Carminrosa, Mitte rahmgelb.              |
| 2. <b>Cherubini.</b> Hellscharlach mit weiss leicht bepudert.          | 12. <b>Marmorata.</b> Sammetig dunkelroth, rein weiss gestreift u. marmorirt. |
| 4. <b>Docteur E. Regel.</b> Hellscharlach, Centrum carmin.             | 13. <b>Mozart.</b>  |
| 3. <b>Docteur Göppert.</b> Leuchtend scharlach, Centrum violetecarmin. | 15. <b>Otto Deines.</b> Sammetig dunkelscharlach.                             |
| 5. <b>Docteur Naudin.</b> Zart rosa, leicht scharlach umsäumt.         | 18. <b>Sultan Achmed.</b> Sehr dunkelroth, Mitte lila.                        |
| 6. <b>Edouard Ortgies.</b> Carminroth, rein weiss gebändert.           | 19. <b>Thalberg.</b> Dunkelscharlach, weiss gebändert.                        |
| 9. <b>Madame Celeste Winans.</b> Rein weiss, scharlach gerandet.       |   |

Das Stück 5 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 20 Gr.

**Rochea falcata superba.** Bekannte und beliebte Topfpflanze mit feurig hell-scharlachrothen Blumen. Von Anfang Juni bis Ende October blühend. Zur Be-



kleidung von Steinpartien und überhaupt zur Ausschmückung des Gartens während des Sommers vorzüglich geeignet.

Junge Pflanzen . . . . . das Stück 6 Gr.; 12 Stück 2 Thlr. — Gr.  
Starke blühbare Pflanzen »     » 10 » ; 12 » 3 » 10 »

### DELPHINIUM.

Inspector Meyer 5 Gr. — Mad. Neuner 4 Gr. — Mons. Pfitzer 5 Gr. —  
Richaletti 4 Gr. — Roseum coelestinum 5 Gr.

## Diplacus

oder strauchartige Mimulus.

6. **Atropurpureus** (*St. et M.*). Dunkelpurpurn, Schlund orange.
  5. **Godronii** (*V.*). Carmoisin, Schlund orangengelb.
  3. **Hybridus splendidus** (*Ingelr.*). Lackroth und carmin, Schlund rosa.
  2. **Ingelrelstii** (*J.*). Leuchtend hochroth, Schlund rosa, goldgelb gefleckt.
  1. **Puniceo aurantiacus** (*J.*). Orange, lackroth belegt, Schlundmündung
  7. **Splendens** (*V.*). Leuchtend carminroth, reichblühend. [amaranth.
  4. **Verschaffeltii** (*V.*). Amaranthroth, mit hellgelbem Schlund.
- Die Sorte 5 Gr. — Die ganze Collection für 1 Thlr.

### ERYTHRINA.

Diese ebenso dankbar blühenden, als durch ihren herrlichen Blätterschmuck decorativen Pflanzen, eignen sich ganz besonders zum Bepflanzen der Gruppen im Freien. Dieselben gegen Ende Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen das Auge von Ende Juli bis zum eintretenden Frost mit ihren grossen rothen Blütenrispen. Besonders wenn ihnen, nachdem sie im Lande angewachsen, reichlich Wasser gegeben wird.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
1. ARBOREA . . . . .	— 6	12. CORALLODENDRON . . . . .	— 8
12. BELANGERI. Heller als Ruberrima (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.) . . . . .	— 8	6. MARIE BELANGER . . . . .	— 10
2. BIDWILLI . . . . .	— 10	8. PROFUSA . . . . .	— 10
3. CRISTA GALLI. Carmoisinroth. (12 Stück 1Thl. 20Gr.) . . . . .	— 5	7. RUBERRIMA. Dunkel carminscharlach. Effectvoll. (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.) . . . . .	— 8
9. CONSPICUA . . . . .	— 12	10. VIARUM. Prachtvoll! . . . . .	— 15

## FUCHSIA.

Wir haben im vorigen Jahre unsere sämmtlichen krautartigen Sortimente einer genauen Sichtung unterworfen und besonders auch unter den Fuchsien eine strenge Revision gehalten. Wir können daher mit Recht das vorliegende Sortiment als ein allen Ansprüchen gewachsenes empfehlen. Wir haben unser Hauptaugenmerk auf gute Blüher, guten Habitus und dabei grosse Blumen gerichtet.

### Auswahl. Variétés d'Elite.

#### a. Vorjährige Neuheiten.

Die nachstehenden Fuchsien haben im Laufe vorigen Sommers bei uns geblüht und sind ohne Ausnahme empfehlenswerth, einige sogar unübertroffen.

140. **Amoena** (*Twurdy*). Die breiten hellrothen Sepalen ganz zurückgerollt;  
Corolle sehr schön gefüllt, vom schönsten Blau . . . . . — 8

135. **Agamemnon** (*Williams*). Sehr substantiöse und breite hellrothe Sepalen mit dunkelblauer, nach der Basis zu carmoisinrother Corolle — 8
165. **Annibal** (*Demay*). Corolle stark gefüllt, dunkelviolet, mit breiten dunkelrothen Sepalen und starkem kurzen Kelche . . . . . — 10
40. **Beauty** (*Banks*). Die schön zurückgebogenen breiten Sepalen hellroth; Corolle becherförmig, blaufarbig und von schönem Bau . . . — 10
164. **Cerbère** (*D.*) Corolle stark gefüllt und von imbriquirtem Bau, violett-blau mit rosa Nuancen; Sepalen breit zurückgebogen und braunroth, Röhre dünn und kurz . . . . . — 10
145. **Elegantissima** (*T.*) Corolle hellblau, sehr gefüllt und schön geformt, Sepalen leuchtend carmin, breit und schön zurückgebogen . . . . . — 8
147. **Erzherzogin Maria Theresia** (*T.*). Sepalen carminroth, zurückgebogen, Corolle sehr weit, glänzend azurilla, prächtiges Colorit und schöne Füllung. Sehr grossblumig . . . . . — 8
30. **Erecta var. Novelty** (*Williams*). Blumen aufrechtstehend, Kelch und Sepalen dieser Varietät sind weiss und von mittlerer Grösse; Colorit zart lilarosa mit weisser Basis, die Dolden ziemlich gross, die Blätter marmorirt und stark gerippt . . . . . — 10
148. **Erinnerung an A. v. Humboldt** (*T.*). Riesigste der gefüllten Varietäten, weit grösser als Colossus, Uranus und M. A. C. Tagliabue; die prächtig zurückgebogenen Sepalen verschwinden fast gegen die enorme Corolle. Diese ist dicht gefüllt, sammetig schwarzviolet, in purpurcarmin übergehend . . . . . — 25
142. **Freiherr von Widmann** (*T.*). Kelch und die schön zurückgebogenen Sepalen carmoisin; Corolle dunkelblau, sehr gefüllt, grösser als Colossus . . . . . — 8
149. **Fürst A. Schwarzenberg**. Corolle enorm lang, sammetig schwarzviolet, sehr gefüllt, Sepalen breit und schön zurückgebogen, die längste gefüllte Fuchsie . . . . . — 15
139. **Fürstin von Dietrichstein** (*T.*). Sehr grosse Blume, Sepalen breit und schön zurückgebogen, die pflaumenfarbene Corolle sehr dicht gefüllt und von tadelloser Regelmässigkeit . . . . . — 8
41. **Faust** (*D.*). Sepalen stark zurückgebogen und leuchtend roth. Rückseite rosa, Corolle violet und rosa. Reichblühende Sorte . . . . . — 8
211. **Fulgens multiflora pumila**. Schöne reichblühende Zwergvarietät der bekannten Species mit niedlichen kleinen Blättern, von sehr gedrungenem Wuchse. Jeder Zweig endet mit einer Dolde feurig carmoisinrother Blumen . . . . . — 15
146. **Gigantea** (*T.*). Eine der schönsten Blumen; Corolle sehr breit, sehr dicht und regelmässig gefüllt, sammetig, dunkelblau, Sepalen von enormer Breite und glänzendem Scharlachroth . . . . . — 8
150. **Globosa magnifica** (*T.*). Corolle sehr regelmässig und dicht gefüllt, leuchtend blau, in amaranthroth übergehend, Sepalen schön zurückgeschlagen . . . . . — 8
151. **Goliath** (*T.*). Sehr grosse, breite, dichtgefüllte Corolle, leuchtend violetroth geflammt; effectvolle Zwergvarietät. . . . . — 8
39. **Gouverneur Backer** (*Cr.*). Colossale Blume, Sepalen stark zurückgebogen und lebhaft roth; Corolle gross und weit, mit sehr langen Petalen und von leuchtend hell carminrothem Colorit. Sehr gedrungener kräftiger Wuchs und reiches Blühen zeichnet diese Fuchsie noch besonders aus . . . . . — 15
160. **Jeanne Benoiton** (*Lem.*). Sehr grosse glockenförmige Blume von durchsichtigem Roth, Sepalen gut zurückgebogen und carmoisinrosa — 8
159. **Jules Janin** (*Lem.*). Sepalen carmoisin, halb zurückgelegt; Corolle gross, stark gefüllt, schieferglänzend violet und carminroth geadert — 10
152. **Kaiserin von Mexico** (*T.*). Corolle breit, sehr gefüllt, weissrosa mit carminrothen Adern, Sepalen carmoisin, schön zurückgebogen. . . . — 8



157. **Le Globe** (*Cr.*). Vielblumige Zwergsorte der *F. globosa*, mit weisser Corolle, grossen, wenig zurückgebogenen Sepalen; Corolle mit vielen dichten Petalen stark gefüllt, rein weiss, carmin und rosa schattirt — 10
143. **Majestica** (*T.*). Auffallende Neuheit, Colorit der »*Impératrice Elisabeth*«, aber doppelt so gross, sehr dicht gefüllt, das Centrum der Corolle weit hervorragend. Prachtvolle Varietät, die grösste unter den weissgefüllten . . . . . — 8
162. **M. Fillion** (*Bouch.*). Sepalen feuerroth; enorm grosse, lange und starkgefüllte Corolle, hell violet mit einzelnen zinnoberrothen Petalen — 8
165. **Mercure** (*D.*). Die stark zurückgebogenen Sepalen korallenroth; Corolle stark gefüllt, sehr umfangreich, hellviolet und lebhaft rosa schattirt — 8
42. **Osiris** (*D.*). Die gut zurückgebogenen, breiten Sepalen dunkelroth; Corolle ausserordentlich gross und weit, von glänzend rothvioletem Colorit . . . . . — 8
144. **Perlenregen** (*T.*). Colorit der schönen »*Empereur des Fuchsias*«, aber grösser und vollkommener . . . . . — 8
166. **Punch** (*D.*). Sepalen lebhaft roth, breit und stark zurückgelegt; die gefüllte Corolle dunkelviolet mit rothen Ausstrahlungen . . . . . — 8
43. **Psyche** (*D.*). Kelch dick und weiss, Sepalen gut zurückgebogen und rosig fleischfarben; Corolle dunkel carmin, roth mit weisser Basis — 10
158. **Rosalie Franck** (*Cr.*). Die langen, elegant zurückgebogenen Sepalen carmoisinroth; Corolle lang und gut gefüllt, rein weiss mit carminrother Basis. Herrliche Fuchsie . . . . . — 10
141. **Schwan** (*T.*). Kelch carminroth, Sepalen kronenartig zurückgebogen; Corolle schneeweiss, von auffallender Länge, schön gefüllt; die längste weisscorollige Fuchsia . . . . . — 8
153. **Spectabilis** (*T.*). Höchst sonderbare Form. Die zahlreichen weissen, rothgezeichneten Petalen sind sehr stark geschlitzt und gelappt und werden von den in weisse Blättchen umgewandelten vier Antheren elegant überragt . . . . . — 8
154. **Spiritus infernalis** (*T.*). Kelch und Sepalen von dunkelrothem Carmoisin, Corolle sehr gefüllt, sammetig schwarzbraun, glühendroth bandirt und geflammt, ausgezeichnet! . . . . . — 8
44. **Talisman** (*D.*). Die elegant zurückgebogenen breiten Sepalen schwärzlich roth; Corolle sehr gross und weit, graublau mit zartem lila Anhauch . . . . . — 10
161. **Victorien Sardou** (*L.*). Enorm grosse Blume, Sepalen horizontal-liegend; Corolle stark gefüllt und lebhaft amaranthroth . . . . . — 8

Wir liefern aus vorstehendem Sortiment:

Nach unserer Wahl 12 Stück zu 3 Thlr.

„ „ „ 24 „ „ 5 „ 20 Gr.

Das ganze Sortiment . . . . . „ 7 „

## b. Sorten von 1858—1865.

### 1. Einfach blühende (*à fleurs simples*).

13. **Alarm**. Sepalen hellroth, Corolle magentaroth.
12. **Annie** (*Henderson*). Sepalen fleischfarbig weiss, Corolle carminroth.
21. **Applaus** (*Bull*). Sepalen leuchtend roth, Corolle purpurblau.
27. **Caledonian** (*W. B.*) Sepalen roth, Corolle rosa mit blauen Spitzen.
14. **Comet** (*Bks.*). Sepalen carmoisinroth, Corolle blauroth.
24. **Consolation**. Sepalen hellroth, Corolle blau-violet.
15. **Edith** (*Bks.*). Sepalen hell carmin, Corolle pfaumenblau.
1. **Fairest of the Fair** (*Bks.*). Sepalen weiss, Corolle zinnoberroth.
46. **Father Ignatius** (*B.*). Sepalen hellcarmin, Corolle indigoblau.
11. **Figaro** (*Sm.*). Sepalen hellroth, Corolle blauroth.
3. **Flavescens superba** (*Müll.*). Sepalen fleischfarbig weiss mit grünen Spitzen, Corolle hellroth.

6. Governor General (*Sm.*). Sepalen hochroth, Corolle blauviolett.  
 18. Her Majestic (*W. B.*). Sepalen weiss, Petalen hellroth.  
 16. Hermione (*Bks.*). Sepalen weinroth, Corolle schwarzblau.  
 38. Il Trovatore (*Bks.*). Sepalen blassrosa, Corolle dunkel und lackfarbig rosa.  
 9. Isa Gray (*Bks.*). Sepalen hellcarmoisin, Corolle schwarzblau.  
 10. Keteleeri (*Based.*). Sepalen chamois, Corolle bläulich roth.  
 34. La Favorita (*Hend.*). Sepalen hellcarmoisin, Corolle violett.  
 8. Le Prophète (*Banks*). Sepalen carmoisinroth, Corolle pflaumenblau.  
 2. Little Bo-Peep (*Bks.*). Sepalen dunkelroth, Corolle blauviolett.  
 4. Louise Weinrich (*K.*). Kelch und Sepalen weiss, Corolle hellroth.  
 5. Mad. A. Koch (*K.*). Sepalen gelblich weiss, Corolle ziegelroth.  
 20. Mad. Wagner (*Versch.*). Die ganze Blume rein weiss, Corolle carmoisin gestreift.  
 19. Monsieur Lansezeur (*L'H.*).  
 23. Monsieur Meet. Sepalen dunkelroth, Corolle hellblauroth.  
 7. Prima Donna (*Sm.*). Sepalen weiss, Corolle leuchtend roth.  
 17. Reine Blanche (*Bks.*). Sepalen rein weiss, Corolle hell ziegelroth.  
 22. Rifleman. Sepalen hellroth, Corolle lila-rosa.  
 47. Rose of Denmark (*B.*). Kelch und Sepalen rein weiss, Corolle hellroth mit rosa Saum.  
 28. Shakespeare (*W. B.*). Sepalen hellroth, Corolle sehr lang, purpurroth.  
 26. Souvenir de Chiswick (*Bks.*). Sepalen hochroth, Corolle dunkelblau.  
 32. Sunbeam (*W. B.*). Sepalen carminroth, Corolle hellviolett.  
 45. War Eagle (*B.*). Sepalen breit, glänzend carmin, Corolle becherförmig, purpurbau, rosa gestrichelt.  
 29. Welcome (*W. B.*) Sepalen carmoisinroth, Corolle purpurroth.

## 2. Gefüllte (*à corolles doubles*).

125. Auguste van Geert (*Corn.*). Sepalen carmoisin, Corolle violett.  
 129. Alberta (*W. B.*) Sepalen hellrosa, Petalen dunkelblau.  
 126. Belle Rochellaïse (*Bruant*). Sepalen carminroth, Corolle braunroth, ziegelroth und violett.  
 128. Blue Beauty (*W. B.*) Kelch roth, Sepalen hellrosa, Corolle hellblau, sehr gross.  
 114. Charles Lambinet. Sepalen rosacarmin, Corolle lila-rosa mit hellblauem Reflex.  
 155. Colossus. Sepalen dunkelroth, Corolle schwarzblau.  
 109. Comte de Lannoy (*Corn.*). Sepalen hellroth, Corolle blau und roth.  
 138. Cymbeline (*Bks.*). Sepalen dunkelrosa, Corolle gross, wachsartig, schneeweiss.  
 110. Directeur Cambier (*Corn.*). Sepalen carmoisin, Corolle blau und rosa.  
 108. Duc d'Arenberg (*Corn.*). Sepalen hochroth, Corolle hellblau.  
 116. E. G. Henderson (*Corn.*). Sepalen dunkelroth, Petalen blauviolett.  
 115. F. C. Heinemann (*Corn.*) Corolle dreifarbig, violett-carmin und weiss.  
 170. François Desbois. Sepalen hellroth, Corolle violett.  
 133. François Harry (*Corn.*). Sepalen hochroth, Corolle lebhaft carmin, lila gestreift.  
 137. Gipsy Queen (*W. B.*). Sepalen hellroth, Corolle leuchtend purpurroth.  
 127. Grandis (*Versch.*) Sepalen purpurroth, Corolle lilablau.  
 120. Henry Abts (*Corn.*) Sepalen carmoisin, Corolle weiss.  
 122. H. Wakenitz (*Corn.*) Sepalen hochroth, Corolle weiss.  
 136. Herrmann (*W. B.*) Sepalen hellroth, Corolle purpurbau.  
 117. Louis van Houtte (*L'Huill.*) Sepalen hellroth, Corolle blau und roth.  
 103. Mad. Cornelissen (*Corn.*) Sepalen carminroth, Corolle weiss.  
 123. Mad. Crousse (*Corn.*) Sepalen hellroth, Corolle weiss mit rosa Adern.  
 107. Mlle. Eleonore v. Meldert (*Corn.*) Sepalen hochroth, Corolle weiss.  
 130. Maréchal Forey (*L'Huillier*). Sepalen carminrosa, Corolle rosa, violett geflammt.  
 104. Marvelloux (*H.*) Sepalen hellroth, Corolle pflaumenblau.  
 105. Marie Cornelissen (*C.*) Sepalen carmoisin, Corolle weiss.



156. **Master Dunder.** Sepalen hochroth, Corolle dunkelblau.  
 134. **Max Nisson** (*Corn.*). Sepalen carminroth, Corolle dreifarbig.  
 121. **M. Tagliabue** (*Corn.*) Sepalen carmoisinroth, Corolle blau und roth.  
 112. **Mr. Braemt** (*Corn.*). Sepalen hochroth, Corolle weiss.  
 131. **Mr. Moschkowitz.** Sepalen dunkelroth, Corolle blassrosa, roth umsäumt.  
 118. **Monsieur Verschaffelt** (*L'H.*) Sepalen hellroth, Corolle blauroth.  
 167. **Papilionacea** (*v. H.*). Sepalen hochroth, Corolle penséeblau.  
 111. **Président Mueller** (*Corn.*). Sepalen dunkelroth, Corolle veilchenblau.  
 101. **Prinz Ghika** (*Corn.*). Sepalen carmoisin, Corolle braun und roth geflammt.  
 168. **Pyramidalis.** Sepalen hellroth, Corolle schieferblau mit roth.  
 124. **Souvenir de Leipzig** (*Corn.*). Sepalen carmoisin, Corolle gelblich weiss.  
 102. **Souvenir de Monte Bello** (*S. et N.*) Sepalen hochroth, Corolle blau und carmoisin.  
 169. **Versicolor.** Sepalen orangeroth mit grünen Spitzen, Corolle hellblau, in amaranth übergehend.  
 113. **Victor Cornelissen** (*C.*) Sepalen glänzend hellroth, Corolle schieferblau mit roth.  
 100 Stück 7 Thlr. — 50 Sorten 3 Thlr. 20 Gr. — 25 Sorten 2 Thlr. —  
 12 Sorten 1 Thlr. — Einzelne Sorten à 3 Ngr.  
 100 pièces 7 Thlr. — Gr.  
 50 Variétés 3 „ 20 „  
 25 „ 2 „ — „  
 12 „ 1 „ — „

### c. Fuchsien mit weisser Corolle.

(à Corolles blanches.)

Diejenigen, denen ein \* vorsteht, sind einfach.

	Gr.		Gr.
173. Custozza ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 25	105. Marie Cornelissen ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3
*138. Cymbeline ( <i>Banks</i> ) . . . . .	— 3	143. Majestica ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 8
174. Fata Morgana ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 25	112. Monsieur Braemt ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3
120. Henry Abts ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3	144. Perlenregen ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 8
122. H. Wackenitz ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3	158. Rosalie Frank ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	— 10
152. Kaiserin von Mexico ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 8	141. Schwan ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 8
157. Le Globe ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 10	*153. Spectabilis ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 8
103. Mad. Cornelissen ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3	124. Souvenir de Leipzig ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3
123. Mad. Crousse ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3	177. Vice-Admiral v. Tegetthof . . . . .	— 25
176. Mad. Rambousek ( <i>T.</i> ) . . . . .	— 25	113. Victor Cornelissen ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3
107. Mlle. Eleonore v. Meldert ( <i>C.</i> ) . . . . .	— 3		

Hiervon 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 6 Gr.

### d. Fuchsia microphylla.

	Gr.
216. <b>Microphylla</b> ( <i>Typus</i> ). . . . .	— 15
217. <b>Alba rosea.</b> Blumen mit langem Kelch, rosaweiss; Corolle zart rosa-carmoisin. Neues Colorit . . . . .	— 10
218. <b>Amaranthina splendida.</b> Amaranthrother Kelch mit carmoisinbrauner Corolle . . . . .	— 10
219. <b>Cardinalis.</b> Kelch hochroth, mit hellcarmoisin Corolle . . . . .	— 15
220. <b>Grandiflora superba.</b> Die grösste Blume dieser Abtheilung. Kelch hellroth, Sepalen und Corolle lebhaft orange, mit weinroth nuancirt und goldgelben Antheren . . . . .	— 15
221. <b>Rubra ferruginea.</b> Kelch corallenroth, Corolle feurig braunroth. Neues Colorit . . . . .	— 10

Die Collection 1 Thlr. 20 Gr.

## e. Species (Espèces)

und deren Varietäten.

Wir glauben im Interesse der Fuchsien-Liebhaber, die grösstentheils schon fast in Vergessenheit gerathenen Species, die Urtypen unserer heutigen modernen Fuchsie, wieder in Cultur nehmen zu müssen. Ganz besonders zeichnen sich dieselben fast ohne Ausnahme durch sehr dankbares Blühen aus und bilden mit ihren zierlichen schlanken Blumen eine hübsche Abwechslung.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
201. Affine . . . . .	— 10	216. Microphylla . . . . .	— 5
202. Corallina . . . . .	— 6	217. „ alba rosea . . . . .	— 10
203. Corymbiflora . . . . .	— 6	218. „ amaranthina splendid. —	10
204. „ candidissima . . . . .	— 8	219. „ cardinalis . . . . .	— 15
205. „ coccinea superba . . . . .	— 10	220. „ grandiflora superba . . . . .	— 15
207. „ superba . . . . .	— 8	221. „ rubra ferruginea . . . . .	— 10
202. „ fol. albo. varieg. . . . .	— 10	222. Miellezii . . . . .	— 6
209. „ virginalis . . . . .	— 8	230. Pumila . . . . .	— 8
210. Fulgens . . . . .	— 6	231. „ Fairy . . . . .	— 15
211. „ multiflora pumila . . . . .	— 10	224. „ Tom. Thumb. . . . .	— 8
212. „ Präsident Goselin . . . . .	— 10	225. Serratifolia multiflora . . . . .	— 10
213. „ pyramidalis . . . . .	— 6	225. Simplicicaulis . . . . .	— 8
283. Globosa fol. var. . . . .	— 8	227. Strigosa . . . . .	— 6
214. Gracilis . . . . .	— 5	228. Syringaeiflora . . . . .	— 6
284. „ fol. rubris . . . . .	— 6	229. Thymifolia . . . . .	— 10
215. Macrantha. Selten! . . . . .	2 —		

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

24 „ „ „ „ „ „

## Buntblättrige Fuchsien.

(Fuchsias à feuilles panachés.)

280. Aucubaefolia. Echt! . . . . .	— 8	284. Gracilis fol. rubris . . . . .	— 6
281. Cloth of Gold . . . . .	— 8	285. Meteor . . . . .	— 6
282. Corymbiflora fol. albo var. —	10	286. Pillar of Gold. . . . .	— 8
283. Globosa fol. var. . . . .	— 8		

## Gazanien.

Prächtige, den ganzen Sommer hindurch blühende Pflanzen für Freiland-Gruppen.

Grandiflora. — Pectinata. — Souci. — Splendens. —

Splendens fol. var. (Vide Neuheiten.)

à Sorte 4 Gr. — 12 Stück 1 Thlr. 6 Gr.

## HELIOTROPIMUM.

## Neuere Heliotropium.

Ganz vorzügliche Züchtungen der Herren Crousse und Twrdy.

38. Étoile des Bleus (Cr.). Grosse dichte Dolden, violettblau m. weissem Auge. Kräftige, reichblühende Sorte.	36. Gigantiflorum (T.). Enorme Dolde, grösser als Guascoi, zart lila, weisse Mitte.
41. Fürst Metternich (T.). Sammet-schwarzviolet mit Purpurschimmer u. breitem weissen Auge.	42. Graf Belcredi (T.). Sammet-schwarzviolet mit schneeweissem Auge, sehr dichte Dolde.



- |   |  |
|---|--|
| <p>43. <b>Gräfin Leop. Thun</b> (<i>T.</i>) Grösste Blume unter den Heliotropien, schwärzlich purpurviolett in Carmin spielend, weisse Mitte, enorme Dolde.</p> <p>35. <b>Landgräfin v. Fürstenberg</b> (<i>T.</i>) Hellaschgrau, Riesendolde.</p> <p>37. <b>Roi des Doubles</b> (<i>Cr.</i>) Sehr dicke Dolde mit extra gefüllten Blumen, lebhaft lila mit weissem Auge. Zwergsorte.</p> | <p>44. <b>Sensation</b> (<i>T.</i>) Schwarzzindigo mit breitem weissen Auge.</p> <p>39. <b>Souvenir de Leopold I.</b> (<i>Cr.</i>) Dunklestes aller Heliotropien. Belaubung schwarzgrün, Dolden schön rund, dunkelblau, fast schwarz m. weissem Auge.</p> <p>40. <b>Vestale</b> (<i>Cr.</i>) Grosse, häufig gefüllte Blumen in grosser dichter Dolde, blassviolett mit lilaweissem Auge.</p> |
|---|--|

Die Sorte nach freier Auswahl 8 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

## Aeltere Sorten.

- |  |  |
|--|--|
| <p>27. <b>Étoile Bordelaise</b> (<i>Lem.</i>).<br/>6. <b>Général Valhubert.</b><br/>29. <b>Guascoi</b> (<i>Mackoy</i>).<br/>8. <b>Indiana.</b><br/>9. <b>John Cottel.</b><br/>13. <b>Mad. Lancezeur.</b><br/>11. <b>Mad. Milleret</b> (<i>Bern.</i>).<br/>12. <b>Mad. Rendatler</b> (<i>Lem.</i>).</p> | <p>13. <b>Napoléon III.</b><br/>14. <b>Nec plus ultra</b> (<i>Lart.</i>).<br/>28. <b>Ornement des Jardins</b> (<i>Lart.</i>).<br/>25. <b>Reine des Héliotropes</b> (<i>Lem.</i>).<br/>26. <b>Reine d'hiver</b> (<i>Lart.</i>).<br/>16. <b>Roi des Héliotropes</b> (<i>Prad.</i>).<br/>19. <b>Triomphe de Poissy</b> (<i>C.</i>).</p> |
|--|--|

Die Sorte 4 Gr. — 12 Sorten 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

# LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenspiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

- |  |   |
|--|---|
| <p>17. <b>Alba magna</b> (<i>Demay</i>). Grosses Bouquet von schneeweissen Blumen m. lebhafter Mitte.</p> <p>8. <b>Archimède</b> (<i>Crousse</i>). Weiss m. gelbem Auge.</p> <p>22. <b>Atalante</b> (<i>Bruant</i>).<br/>23. <b>Conqueror</b> (<i>B.</i>).<br/>24. <b>Coquette</b> (<i>B.</i>).<br/>25. <b>Didon</b> (<i>B.</i>).<br/>5. <b>Docteur Demange</b> (<i>Rdtlr.</i>).<br/>6. <b>Éclatante</b> (<i>Rdtlr.</i>).<br/>26. <b>Elegantissima</b> (<i>Br.</i>).<br/>2. <b>Flava lilacina.</b><br/>9. <b>Fulgens mutabilis</b> (<i>Hd.</i>). Gelb, später in orangencarmine übergehend.</p> <p>15. <b>Gloire de Solferino</b> (<i>Bouch.</i>). Hellgelb in scharlach ponceau übergehend.</p> <p>27. <b>Grandiflora</b> (<i>Br.</i>).<br/>4. <b>L'Abbé Touvre</b> (<i>Rdtlr.</i>).<br/>1. <b>Lutea Kermesina.</b><br/>12. <b>Madame Caillot</b> (<i>Bouch.</i>). Strohgelb,</p> | <p>in rosa übergehend, lachsfarben nüancirt.</p> <p>14. <b>Madame Thibaut</b> (<i>Bouch.</i>). Goldgelb, mit breiter, scharlachrother Mitte.</p> <p>28. <b>Mrs. Boucharlât aîné</b> (<i>Br.</i>). 8 Gr.<br/>29. <b>Mrs. Rougier-Chauvière</b> (<i>Br.</i>). 8 Gr.<br/>16. <b>Nec plus ultra</b> (<i>Rdtlr.</i>). Purpurroth, die inneren Blumen der Dolde mit goldgelbem Centrum, sehr gross.</p> <p>11. <b>Pelopidas</b> (<i>Rdtlr.</i>). Dunkelamaranth, Mitte goldgelb.</p> <p>13. <b>Prince Impérial</b> (<i>Bouch.</i>). Goldgelb in rosa übergehend.</p> <p>30. <b>Roi des Pourpres</b> (<i>Br.</i>). 8 Gr.<br/>3. <b>Rosea elegans</b> (<i>Nivert</i>).<br/>18. <b>Safrano</b> (<i>Dem.</i>). Schwefelgelb, Centrum orange in lachsrosa übergehend, grosse Blume u. Dolde.</p> <p>32. <b>Solfatare</b> (<i>Br.</i>). 8 Gr.<br/>7. <b>Surpasse l'Abbé Touvre</b> (<i>Rdtlr.</i>).<br/>19. <b>Triomphe de l'Exposition</b> (<i>Ferr.</i>).<br/>10. <b>Virgile</b> (<i>Nivert</i>).</p> |
|--|---|

Die Sorte, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 5 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

Die Lantanen bilden in Verbindung mit dem vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermassen gegenseitig ergänzen; denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt das andere durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.

## LOBELIA ERINUS.

### Neuere Varietäten.

Die Lobelien bilden mit ihren lieblichen, massenhaften blauen Blumen eine unersetzbare Pflanze für kleine Mosaikgruppen und Einfassungen.

	Thlr. Gr.
1. <i>Alba coerulea</i> . Weiss mit hellblau . . . . .	— 3
4. <i>Compacta Usheri</i> . Tief himmelblau . . . . .	— 3
5. <i>Picturata (Hend)</i> . Neu! Weiss, blau gerandet . . . . .	— 8
2. <i>Princesse Alexandra</i> . Himmelblau mit weiss . . . . .	— 3
3. <i>Prinz Albert</i> . . . . .	— 3
12 Stück 1 Thlr.	

### Lobelia (perennirend).

Dieses schöne Genus ist in Gartenanlagen kaum zu entbehren, denn es entwickelt seine, in den abwechselndsten Farben prängenden Blumen von Ende Juni bis im October, wo man die Ballen heraushebt und an einem trockenen Raume überwintert. Dieselben eignen sich besonders auch zur Topfcultur.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
1. <i>Fulgens</i> . Alte bewährte Prachtsorte . . . . .	— 5	6. <i>Hybrida Roi des Bleus</i> . Dunkelblau	
12. „ <i>multiflora</i> . Prächtigt leuchtend scharlach . . . . .	— 8	<i>m. weissem Schlund</i> . . . . .	— 8
8. <i>Hybrida alba grandiflora</i> . Rein weiss, schwach bläulich geädert . . . . .	— 10	3. „ <i>rubra sanguinea</i> . Hell blutroth mit weissem Auge . . . . .	— 8
9. „ <i>carminata</i> . Scharlach carmin . . . . .	— 8	3. „ <i>Sappho</i> . Sammtig carmoisin-purpur . . . . .	— 8
10. „ <i>Ceres</i> . Hellpurpur . . . . .	— 8	4. „ <i>syphilitica grandiflora rosea</i> , carminrosa <i>m. hell Schlund</i> . . . . .	— 8
11. „ <i>Empereur des Lobelias</i> . Dunkel blutroth . . . . .	— 8	<b>Tupa</b> <i>Feuillei</i> . Abgebildet im deutschen Garten-Magazin . . . . .	— 10
2. „ <i>Koning der Lobelias</i> . Violet . . . . .	— 8	<i>Bridgesi</i> . . . . .	— 10
5. „ <i>Leo Lespes</i> . Dunkelrosa . . . . .	— 8	6 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.	

## Remontant-Nelken.

### Oeillets remontants ou perpétuels.

Dieses neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, dass dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und ausserdem, wenn man sie zu rechter Zeit im Herbst in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer einen prächtigen Winterflor entwickeln. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar.

Auswahl nur guter, zum Theil neuer Sorten.

46. *Alphonse Karr (Alég)*. Weinroth, purpur gestrichelt. 15 Gr.
47. *Belle Zora (Dal)*. Rosa, carmin nüancirt. 15 Gr.
28. *Bossuet (Alégatière)*. Matt scharlach, braunroth gestreift.
21. *Brutus (Al)*. Blass rosa, ziegelroth geflammt, kirschbraun gestrichelt.
48. „ *(Alég)*. Weinroth, amaranth gestreift u. bandirt.
5. *Canrobert (Al)*. Röthlich nankingfarben, purpur gestreift.
31. *Ch. Rouillard (Al)*. Strohgelb, Saum in rosa Strichen.
3. *Charles Baltet (Al)*. Hellroth, lebhaft purpurn gestreift.
36. *Dame blanche (Ald)*. Schneeweiss.
64. *De Candolle (A)*. Aprikosengelb, grau-roth geflammt.
32. *Docteur Kaiser (Al)*. Brennend roth, Mitte lachsfarben. 15 Gr.
33. *Eugénie Ducreux (Al)*. Rosa, rothbraun bandirt u. gestreift.
20. *Flambeau (Al)*. Rosa *m. orange* Flammen, kirschbraun gestreift u. gestrichelt.
2. *Flambeau ardent (Al)*. Nankinggelb, scharlach u. purpur geflammt, braun gestreift.
65. *Florian (Al)*. Ponceau mit carmoisin gestrichelt. Zwergart.



39. **Gloire de Lille** (*Ald.*). Lilarosa, scharlach u. dunkelrosa geflammt, braun gestreift.
35. **Gloire de Montplaisir**. Feuerroth u. carmoisin gestreift.
  1. **Hébé** (*Al.*). Gelb, rosa verwaschen, carmoisin gestreift.
  6. **Jacquard** (*Al.*). Roth mit dunkleren Streifen.
29. **James Veitch** (*Al.*). Hellroth, ponceau geflammt, purpur gestreift.
49. **Jeanne Alégatière** (*Alég.*). Schieferfarben, hell u. purpurroth gestreift.
30. **Jeanne d'Arc** (*Ald.*). Purpurcarmoisin, mit grauem Reflex.
25. **La Belgique** (*Al.*). Chamois, hellroth geflammt.
7. **Le fleurifère** (*Al.*). Weiss mit rosa getuscht. Reichblühend.
51. **Le signe** (*Alég.*). 15 Gg.
8. **L'Hermine** (*Al.*). Rein weiss.
52. **Londres** (*Alég.*). Purpur, nach der Mitte lachsrosa.
53. **Louis van Houtte** (*Alég.*).
26. **Mad. Debelfort**. Weiss mit violettem Saum. Zwergart. 12 Gr.
40. » **Malet** (*Aldebert*). Weiss, violet bandirt u. punktirt.
19. » **Nardi** (*Al.*). Schiefergrau, stark mit kirschroth gestreift u. amaranthrothlinirt.
11. **Malakoff** (*Al.*). Rein weisse Zwergart.
37. **Mignonette** (*Ald.*). Carminrosa, nach den Rändern weiss geflammt.
  9. **Mlle. Willermoz** (*Al.*). Rosa, purpurn gebändert u. gestreift. Zwergart.
15. **Moïse** (*Al.*). Bibl. unten gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
12. **Mr. Decombe** (*Al.*). Grau lilarosa, carmoisin geflammt.
10. **Mr. Gourdault** (*Al.*). Ponceau mit graucarmoisin gestrichelt.
4. **Mrs. Maclean** (*Hend.*).
16. **Nancy** (*A.*). Strohgelb, rosa marmorirt, kirsch- u. amaranthroth gestreift.
17. **Nelson** (*Al.*). Helleanariengelb, röthlich geflammt u. gestrichelt.
14. **Petit Saint-Antoine** (*Al.*). Dunkelpurpurn. Zwergart.
27. **Plule d'or** (*Al.*). Auroragelb, leicht schieferfarben nüancirt u. kirschroth geflammt.
23. **Priame** (*Al.*). Carmoisin, purpurviolet bandirt.
24. **Roitelet** (*Al.*). Chamois-rosa, purpurviolet gestreift u. gestrichelt.
34. **Souvenir de la Malmaison** (*v. H.*). Blume sehr gross, stark gefüllt. Colorit der Rose Souvenir de la Malmaison. 15 Gr.
38. **Triomphe** (*Ald.*). Scharlachroth, weiss gefleckt.
56. **Zuave** (*Alég.*). 15 Gr.

**Neueste Sorten, vide pag. 20.**

Jede Varietät, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 8 Gr.

Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr. 10 Gr.

24. **Mrs. Lewis**. Vorzügliche schottische Federnelke, Mitte u. Ränder rein weiss, dunkelpurpurn bandirt. 6 Gr. 12 Stück 2 Thlr.

## Pelargonium.

Neuere und Auswahl älterer Sorten.

Von den, den nachstehenden Sorten beigefügten Chiffren bezeichnet

- D. Diadematum.
- E. Englische grossblumige.
- O. Fünffleckige (*Odier*).

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Adèle Odier</b> (<i>Odier</i>). Obere Pet. purpurrosa, schwarz gefleckt. Untere Pet. fleischfarben, schwarz gefleckt. O.</li> <li>148. <b>Agnes</b> (<i>Heass.</i>). Leuchtend dunkelvioletcarmin, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. O.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>68. <b>Alma</b> (<i>Duoal</i>). Lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. O.</li> <li>47. <b>Alphonse Leroy</b> (<i>Duo.</i>). Dunkellachsroth mit lilarosa Saum, alle Pet. schwarzbraun gefleckt. O.</li> <li>147. <b>Amalia</b> (<i>Heass.</i>). Eläulich dunkelcarmin,</li> </ol> |
|--|--|

- obere Pet. schwarz purpur gefleckt. Centr. rosa. *O.*
44. **Amelia Duval** (*Od.*). Rein weiss, obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. *O.*
3. **Angelica**. Fleischrosa, obere Pet. schwarz gefleckt u. purpur untertuscht. *E.*
217. **Anna Duval** (*Duv.*) Amethystroth im Centr. rosa, an der Basis eines jeden Blbl. braun geädert. *D.*
187. **Archimède** (*Roug & Chauv.*) Dunkelkirschroth, alle Blbl. schwarz belegt. Centr. lila. *D.*
227. **Ardens** (*Beck*). Dunkelcarminrosa, Centr. heller. *E.*
193. **Armida** (*R. & Ch.*). Obere Pet. braunpurpur, schwarz belegt, carmoisin unterwaschen, mit rosalila Saum. Untere Pet. rosalila. carmoisin geädert, kastanienbraun gefleckt. *O.*
69. **Beauté de Rochefort**. Leuchtend kirschroth; obere Pet. braun gefleckt, rosa umsäumt. Centr. rosa.
311. **Beauté parfaite** (*H. D.*). Johannisbeerroth mit purpur u. violetem Reflex, ganz fein lila gesäumt, Centr. weiss; obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*
166. **Beelzebub** (*Miell.*). Leuchtend zinnoberroth, schwarz gefleckt; gute Blume. *O.*
4. **Bella**. Obere Pet. kupferrosa, braun geädert und purpur gefleckt. Untere Pet. zartrosa, purpurgefleckt. *O.*
252. **Benoiton** (*Lem.*).
5. **Bicolor** (*M.*). Weiss, lila belegt, violet carmoisin geädert. Obere Pet. purpur gefleckt.
282. **British Saylor** (*Hoyle*). Brauncarmoisin, dunkelbraun gefleckt, leicht rosa gesäumt, sehr grosse Blume. *E.*
17. **Caliban** (*Od.*). Weiss, alle Pet. schwarz auf feurig carmin gefleckt. *O.*
292. **Candidum** (*H. D.*). Carmin violet, schwarz belegt, mit sehr breitem, weissen Saum. *O.*
236. **Censor** (*Foster*). Obere Pet. magentaroth, auf feuerroth schwarz belegt; untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein. *E.*
52. **Cervantes** (*Malet*). Obere Pet. feuerfarben, mit grossen schwarzpurpur Flecken, rosa umsäumt. Untere Pet. bläulich lachsroth.
71. **Cleoron** (*Mal.*). Atlasweiss, leicht violet geädert mit fünf grossen schwarzpurpur Flecken. *O.*
117. **Clio** (*Charp.*). Dunkelrosa u. purpur mit bläulichem Schein, weissem Centr. u. hellem Saum. Alle Pet. schwarzbraun gefleckt.
190. **Comte de Montelmar** (*Mezard*). Centrum weiss, nach aussen rosa, Pet. carmoisin purpur, leicht braunpurpur gefleckt. *D.*
151. **Comte de Preston**. Zartrosa, alle Blbl. schwarzpurpur gefleckt und carmin geädert. *O.*
50. **Comtesse de Bresson** (*Duv.*). Obere Pet. schwarz auf ponceau gefleckt. Untere Pet. lebhaft hochrosa, leicht gefleckt. Die ganze Blume hell gesäumt. *O.*
115. **Crecelle** (*M.*). Purpurcarmoisin. Centr. lila. *D.*
33. **Criterion** (*M.*). Dunkellachsrosa, obere Pet. schwarzbraun auf feuerroth gefleckt.
8. **Cuypp**. Rein weiss, obere Pet. leicht violet gefleckt.
89. **Cynthia** (*Hoyle*). Obere Pet. schwarzpurpur mit kirschrothem Saum. untere Pet. lachsrosa. *E.*
149. **Der Bräutigam** (*Hvass*). Feurig rosa, blass rosa verwaschen; obere Pet. schwarz gefleckt; untere Pet. leicht braun gefleckt. Centr. lila. *O.*
246. **Diadem** (*Hoyle*). Obere Pet. purpurcarmoisin, sammetig schwarz belegt, untere Pet. magentaroth. Centr. sehr gross, reinweiss. Herrliche Färbung. *E.*
111. **Diadematum** (*Beaton*). Rosa.
142. **Die Hexe** (*Hv.*). Weiss, grosse schwarze Flecken, auf carmin Aderung. *O.*
143. **Die Muhme** (*Hv.*). Rosenroth, carmin verwaschen, schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
197. **Domino noir** (*R.-Ch.*). Obere Pet. purpur, schwarz belegt, ponceaurosa umsäumt. untere Pet. hochrosa schwarz gefleckt mit carmin Adern. *O.*
167. **Duc de Magenta** (*M.*). Feuerroth mit breitem rosa Rande, auf allen Pet. schön schraffierte schwarze Flecken. *O.*
94. **Duc de Malakoff**. Dunkelrosa, carmin verwaschen; obere Pet. feuerroth, schwarz belegt u. rosa gesäumt. Centr. weiss. *E.*
65. **Duchess of Malborough** (*Low.*). Feurig roth mit orange Reflex. Centr. rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
95. **Egide Gavazzi** (*Roug.*). Hochroth, Centr. lila; obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*
185. **Endymion** (*Malet*). Lebhaft rosa, alle Blbl. braun gefleckt. Centr. weiss. *O.*
313. **Erebus** (*H. D.*). Dunkelkastanienbraun mit feuerrothem Reflex, rosa gesäumt. Centr. fleischfarbig. *D.*
60. **Eugénie Dauphré** (*Dufouy*). Obere Pet. bläulichcarmin, schwarz gefleckt u. rosa gesäumt. Untere Pet. carmoisin mit lila Schein u. rosa Saum. Centr. weiss.
96. **Eva** (*Hoyle*). Rosenroth. Centr. weiss, obere Pet. feuerfarben, schwarz belegt mit rosa Saum. *E.*
97. **Evelyne** (*Beck*). Feurig carminrosa, mit weissem Centr. u. rosa Saum, obere Pet. leicht braun gefleckt. *D.*
125. **Fanty** (*Roll.*) Obere Pet. carmin, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. hochrosa mit schwarzen Adern, in feuerrothen Flecken. *O.*
72. **Felix Crousse** (*Crousse*). Grosse Blume, oft mit sechs und sieben Pet., leuchtend feuerroth mit kastanienbraunen Flecken. *O.*
222. **Feu de Joie** (*Turner*). Obere Pet. scharlach, schwarz belegt mit rosa Saum. Untere Pet. orangerosa, leicht zinnober gefleckt, rosa gesäumt. Centr. weiss. *D.*
98. **Feu incomparable** (*H. D.*). Scharlach, alle Pet. schwarzbraun gefleckt. *O.*
162. **Fishermann** (*Turn.*). Obere Pet. ponceau-carmin, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum, untere Pet. fleischrosa, purpur gefleckt. *O.*
99. **Florette** (*Hoyle*). Dunkelrosa, obere Pet. schwarz auf purpur, rosa umsäumt.
53. **Franklin** (*Mal.*). Lebhaft carmoisin, obere Pet. schwarz gefleckt. *O.*
61. **Frédéric Myllus** (*Miell.*) Carminroth, purpur schattirt. Centr. weiss, schwarz gefleckt. *O.*
11. **Gloire de Bellevue** (*Od.*). Pfirsichrosa, schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *O.*
74. **Gloire de Nancy** (*Crousse*). Obere Pet. dunkelrosa, carmin niancirt und schwarz belegt. Untere Pet. pfirsichrosa carmin gefleckt. *O.*
100. **Gloire de Paris** (*Quillard*). Carminrosa, obere Pet. an der Basis leicht braun geädert. Centr. rosa.
296. **Gloire du petit Bicêtre** (*Duv.*). Dunkelkirschbraun, leicht schwarz gefleckt. Centrum lilarosa. *O.*
81. **Golden Hue** (*Low.*). Zinnoberrosa, obere Pet. scharlach, schwarz belegt.

75. **Grand-Duchesse Stephanie** (*Duc.*). Feuerig carmoisin, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
152. **Grand Lina.**
163. **Guido** (*Turn.*). Obere Pet. schwarz u. feuerroth, die unteren dunkelrosa mit schwarzen Flecken.
153. **Gustave Max.** Gross. Grund weiss, rosa angehaucht, obere Pet. carmin schattirt und schwarz belegt, die untern mit kleinen purpur Flecken. *O.*
76. **Horace** (*Mal.*). Leuchtend orangeroth, sämmtliche Bibl. schwarz gefleckt. *O.*
154. **Hortense Parent.** Lila, schwarz gefleckt und carmoisin untermalt. Blume leicht gewellt. *O.*
198. **Japhet** (*R. & Ch.*). Blume sehr gross, braun und feuerroth, nach aussen rosa mit weissem Rande. *E.*
123. **Inkermann** (*Duv.*). Carmoisinrosa, grau bedeckt, schwarzbraun belegt, untere Pet. orangerosa, leicht braun gefleckt. Centr. weiss. *O.*
214. **Inimitable** (*H. D.*). Die 5 Bibl. schwarzbraun belegt, amaranthviolett geädert, mit breitem lilaweißen Saum. *O.* Extra!
283. **John Hoyle** (*Hoy.*). Purpur mit orange Schein, obere Pet. fast schwarz. Centr. weiss. *E.*
172. **John Metzger** (*Crousse*). Reinweiss, obere Pet. braunpurpur gefleckt. *E.*
126. **Irène** (*Rolliss.*). Obere Pet. schwarzbraun auf blutroth. Grunde, blasserosa umsäumt; die untere Pet. blasserosa. *O.*
101. **Iris** (*Foster*). Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum, untere Pet. hochrosa, Centr. weiss.
244. **Jules Aldebert** (*Ald.*). Sammetig purpur mit schwarzem Reflex, rosa umsäumt. Centr. weiss. *D.*
177. **Jules Despont** (*Bouch.*). Carmoisin mit lila verwaschen, alle Bibl. leicht braun gefleckt. Centr. weiss. *O.*
129. **Julia** (*Roll.*). Obere Pet. feuerroth, sammetig schwarz belegt, mit blasserosa Saum, untere Pet. carminrosa, purpur gefleckt. *O.*
66. **Jung Bahador** (*Hend.*). Hellkirschroth mit schwarzpurpur Flecken. *O.*
211. **Junon** (*Malet*). Lebhaft kirschrosa, hellbraun gefleckt. Centr. weiss. *O.*
186. **King of Pourples** (*Turner*). Obere Pet. ponceaurosa schwarz gefleckt, untere Pet. carmoisinrosa, zinnober gefleckt. *O.*
113. **La belle Alliance** (*Miell.*). Obere Pet. ponceauscharlach, schwarz belegt, mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. zart rosa, purpur gefleckt.
42. **Lady Mildmay** (*Hvass.*). Weisslichrosa, obere Pet. schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *E.*
130. **Lampetia** (*Roll.*). Obere Pet. feurig purpur mit grossen schwarzen Flecken, rosa umrandet. Untere Pet. blasserosa purpur gefleckt, dunkelrosa geädert. *O.*
118. **L'Aristote** (*Chapp.*). Lebhaft rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
13. **Laura** (*Beck*). Hochrosa, obere Pet. dunkelrosa, tiefschwarz auf feuerroth gefleckt. Centr. weiss. *E.*
54. **La Vestale** (*Lem.*). Silberweiss, purpurviolett gefleckt. *O.*
202. **Leda** (*Miell.*). Obere Pet. leuchtend rosa, weiss gesäumt, mit grossen schwarzpurpur Flecken, untere Pet. bläulichrosa, schwarz gefleckt, Saum weiss.
133. **Le Nègre** (*Miell.*). Braunpurpur rosa umsäumt, jedes Bl. schwarz gefleckt. *O.*
179. **Lion des combats** (*Bouch.*). Pfirsichrosa, dunkelrosa geädert, carmin gefleckt. Centr. weiss. *O.*
64. **Leonidas** (*Miell.*). Ponceauroth, dunkelkastanienbraun gefleckt, obere Pet. zuweilen ganz braun. *O.*
90. **Letitia** (*Beck.*). Obere Pet. feuerroth, schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, leicht carmin geädert. Centr. weiss. *E.*
218. **Le Vésuve** (*Duv.*). Feuerig zinnober, die oberen Pet. braun gefleckt. *D.*
124. **Lotty** (*Roll.*). Hochroth, schwach lila umsäumt, schwarz gefleckt. *O.*
104. **Louise Mieliez** (*Miell.*). Amaranthroth, alle Pet. braun belegt. Centr. rosa, Blume mit wellenförmigem Rande. *O.*
212. **Mad. Alphonse Favre** (*Duv.*). Bläulichrosa, Centr. u. Saum weiss, jedes Bibl. leicht braun gefleckt. *O.*
201. **Mad. Amalie Werlé** (*Mez.*). Leuchtend ponceaurosa mit hellem Saum u. Centr. Jedes Bibl. schwarz gefleckt. (*O.*)
105. **Mad. Armet de Lisle** (*Roug.*). Dunkelpfirsichrosa, Centr. weiss. Obere Pet. carmin geädert, mit grossen braunpurpur Flecken; untere Pet. leicht carmin gefleckt. Rand wellenförmig.
45. **Mad. Barneau.** Weiss mit viol. Flecken. *O.*
78. **Mad. Boncharlat** (*Miell.*). Roth mit carmin Anflug und schwarzen Flecken. *O.*
14. **Mad. Corbay** (*Miell.*). Bläulich kirschroth, rosa umsäumt. Obere Pet. schwarz gefleckt. Centr. weiss.
188. **Mad. Courcier** (*Duv.*). Purpur mit feurigem Reflex; jedes Bibl. schwarz belegt. Centr. weiss. *D.*
79. **Mad. Crousse** (*Crousse*). Sehr gross, helllila mit schwarzen und purpurvioleten Flecken. *O.*
200. **Mad. Dusautay** (*Mez.*). Lila carmoisin belegt, Centr. und Saum weiss; obere Pet. schwarz purpur gefleckt. *D.*
37. **Mad. Fardato** (*Miell.*). Hochrosa mit 5 grossen braunpurpur, carminponceau verwaschenen Flecken. *O.*
180. **Mad. Gaudet** (*Bouch.*). Grosse Blume mit wellenförmigem Rande, obere Pet. fleischrosa mit grossen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa, regelmässig purpurbraun geflammt. *O.*
242. **Mad. Hector Blomir** (*Ald.*). Carminrosa, lila verwaschen, jedes Bibl. weiss gesäumt und dunkelbraun gefleckt. Centr. weiss. *O.*
15. **Mad. Leflo** (*Od.*). Pfirsichrosa. Obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. *O.*
134. **Mad. Lelandais** (*Miell.*). Carmoisin mit lila verwaschen und weiss gesäumt. Jedes Bibl. an der Basis braun geädert. *E.*
168. **Mad. Lemolne** (*Miell.*). Carminroth mit breitem weissen Rande, die oberen Pet. braun gefleckt, die unteren lila schattirt. *D.*
157. **Mad. Leroy** (*Duv.*). Lebhaft rosa mit carmin untertüschten schwarzen Flecken. *O.*
48. **Mad. Leseble** (*Duv.*). Purpur, Centr. weiss, jedes Bibl. schwarz belegt. *D.*
206. **Mad. Lierval** (*Malet*). Amaranthbraun, alle Bibl. schwarz gefleckt. *O.*
140. **Mad. Morel.** Purpurcarmoisin, obere Pet. schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
159. **Mad. Reiset** (*Mal.*). Leuchtend kirschroth, obere Pet. mit grossen schwarzbraunen, die unteren mit schwarzen Flecken. *O.*
16. **Mad. Scribe** (*M.*). Zinnoberrosa, obere Pet. schwarzbraun auf scharlach belegt, Grund carmoisin.
155. **Mad. Tasson.** (*Sim.*) Lebhaft kirschroth, alle



- Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss, in lila verlaufend. *O.*
51. **Mad. Thibaut** (*Duv.*). Atlasweiss mit 5 purpurcarmoisin Flecken. *O.*
116. **Mad. von Houtte** (*Miell.*). Carmoisinrosa, mit bläulichem Schein. Centr. weiss. lila gesäumt, obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*
156. **Magenta** (*Duv.*). Dunkelrosa mit bläulichem Schein, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
190. **Mammuth** (*Turner*). Lebhaft rosa, die purpurbraun. Flecken carmin unterwaschen. *O.*
241. **Marchal Forey** (*Ald.*). Carmoisin. Centr. weiss, obere Pet. sammetig schwarzpurpur belegt, untere Pet. purpur gefleckt und geadert. Sehr grossblumig. *O.*
144. **Maria** (*Heass*). Blass lilarsa, mit carmin untertuschten schwarzen Flecken. *O.*
316. **Maria** (*H. D.*). Obere Pet. dunkelpurpur, nach dem Rande zu schiefergrau in rosa, untere Pet. ponceaurosa mit purpur Flecken u. Adern. Centr. gross weiss. Sehr gute Färbung. *D.*
161. **Marie Massinon**. Weiss, rosa angehaucht, mit dunklen carmin untertuschten Flecken. Auffallende Blume. *O.*
18. **Mary**. Obere Pet. braunpurpur, rosa umsäumt, untere Pet. zartrosa, leicht zinnober gefleckt. *E.*
284. **Mary** (*Hoyle*). Lebhaft hochrosa, dunkelbraun gefleckt. Centr. weiss. *E.*
119. **Masaniello** (*Charp.*). Hell Johannisbeerroth, Centr. weiss. Obere Pet. schwarzbraun gefleckt. *D.*
194. **Matteo Spada** (*R.-Ch.*). Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit weissem Saum, untere Pet. rüthlichweiss, purpur gefleckt. *O.*
131. **Menestho** (*Koifiss*). Orangeroth, rosa gesäumt. Centr. weiss. *D.*
243. **Mess. Thibaut & Kételeer** (*Ald.*). Lebhaft carminroth, bläulich marmorirt. Centr. weiss. Jedes Blbl. schwarz purpur gefl. *O.*
173. **Meyerbeer** (*Crousse*). Obere Pet. purpur carmoisin, braun belegt, untere Pet. hellcarmoisin purpur gefleckt. *O.*
248. **Miss Burdet Coutts** (*Foster*). Obere Pet. purpur mit dunkelrosa Saum, schwarz belegt, untere Pet. carmoisinrosa mit orange Schein. Centr. weiss. *E.*
93. **Miss Nutrie** (*Foster*). Lebhaft rosa, obere Pet. schwarz auf ponceau gefleckt, untere Pet. leicht carmin verwaschen. Centrum weiss. *E.*
178. **M. Lorange de St. André** (*Bouch.*). Obere Pet. purpurcarmoisin mit grossen schwarzen Flecken, untere Pet. carmoisin. Centr. bläulich rosa, ganze Blume fein rosa gesäumt. *E.*
151. **Modèle** (*Miell.*). Obere Pet. violet mit weissem Saum u. schwarz gefleckt., untere lila u. schwarz gefleckt. *O.*
88. **Monarch** (*Low.*). Obere Pet. schwarz, purpur u. rosa umsäumt. Untere Pet. hochrosa. carmin geadert. Centr. weiss. *E.*
238. **Monsieur van der Straten**.
56. **Montezuma** (*Charp.*). Feurig carmoisin mit hellem Saum u. 5 grossen schwarzpurpur Flecken. *O.*
21. **Mrs. Standish**. Pfirsichrosa. Obere Pet. blutroth verwaschen, schwarz belegt. *E.*
250. **Mrs. de Pontbriant** (*Bouch.*). Carmoisin mit bläulichem Schein. Centr. lila, jedes Blbl. leicht braun gefleckt. *D.*
122. **Mrs. Rodriguez** (*Mal.*). Ponceaurosa, jedes Blbl. schwarz belegt. Centr. weiss. *O.*
108. **Mr. Salandrini** (*Roug.*). Obere Pet. tiefrosa, carmin geadert u. schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, braunpurpur gefleckt. *O.*
215. **Murillo** (*H. D.*). Grundfarbe kirschroth, die Pet. stark sammtig schwarz belegt, lebhaft rosa gesäumt. *E.*
22. **Napoleon III.** (*Miell.*). Obere Pet. dunkelkastanienbraun mit feuerrothen Flammen u. dunkelrosa Saum. Untere Pet. ponceaurosa, schwarz gefleckt. *O.*
41. **Nectar Cuyp**. Lilarsa. Centr. weiss, jedes Blbl. schwarzpurpur gefleckt. *O.*
224. **Nina** (*Bull*). Centifolienrosa, jedes Blbl. schwarz auf purpur gefleckt. *O.*
209. **Nestor** (*D.*). Obere Pet. schwarzbraun mit carmoisinrothem Rande, untere Pet. kirschroth leicht braun bemalt. Centr. weiss in lila verlaufend. *D.*
158. **Oscar Leséble** (*Duv.*). Rein weiss, purpurviolet gefleckt. *O.*
73. **Othello** (*Foster*). Obere Pet. feurigcarmoisin, schwarz belegt. Untere Pet. dunkelrosa mit bläulichem Schein. *E.*
23. **Pandora** (*Miell.*). Carmoisinroth mit bläulichem Schein rosa umsäumt. Centr. weiss. Obere Pet. dunkelbraun belegt. *D.*
164. **Peacock** (*Turn*). Obere Pet. ponceau, schwarz belegt u. pfirsichrosa Saum. Untere Pet. rosa, leicht weiss verwaschen, brauncarmin gefleckt. *O.*
120. **Perrugino superbum** (*Miell.*). Pfirsichrosa carmin geadert, jedes Blbl. mit einem grossen braunpurpur Flecken. *O.*
139. **Phylomèle** (*Miell.*). Feurig ponceauzinnober, obere Pet. schwarz gefleckt; vielblumig. *E.*
67. **Plénie** (*II.*). Purpurcarmoisin, obere Pet. stark, untere Pet. leicht braun gefleckt. Musterblume. *D.*
106. **Pluto** (*Foster*). Obere Pet. dunkelrosa scharlach belegt u. blutroth gefleckt mit rosa Saum. Untere Pet. lilarsa. zinnoberf. belegt. Centr. weiss. *E.*
25. **Prince of Orange**. Orangescharlach, obere Pet. schwarz gefleckt. *E.*
226. **Princess of Hesse** (*Bull*). Obere Pet. sammetig purpur, schwarz belegt, untere Pet. hochrosa, ponceau belegt. Sehr grosses weisses Centrum. *E.*
287. **Princess of Wales** (*Beck*). Leuchtend rosa, die obere Pet. purpur gefleckt, die unteren scharlach belegt. *E.*
196. **Psyche** (*R.-Ch.*). Dunkelcarminrosa, Centr. weiss, obere Pet. dunkelbraun belegt, untere Pet. leicht braun gefleckt. *O.*
303. **Queen of Spots** (*Turn*). Magentaroth, schwach braun geadert, alle Blbl. mit grossen schwarz. Flecken. Centr. rosa. *O.*
304. **Queen of the Whites** (*Dobson*). Weiss mit ganz zarter lila Aderung u. 5 grossen braunpurpur Flecken. *O.*
62. **Raphael** (*Low.*). Die ganze Blume carminpurpur, die obere Pet. zuweilen schwarz belegt. Centr. rosa. Schöne Färbung.
27. **Regulus** (*Miell.*). Helllila, obere Pet. schwarz u. purpur belegt, untere Pet. an der Spitze mit bläulichcarmin Flecken belegt. *D.*
192. **Rifemann** (*F.*). Brennend roth mit 5 tief schwarzen Flecken. *O.*
77. **Ringleader** (*Dobson*). Obere Pet. schwarz blutroth umsäumt, untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein, leicht scharlach gefleckt u. geadert. *E.*
318. **Roi des Pourpres** (*H. D.*). Carmoisinpurpur, lila untertuscht u. gesäumt. Centr. weiss. Obere Pet. leicht braun gefleckt. *D.*
204. **Rosa Bonheur** (*Miell.*). Weiss, mit grossen purpur, carmin untertuschten Flecken. *O.*
107. **Rosamunde** (*Beck*). Carminrosa. Centr. weiss, obere Pet. braunpurpur gefleckt. *E.*
181. **Roseum undulatum** (*Bouch.*). Tief rosa,

- Centr. weiss, ob. Pet. carminrosa, schwarzbraun gefleckt. \* Blume wellenförmig mit weissem Saum. E.
232. **Rosy Bedder** (*Foster*). Dunkelrosa m. lachsfarbigem Schein, obere Pet. feuerroth, kohlschwarz gefleckt. E.
83. **Senéque** (*Malet*). Carmin mit violet u. rosa, braun geädert u. gefleckt. Centr. rosa. D.
307. **Silene** (*H. D.*). Bläulich carmoisin mit lila Saum, leicht braun gefleckt. Centr. lilarosa. O.
175. **Sir Robert Peel** (*Bouch.*). Tief rosa, alle Pet. an der Spitze scharlach belegt, obere Pet. leicht braun gefleckt. E.
59. **Solferino** (*Miell*). Zinnoberroth. Centr. bläulich, obere Pet. schwarz gefleckt. D.
235. **Souvenir** (*Fost.*). Die oberen Pet. schwarz, weinroth gerandet, untere Pet. johannisbeerroth, leicht schwarz gefleckt u. bemalt. Centr. weiss. E.
308. **Souvenir** (*H. D.*). Ob. Pet. kastanienbraun, schwarz geädert, lila umrandet, untere Pet. lilarosa, stark carmoisin geädert, purpur gefleckt. O.
92. **Sprightliness** (*Foster*). Obere Pet. schwarz m. carmin, untere rosa, im Centr. weiss. E.
165. **Star** (*Hoyle*). Obere Pet. ponceau, schwarz belegt u. zart rosa gesäumt, untere Pet. lebhaft rosa, carmin belegt. Centr. weiss. E.
84. **Stuart Low** (*Miell*). Blutroth, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. O.
128. **Suffren** (*Malet*). Carminrosa, Centr. weiss, jedes Bibl. schwarzbraun gefleckt. O.
216. **Tallsmann** (*H. D.*). Violetcarmoisin, Mitte u. Saum lila, alle Pet. schwarz gefleckt. O.
136. **Tamberlick** (*Miell*). Purpur, schwarz belegt, alle Pet. leicht lila gesäumt. O.
169. **Telemaque** (*Duv.*). Feurig kirschrosa, mit orange Schein, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. rosa. O.
112. **Tête noir**. Obere Pet. sammtig schwarz m. blutroth. Flammen. Untere Pet. orangearosa zinnrober gefleckt. Centr. weiss. E.
91. **The Bell** (*Low.*). Lebhaft kirschroth, Centr.

- u. Saum weiss, ob. Pet. dunkler u. schwarz purpur gefleckt. D.
127. **Theodosia** (*Roll.*). Feurig kirschroth, schw. gefleckt. Centr. rosa. O.
207. **Theophraste** (*Duv.*). Orangecarmin, obere Pet. leicht gefleckt. Centr. lila. D.
288. **The Prince** (*Hoyle*). Feurig carmin, obere Pet. schwarz belegt. Centr. weiss in lila verlaufend. E.
63. **Tom Brown** (*Low.*). Obere Pet. schwarz, purpur u. rosa umsäumt. Untere Pet. amethystrosa, leicht carmin gefleckt. Centr. weiss. E.
85. **Triumphans** (*Crousse.*). Sammtig purpur, schwarz belegt. Ob. Pet. fast ganz schwarz, carminrosa umsäumt. O.
183. **Unique** (*Foster*). Dunkelrosa m. bläulichem Schein, obere Pet. braun purpur gefleckt, grosses weisses Centr. D.
29. **Ver luisant**. Dunkelkirschroth, obere Pet. schwarz gefleckt. Centr. dunkelrosa. D.
171. **Vesta** (*Beaton*). Rein weiss, ob. Pet. braunpurpur gefleckt. E.
229. **Vesuvius** (*Beck*). Obere Pet. feuerroth u. schwarz, die unteren feurig orangeroth. E.
225. **Viceroy of Egypte** (*Bull.*). Obere Pet. braunpurpur, schwarz geädert m. hellem Saum. Untere Pet. kirschbraun, weiss gesäumt. Centr. bläulich. E.
309. **Victor Emanuel** (*Duv.*). Kirschrosa m. bläulichem Schein, weiss gerandet, jedes Bibl. gross dunkelbraun gefleckt. O.
30. **Virginie**. Ob. Pet. purpurviolet m. weissem Saum. Untere Pet. rein weiss. E.
86. **Virginie Mieliez** (*Miell*). Kirschroth, rosa umsäumt, ob. Pet. leicht schwarz gefl. D.
319. **Voltaire** (*Malet*). Amaranthpurpur m. weissem Saum, schwarz gefleckt. Centr. weiss in lila verlaufend. D.
87. **William Bull** (*Miell*). Sehr grosse Blume. brillant scharlach, alle Pet. schwarz gefl. Centr. rosa. O.
31. **Zeno**. Lebhaft rosa. Centr. weiss. Obere Pet. ponceau mit dunkelrosa Saum, stark schwarz belegt. E.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

25 „ „ „ 6 „

50 „ „ „ 12 „

Die einzelne Sorte nach Wahl des Bestellers 8 Gr.

## Fancy Pelargoniums.

109. **Anna Gornien** (*Lem.*). Braunpurpur, mit weissem Saum im Centrum.
273. **Ariadne** (*H. D.*). Violetpurpur. Centr. u. Saum weiss.
32. **Beauty of Winchester**. Silberweiss. Obere Pet. lilarosa gefleckt. Untere Pet. leicht rosa gefleckt.
323. **Belinde**. Rein weiss, obere Pet. brauncarmoisin belegt, untere Pet. ganz schwach lila gefleckt.
228. **Bella** (*Turner*). Ob. Pet. carmoisin, schieferblau gefleckt u. rosa umsäumt, untere Pet. graurosa, carmoisin gefleckt.
274. **Black Prince** (*Turn.*). Obere Pet. dunkelkirschbraun, untere Pet. brauncarmoisin. Centr. weiss.
275. **Callope** (*H. D.*). Purpurcarmoisin, Saum u. Centr. weiss.
324. **Cloth of Silver**. Braunviolet, silberweiss gesäumt. Centr. weiss.
325. **Delicatum**. Weiss mit röthlichem Schein, obere Pet. violetcarmoisin gefleckt, sehr reichblumig.

326. **Eleonor**. Bläulich carmoisin, Centr. weiss, Saum rosa.
276. **Emperor of Maroc** (*Turn.*). Castanienbraun lila umsäumt, untere Pet. lila verwaschen, Centr. weiss.
55. **Erato** (*Miell*). Obere Pet. kastanienbraun, rosa umsäumt, untere Pet. weiss, rosa getascht u. hellbraun gefleckt.
34. **Evening Star** (*Hend.*). Braunviolet, weiss gesäumt. Centr. weiss.
121. **Filetto** (*Miell*). Lebhaft carminrosa, weiss gesäumt, alle Pet. braun gefleckt.
383. **Fornarina**. Obere Pet. amaranthroth, weiss gesäumt u. lila belegt, die unteren carmoisin belegt, lila verwaschen. Centr. weiss.
249. **Godfroy Turner**. Amaranthcarmoisin, unt. Pet. lila verwaschen, Centr. rosa.
327. **Jewess**. Obere Pet. braunpurpur, lila gesäumt, unt. Pet. carmoisin lila verwaschen. Centr. weiss.
328. **King of Roses**. Braunroth mit grau-lila Saum. Centr. weiss.
233. **Lady Towers**. Obere Pet. amaranthroth m.

- violet Schein u. weissem Saum, untere Pet. weiss, carmoisin gefürtelt. Centr. weiss.
277. **Lovely** (Roll.). Obere Pet. brauncarmoisin, unt. Pet. carmoisin m. violet Anflug. Centr. u. Saum weiss.
43. **Mad. Cerrito**. Carmoisinviolet.
57. **Mad. Vilmorin** (Duv.). Ob. Pet. kastanienbraun, weiss gesäumt, untere Pet. weiss, braun u. lila gegürtelt.
35. **Magnum bonum**. Ob. Pet. purpur m. hellem Saum. Unt. Pet. lilarosa m. carmin Zeichn.
36. **Mazeppa superba**. Rein weiss, brauncarmoisin geadert. Obere Pet. stark braun belegt.
250. **Mrs. Hogg**. Amethystbraun, weiss gesäumt, Centr. weiss.
330. **Mrs. Ponsonby Moore**. Ob. Pet. leuchtend carmoisin, schwarz gefleckt, untere Pet. dunkelrosa, braun gefleckt.
331. **Negro** (Turn.). Obere Pet. kastanienbraun, unt. brauncarmoisin. Centr. u. Saum weiss.
279. **Reine des Fantaisies** (H. D.). Obere Pet. purpurviolet weiss gesäumt, untere Pet. weiss carmoisin geadert.
332. **Reine du Bal**. Purpurcarmoisin auf blasslila Grund.
280. **Roi des Fantaisies** (Miell). Ob. Pet. hell weinroth, dunkel geadert, unt. Pet. fleischfarb., rosa gefleckt.
281. **Velleda** (H. D.). Rein weiss mit rosacarmoisin Gürtel.

6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.  
 12 " " " " " " " " " " " "  
 Die einzelne Sorte nach Wahl des Bestellers 8 Gr.

## Seltsame Varietäten

(Variétés curieuses)

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntscheckigem, höchst eigenthümlichen Colorit.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Bridal Ring . . . . .	— 6	L'Avenir. Schöne Blume . . . . .	— 8
Clown. Blume roth, braun, weiss —	8	Prince of Orange . . . . .	— 8
Le chinois. Sehr bunt . . . . .	— 8	Oncidiiflorum. Rosa und weiss mit	
Lindleyi Carmin orange mit einen		fünf schwarzen Flecken, die	
purpur Flecken. . . . .	— 6	Blume einen Oncidium ähnlich —	8

## Pelargonium (Geranium) inquinans et zonale var., sowie Species.

### I. Pelargonium inquin. et zonale var.

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachstum, mannichfaltige Belaubung u. lebhaftes Colorit ein grosser Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen werden entweder zu Einfassungen der andern oder zu Zwischengruppen verwendet. Auch zur Cultur in Gefässen, Vasen etc., die zur Ausschmückung von Balcons, Loggien und Treppenrampen etc. dienen, sind die Pel. zonale vorzugsweise geeignet.

### a. Neuere Sorten.

	Thlr. Gr.
171. <b>Alexandra</b> . Obere Blumenblätter carmin, die unteren lachsroth, mit weissem Auge. Kräftige Varietät mit dunklem Gürtel. . . . .	— 10
166. <b>Amy Hogg</b> . Blumen leuchtend purpurrosa, Dolden enorm gross und vielblumig. Eine Nosegay-Hybride von kräftigem Wuchse. . . . .	— 8
179. <b>A. Nap. Baumann</b> (Bouch.). Bläulichrosa, im Centrum orange mit grossem weissen Auge. Enorme Dolden . . . . .	— 10
180. <b>André Henderson</b> (Bouch.). Hochrosa, im Centrum orangeroth, schöne Färbung . . . . .	— 12
182. <b>Atrosanguinea</b> (Bouch.). Glühend scharlach. Effectvolle Varietät für Freilandgruppen . . . . .	— 12



181. **Aurelia** (*Bouch.*). Blumen orangeroth, nach den Spitzen zu bläulich rosa, Auge weiss. Sehr zarte Färbung . . . . . — 12
151. **Beaton's Indian Yellow**. Blumen orangeroth, glühend gelb nüancirt; eine ganz neue und schöne Färbung; bringt mittelgrosse Dolden in grosser Anzahl hervor. Eine Nosegay-Hybride von zwergigem, aber kräftigem Wuchse, deren Blätter mit einem Gürtel geziert sind . . — 10
147. **Beauty** (*Hend.*). Niedrige, sehr compacte Varietät mit grossen Dolden, ebenso schön zu Gruppen als gut zur Topfcultur; Blumen weiss mit lachsrosa Centrum . . . . . — 6
152. **Black Dwarf**. Blume carmoisinscharlach in mittelgrossen, zahlreichen Dolden. Blätter mit sehr dunklem Gürtel. Ein echter Nosegay, von gedrungenem, niedrigem Habitus . . . . . — 10
174. **Donald Beaton**. Blumen dunkelziegelroth, sehr gross und von guter Form; kräftige Varietät für Gruppen . . . . . — 10
173. **Dutchess**. Blumen hochorange, kräftige Varietät für Freilandgruppen; von compactem Habitus . . . . . — 8
148. **Charles Rouillard** (*Babouillard*). Blume gross, feurig orangerosa mit rosig fleischfarbenen Abstufungen; die Blätter mit dunklem Gürtel — 6
183. **Comtesse de Clapière** (*Bouch.*). Blumen reinweiss mit sternförmigem rosa Centrum . . . . . — 12
163. **Fulgens**. Blumen lebhaft scharlach mit grossem weissen Auge, grossen Dolden und compactem Habitus, eine förmliche Halbkugel bildend; Blätter mit Gürtel . . . . . — 10
186. **Gloire de Corbeny** (*Babouill.*). Goldig lachsfarbig, leuchtend, zuweilen weiss gesäumt 12 Stück 3 Thlr. . . . . — 8
187. **Jules Arlet** (*Méz.*). Blumen bläulichcarmoisin, ganz eigne Färbung — 15
188. **La Vestale** (*Méz.*). Blumen rein weiss mit enorm grossen Dolden — 15
149. **Madame Werlé** (*Bab.*). Blumen weiss, nach der Mitte rosa mit lachsfarbiger sternförmiger Schattirung; die hellgrüne Belaubung mit Gürtel — 8
189. **Mlle. Henriette Renoult** (*Méz.*). Blumen lebhaft rosa, mit bläulichem Schein. Von gedrungenem Wuchs . . . . . — 15
172. **Magenta Queen**. Blumen magentaroth mit carmoisin, Auge weiss. Nosegay-Hybride; starkwüchsig . . . . . — 8
190. **Mattheo Marcol** (*Méz.*). Blumen lebhaft hochrosa, im Centr. heller. Eine der Schönsten . . . . . — 15
161. **Mrs. Wm. Paul**. Blumen zart fleischfarbenrosa, sehr gross und von bester Form; Habitus zwergig und geschlossen . . . . . — 8
153. **Orange Nosegay**. Blumen hellorange, Dolden sehr gross; ein echter Nosegay mit dunkelgrünen Blättern; ganz neue Färbung . . . . . — 10
164. **Pillar of Beauty**. Blumen carmoisinscharlach, sehr leuchtend. Nosegay-Hybride von sehr compactem Habitus . . . . . — 10
169. **Princess Lichtenstein**. Blumen hellmagentaroth mit weissem Auge, schöne zarte Färbung, vollkommene Form und compacter Wuchs . — 8
184. **Rose incomparable** (*Bouch.*). Blumen fleischfarbig mit lachsrosa Centrum. Sehr compacte Varietät . . . . . — 10
170. **Rose perfection**. Blumen orangerosa mit hellem Saum und weissem Auge, äusserst delicate Färbung . . . . . — 10
165. **Salamander**. Blumen orangescharlach mit grossem weissem Auge. Sehr gedrungen wachsende Varietät . . . . . — 12
162. **Scarlet Gem**. Blumen hellorangeroth mit weissem Auge, reichblühend, Blätter mit dunkler Zone. Effectvoll! . . . . . — 8
154. **Waltham Pet** (*W. P.*). Brillant feuerroth mit reinweissem Auge, von gutem Bau und reichblühend. Compacte zwergige Varietät . . . . — 8
160. **Waltham Seedling**. Blumen von guter Form, gefüllt, dunkelcarmoisin, Dolden sehr gross, Blätter mit Gürtel. Eine Nosegay-Hybride, gewonnen von Stella . . . . . — 8
146. **White Tom Tumb** (*Hend.*). Das schönste weisse Geranium von

reinsten Färbung und zwergigem, compactem Habitus, mit grossen vielblumigen Dolden; die Blätter mit dunklem Gürtel . . . . . — 6

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

NB. Die neuesten Sorten vide unter Neuheiten pag. 17.

## b. Aeltere gute Sorten.

Grösstentheils aus den Jahren 1859—1861; eignen sich ganz besonders zu Freiland-Gruppen.

- |   |   |
|---|---|
| 107. Baron de Vrière ( <i>Ingels.</i> ). Granatroth.  | 155. Ma Gloire ( <i>W. P.</i> ). Blumen rein weiss mit rosa Mitte.                    |
| 101. Beauté de France ( <i>Crousse</i> ). Hortensiaroth.  | 141. Magnet ( <i>Hend.</i> ). Lebh. scharlach.  |
| 132. Candidissimum ( <i>Liab.</i> ). Schneeweiss.   | 120. Marie Henry ( <i>Rend.</i> ). Kirschroth.  |
| 108. Captivation ( <i>Kingh.</i> ). Granatroth mit weissem Auge.                                  | 103. Martin Griveau ( <i>Lesèble</i> ). Scharlachorange.                              |
| 128. Christina. Dunkelrosa.   | 134. Météor ( <i>Crousse</i> ). Hellroth, Auge weiss.                                 |
| 118. Comtesse de Chambord ( <i>Nivelet</i> ). Schneeweiss.  | 158. Mlle. Marie Mézard ( <i>V. P.</i> ). Rein weiss.                                 |
| 145. Conqueror of Europe ( <i>G. S.</i> ). Lebhafte carminroth.                                   | 122. Mr. Henri de Blecourt ( <i>Niv.</i> ). Fleischfarben.                            |
| 119. Daniel Manin ( <i>Lem.</i> ). Purpurscharlach.   | 109. Mrs. Paul Labbé ( <i>R.-Ch.</i> ). Zinnober mit weissem Auge.                    |
| 136. Dekan Wild. ( <i>Stg.</i> ). Scharlachroth, grosse Dolde.                                    | 167. Nora ( <i>W. P.</i> ). Rosa, hochroth schattirt.                                 |
| 150. Étoile de matin ( <i>L'Huill.</i> ). Pfirsichrosa, mit lachsfarbenem Centr. u. weissem Auge. | 105. Pauline ( <i>Hend.</i> ). Scharlachroth, Zwergart.                               |
| 144. Eugénie Mézard ( <i>Babouill.</i> ). Lachsfarben, mit weissen Spitzen und Centrum.           | 117. Petit mont rouge ( <i>Dem.</i> ). Dunkel-scharlachroth, Auge weiss.              |
| 110. Feu de Malakoff ( <i>Lem.</i> ). Orangescharlach, Auge weiss.                                | 142. Perfection ( <i>Hend.</i> ). Leuchtend roth.                                     |
| 114. Fürst Ernst Wolfgang ( <i>H.</i> ). Dunkelfeuerroth.   | 139. Princess of Prussia ( <i>Hend.</i> ). Hellscharlach, compacte Sorte.             |
| 125. Galanthiflorum ( <i>Dem.</i> ). Rein weiss.  | 123. Prise de Milan ( <i>Niv.</i> ). Dunkelcarmin.                                    |
| 133. Gloire de Lyon ( <i>Liab.</i> ). Mennigerroth.   | 159. Roi d'Italie ( <i>B.</i> ). Feuerroth mit weissem Auge.                          |
| 102. Goliath ( <i>Dem.</i> ). Sammetig scharlachroth.   | 135. Rosalie Zaubitz ( <i>Stg.</i> ). Fleischrosa, Auge weiss.                        |
| 140. Herald of Spring ( <i>Hend.</i> ). Orange mit kirschroth.                                    | 106. Scarlet Globe ( <i>Morgan.</i> ). Scharlach, Auge weiss.                         |
| 138. Lady Rokeby ( <i>W. Bull.</i> ). Orangescharlach.  | 157. Snowball ( <i>Hend.</i> ). Rein weiss.   |
| 126. L'Étna ( <i>Miell.</i> ). Feurig scharlachroth.  | 112. Souvenir de Florestine Nivelet ( <i>N.</i> ). Hellfleischfarben, rosa marmorirt. |
| 121. Le Zouave ( <i>Lem.</i> ). Brillant scharlach.   | 111. Tom Pouce superba ( <i>Hock</i> ). Hochscharlach.                                |
| 104. Little David ( <i>H.</i> ). Scharlachroth, zwergig.  | 131. Tom Thumb ( <i>Hend.</i> ). Brennend scharlach.                                  |
| 168. Ludwig Uhland ( <i>Hock</i> ). Röthlich orange, weiss gefleckt.                              | 124. Virginie Lebois ( <i>Niv.</i> ). Fleischfarben rosa.                             |
| 113. Madame Vaucher ( <i>Bab.</i> ). Rein weiss.  | 127. Vivid ( <i>Smith</i> ). Dunkelscharlach.   |

Von vorstehenden Sorten liefern wir nach unserer Wahl:

24 Sorten für 2 Thlr.

50 Sorten für 4 Thlr.

100 Stück in 30—50 Sorten für 7 Thlr.

Einzelne ausgesuchte Sorten à 4 Gr.

### c. Nosegay-Varietäten.

Unterabtheilung von P. zonale, die sich durch compacten Habitus der Pflanzen, durch Reinheit der verschiedenen und lebhaften Farben, und besonders durch grosse und zahlreiche Bouquets auszeichnen, weshalb sie vorzugsweise zu Blumensträußern benutzt werden.

	Thlr. Gr.
166. <b>Amy Hogg.</b> Leuchtend purpurrosa . . . . .	8
151. <b>Beaton's Indian Yellow.</b> Orangeroth, glühend gelb niancirt . . .	10
152. <b>Black Dwarf.</b> Carmoisinscharlach . . . . .	10
129. <b>Carmine Nosegay (Beat.)</b> . Hellearminroth . . . . .	6
156. <b>Cybister (Beat.)</b> . Leuchtend dunkelscharlach, grosse Dolden . . .	4
116. <b>Imperial Crimson (Beat.)</b> . Grosse Dolden, lebhaft carmoisin . . .	4
172. <b>Magenta Queen.</b> Magentaroth mit carmoisin, Auge weiss . . . .	8
137. <b>Minimum Nosegay (Hend.)</b> . Niedrige Art, Blumen gross, carmoisin, die Blätter klein und dunkelgrau . . . . .	4
115. <b>Modèle Nosegay (Beat.)</b> . Leuchtend röthlichlila, Belaubung dunkelgrün, von compactem Habitus . . . . .	4
153. <b>Orange Nosegay.</b> Hellorange . . . . .	10
2. <b>Silver variegated Nosegay</b> , vide unter buntbl. Geranium . . . . .	5
130. <b>Stella (Beat.)</b> . Dunkelpurpur . . . . .	4
160. <b>Waltham Seedling.</b> Dunkelcarmoisin . . . . .	8

### d. Gefüllt blühende Sorten,

303. <b>AUGUSTE FERRIER.</b> Blumen gross und halb gefüllt, sehr lebhaft zinnoberroth mit weissen Antheren in der Mitte . . . . .	10
305. <b>GLOIRE DE NANCY.</b> Blumen lebhaft orangerosa, stark gefüllt, das Beste der gefüllten Sorten . . . . .	20
321. <b>LADY VICTORIA KERR.</b> Gefülltes Fancy-Pelarg. (Vide unter Neuheiten.)	
304. <b>MARTIAL DE CHAMFLOURD.</b> Schöne Dolden mit grossen gutgefüllten Blumen vom schönsten Scharlachroth . . . . .	10
302. <b>RANUNCULIFLORUM.</b> Grosse, starkgefüllte Blume, leuchtend scharlachroth. Knospen goldgelb . . . . .	15
301. <b>TRIOMPHE DE GERGOVIAT.</b> Grosse gefüllte Blumen, lebhaft roth und leicht aufblühend . . . . .	10

## II. BUNTLÄTTRIGE GERANIUM.

(*Gold and Silber variegated varieties.*)

Neue und Auswahl älterer Varietäten, reizende Sorten zur Ausschmückung von Gruppen, Gewächshäusern, Zimmern, Balcons und Treppenrampen.

### a. Sorten mit zweifarbigen Blättern.

30. <b>Ajax (Smith)</b> . . . . .	8
19. <b>Album marginatum</b> . . . . .	6
27. <b>Anna (Smith)</b> . Herrliche Varietät mit silberweissen Blatträndern . . .	8
2. <b>Beaton's Silver variegated Nosegay.</b> Compacte, niedrig bleibende Sorte, mit breitem weissen Rande, welcher sich nach der Mitte ausstrahlt . . . . .	5
12. <b>Bijou (Westwood)</b> . Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlachroth, kräftig wachsende Varietät . . . . .	5
5. <b>Brillant (Kingshorn)</b> . Ausgezeichnete Varietät mit weissen Blatträndern und feurig dunkelbrennendrothen Blumen; reichblühend. Das beste buntblättrige Pelargonium für Freiland. (12 Stück 1 Thlr. 6 Gr.)	4



6. <b>Cerise-Unique panachée.</b> Reizende Sorte mit breitem rein weiss eingefasstem Gürtel; die grüne Mitte verläuft sich bald dunkler, bald heller nach den Rändern . . . . .	10
16. <b>Cloth of Gold (Hend.)</b> Zwergige Varietät, Blätter mit sehr breitem goldgelben Gürtel, Blumen dunkel carmoisin . . . . .	6
13. <b>Culford Beauty.</b> Blätter mattgelb variirend, Blumen scharlach . . . . .	5
4. <b>Emperor (Lee)</b> Blätter silberrandig, Blume scharlachcarmin, sehr empfehlenswerth für Gruppen . . . . .	5
20. <b>Flower of Spring.</b> Blätter rahmweiss, breit gerandet, Blume hellkirschroth . . . . .	12
8. <b>Flower of the Day (Lee).</b> Mit eigenthümlichen, dem Epheu ähnlichen Blättern, welche rein weiss umrandet sind . . . . .	6
3. <b>Golden Chain.</b> Hochgelb gerandet . . . . .	6
29. <b>Golden Chain, Pink flowered.</b> . . . . .	8
25. <b>Golden Harkaway.</b> Blätter mit leuchtend gelben und auffallend breiten Rändern . . . . .	8
37. <b>Golden Vase (Hend.)</b> Zwergige goldrandige Varietät mit kirschrothen Blumen . . . . .	6
22. <b>Mangle's silver bedding.</b> Mit tief eingeschnittenen Blättern, Rand breit, weiss, nach der Mitte zu verlaufend . . . . .	6
21. <b>Meteor.</b> Schöne, silberrandige Varietät, Blumen leuchtend scharlachroth . . . . .	6
9. <b>Mountain of Snow (Lee).</b> Vervollkommnung v. Flower of the Day . . . . .	5
31. <b>Mrs. Milford (Grieves).</b> Grosse Blätter mit gelbem Rande, Gürtel rothbraun . . . . .	10
32. <b>Oriana improved (Grieves).</b> Rand weiss mit schwefelgelb verwaschen, Blumen dunkelrosa . . . . .	15
28. <b>Queen of Queens.</b> Niedrige Art, die Blätter fast bis zur Hälfte rahmweiss eingefasst . . . . .	12
23. <b>Silver Chain.</b> Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlach, Pflanze niedrig und compact . . . . .	8
1. <b>Silver Queen (Smith).</b> Mit rein weissen Blatträndern . . . . .	5
33. <b>Snowflake (T.).</b> Schneeweisse Blattränder, Blumen lebhaft rosascharl. . . . .	8
15. <b>St. Claire.</b> Blumen hellroth, Blätter silberrandig . . . . .	6
17. <b>The Bouquet (Turn.)</b> Blätter schwefelgelb, breit umsäumt, Blumen in dichten grossen Dolden, dunkel scharlachroth . . . . .	10
18. <b>The Golden Fleece.</b> Zwergartig, mit hellgoldgelber Belaubung, von gedrungenem Habitus, Blumen brennend roth . . . . .	6
24. <b>Venus (Sm.).</b> Rahmweisse Blattränder, Blumen dunkelrosa . . . . .	6

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

## b. Sorten mit dreifarbigigen Blättern.

(*Tricolor leaved varieties.*)

51. <b>Argus.</b> Blätter weiss variirend mit dunkel- und hellrothem Gürtel, Blumen hellscharlach . . . . .	18
52. <b>Attraction (Lee).</b> Rand schwefelgelb, Mittulgürtel roth . . . . .	12
74. <b>Cattlands Wonder (Sm.).</b> Rand hellgrün auf dunklem Grunde, mit purpurbraunem Gürtel . . . . .	10
56. <b>Countess of Warwick.</b> Silberrandig, Gürtel braun und rosa . . . . .	6
59. <b>Elegans (Grieves).</b> Weissrandige Varietät mit Doppelgürtel, rosa und braun . . . . .	15
53. <b>Fontainebleau.</b> Goldrand mit rosa Gürtel . . . . .	12
61. <b>Glowworm (W. P.).</b> Silberrandig mit innerem rosa Gürtel, Blumen scharlach . . . . .	10
70. <b>Gold Pheasant (Grieves).</b> Compacte, sich dicht verzweigende Sorte, mit goldgelbem Rand und orangerothem Gürtel . . . . .	20

65. **Honeycomb** (*T.*) Der breite Rand rahmweiss, Gürtel broncefarbig mit lachsrosa Einfassung . . . . . — 20
67. **Italia unita**. Gürtel zart carminrosa, Rand silberweiss. Blumen feuerroth mit weissem Auge. Sehr schön. . . . . — 20
73. **Julia**. Blätter dunkelgrün mit weissem Rande und hellrothem Gürtel — 10
62. **Little Beauty** (*Hend.*). Weissgerandete Zwergart mit rosigem dunkelbraunen Gürtel . . . . . — 10
75. **Lydia** (*H.*). Gürtel hellroth, Rand weisslich schwefelgelb, Blumen fleischfarbig rosa. . . . . — 15
57. **Mrs. Pollock** (*Hend.*). Eine der schönsten Varietäten. Blätter zweifarbig umrandet, aussen goldgelb, der innere Saum hellcarmoisin, Gürtel ponceaubraun. (Besonders starke Pflanzen 25 Gr.) . . . . . — 15  
12 Stück 5 Thlr. — 50 Stück 20 Thlr.
55. **Quadricolor**. Blätter dunkelgrün, nach dem Rande heller verlaufend, Gürtel dunkelbraun, mit purpurroth eingefasst. Blumen zahlreich und leuchtend kirschroth . . . . . — 10
68. **Raphael**. Silberrandig mit zart rosa Gürtel . . . . . — 15
63. **Rose Queen** (*W. P.*). Lebhaft grüne Blätter, dunkler Gürtel mit Silberrand, Blumen carminrosa . . . . . — 12
64. **Sunset** (*Hend.*). Schöne compacte, niedlich verästelte Varietät mit horizontal stehenden dreifarbigten Blättern und gelbem Rande . . . . . — 15
54. **The Fairy**. Zierliche silberrandige Zwergsorte, compacten sich breit verästelnden Wuchses, mit rosa Blumen . . . . . — 15
72. **The Queen's Favorite** (*H.*). Miniatursorte, vorzüglich zur Topfcultur, mit carmoisin- und olivengrünem Gürtel . . . . . — 20
60. **Tricolor** (*Crousse*). Blätter hellgrün mit lichtbraunem Gürtel und regelmässig weissen breiten Streifen und Flecken. . . . . — 10
69. **Waverley** (*Hend.*). Silberrandige Blätter mit glänzend rosa Gürtel; Blumen scharlach. Vorzügliche Neuheit! . . . . . 1 15
58. **Yellow Belt** (*Hend.*). Hellgrün orangegelb umrandet und mit braunem Gürtel. . . . . — 20  
12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr. 20 Gr.

## IV. Species und deren Varietäten.

Es dürfte wenig Pflanzengattungen geben, welche in ihren ursprünglichen Formen, sowohl hinsichtlich der Gestalt als auch der Färbung ihrer Blumen, desgleichen in der entzückenden Mannigfaltigkeit ihrer Belaubung, durch Form, Färbung und Geruch, mehr Abwechslung darbieten, als die Pelargonien oder Geranien.

Besonders sind es die kapischen Arten, welche alle Aufmerksamkeit verdienen, überhaupt in keiner guten Pflanzensammlung fehlen sollten. Unseres Wissens existiren, ausser in botanischen Gärten, nur in äusserst wenigen Handelsgärtnereien Sammlungen, aus denen man diese herrlichen Arten käuflich erhalten kann.

Wir haben uns deshalb bemüht, im Laufe der letzten Jahre eine wenn auch noch lange nicht vollständige Sammlung zusammenzubringen, und sind daher im Stande, in diesem Frühjahr nachstehende Sorten in kräftigen Pflanzen abgeben zu können:

	Gr.		Gr.
ABROTANIFOLIUM . . . . .	6	ENDLICHERIANUM <i>Fenzl.</i> . . . . .	20
ALCHEMILLOIDES <i>Ait.</i> . . . . .	4	FILICIFOLIUM (= citriodorum delicat. hort. angl.) . . . . .	4
ASTRAGALAEFOLIUM <i>P. (pinnatum W)</i> —		FILIPENDULIFOLIUM <i>Sweet.</i> . . . . .	—
ARDENS SUPERBUM . . . . .	10	GIBBOSUM <i>Ait.</i> . . . . .	10
BICOLOR <i>Ait.</i> . . . . .	15	GLUTINOSUM <i>Ait.</i> (= viscosum hort.)	4
BRAEANUM . . . . .	8	GRAVEOLENS <i>L'Her.</i> . . . . .	4
CAPITATUM <i>Ait.</i> . . . . .	4	„ FOL. VAR. (= Lady Plymouth hort. angl.) 12 Stück 1 Thlr. 6 Gr.	4
„ MAJUS . . . . .	5	GROSSULARIOIDES <i>Ait.</i> (= therebinthinaceum. <i>Car.</i> ) . . . . .	3
CARINATUM <i>Swt.</i> . . . . .	10	„ ALBA MARGINATA (= Dandy hort. angl.) . . . . .	4
CARNOSUM <i>Ait.</i> . . . . .	10	12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.	
CITRIODORUM . . . . .	4		
CONSPICUUM <i>Sweet.</i> . . . . .	8		
COMPTUM. SP. NOVA . . . . .	8		
ECHINATUM <i>Curt.</i> (HAMATUM <i>Jacq.</i> )	8		

	Gr.		Gr.
GROSSULARIOIDES <i>Ait.</i> PALLIDA VARI- GATA (= Beauty of Reading. <i>Hort. angl.</i> ) . . . . .	4	SCHOTTIANUM . . . . .	—
12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.		SELECTUM . . . . .	—
Hübsche Pflanzen zur Einfas- sung v. kleinen Gruppen.		SEMPERFLORENS . . . . .	—
HAULICKIANUM . . . . .	—	TABULARE <i>Ait.</i> . . . . .	4
HEREDIAEFOLIUM . . . . .	3	TETRAGONUM <i>L'Her.</i> . . . . .	6
" FOL. AUR. MARG. (= Ivy leaved golden edged. <i>Hort. angl.</i> ) . . . . .	4	" VARIEGATUM . . . . .	8
MYRRHIFOLIUM <i>Ait.</i> . . . . .	4	TRICOLOR <i>Curt.</i> (= violarium <i>Jacq.</i> ) . . . . .	10
LOBATUM <i>Ait.</i> . . . . .	4	" CORONOPHOLIUM <i>Jacq.</i> . . . . .	10
ODORATUM ERECTUM . . . . .	4	" VILLOSUM . . . . .	15
" LOBATUM . . . . .	4	TRISTE <i>Ait.</i> (= tuberosum. <i>Hort.</i> ) . . . . .	6
PELTATUM <i>Ait.</i> . . . . .	3	UNIFLORUM ALBUM <i>Hort. angl.</i> . . . . .	8
" ALBUM . . . . .	5	" CRIMSON <i>Hort. angl.</i> . . . . .	8
" ELEGANS . . . . .	5	" LILAC <i>Hort. angl.</i> . . . . .	8
" ROSEUM . . . . .	5	" SCARLET <i>Hort. angl.</i> . . . . .	8
PINNATIFIDUM . . . . .	6	" ROSE D'AMOUR <i>Hort. angl.</i> . . . . .	8
" ATROPURPUREUM . . . . .	8	SCUTATUM. <i>Lk.</i> . . . . .	4
PICTURATUM GRANDIFLORUM . . . . .	6	VITIFOLIUM <i>Ait.</i> . . . . .	5
" ODORATUM . . . . .	6	CAMPILIA LACINIATA . . . . .	10
QUERCIFOLIUM <i>Ait.</i> COCCINEUM . . . . .	10	GERANIUM ANEMONAEFOLIUM <i>L'Her.</i> (= palmatum <i>Carp.</i> ) . . . . .	8
" EXIMIUM . . . . .	8	" CANARIENSE <i>W.</i> . . . . .	6
" FLORIBUNDUM . . . . .	8	" ENDRESSI . . . . .	10
		" MACRORRHIZON ( <i>L.</i> ) FOL. VAR. . . . .	5
		ERODIUM PELARGONIIFLORUM . . . . .	10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment:

12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.

24 " " " " " " 3 " — "

## Pentstemon.

Dieselben blühen bekanntlich während des ganzen Sommers und bieten, zu einer Gruppe vereinigt, mit ihren herrlichen, grossen Blumen einen freundlichen Anblick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich besonders.

### a. Neuere Sorten.

- |   |   |
|---|---|
| 19. Anaïs Leroy.  | 31. Georg Bruant. Reinweiss, lilagesäumt.   |
| 20. Anna Rollet. Rothviolet m. schneeweissem Schlund.                                 | 24. Gloxiniaeflorum. Ziegelroth m. strohgelbem Schlund u. Kelchröhre.                                   |
| 21. Artemise. Kelchröhre u. Saum weiss, Schlund rosa.                                 | 26. Josephine Dèsprez. Carminrosa, m. weissem, braungestreiften Schlund.                                |
| 25. Bertha Pfitzer.   | 27. Le Conquérant. Violetroth m. weissem, rothliniirten Schlund.  |
| 29. Duc de Mexique. Ponceau, violet gefleckt mit weissem, carmin gestreiften Schlund. | 34. Maculatum. Hell carmin mit rosa, braun geflecktem Schlund.  |
| 22. Eclat. Blutroth mit rosa, carmoisin liniirtem Schlund.                            | 28. Paul Racouchot. Kelchröhre carmoisin u. blutroth m. mehlweissem, leicht carmin gestreiften Schlund. |
| 23. Fascination.  |   |
- à Sorte 10 Gr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 20 Gr.

### b. Aeltere Sorten.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 10. Album.                | 14. Hercule.                               |
| 11. Brillant.             | 5. Jupiter ( <i>Cr.</i> ).                 |
| 3. Digitalis grandiflora. | 15. Leonie Vainclair.                      |
| 12. Duc de Lorraine.      | 8. Mammoth ( <i>Cr.</i> ).                 |
| 33. Gloire des Massifs.   | 16. Mr. Thibaut.                           |
| 13. Gloxiniaeflorum.      | 1. Marie Marguerite ( <i>A. Pellier</i> ). |



17. Météore.
6. Neige et Cerise (*Cr.*).
7. Olympe de Clèves (*Cr.*).
2. Petit Pouce (*Lem.*).

9. Riquiqui (*Cr.*).
18. Surpasse Premices de Plantin.
4. Triomphe de Wazemmes (*Aldeb.*).

à Sorte 5 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 20 Gr.

## Petunien.

### Neuere Sorten

von bekannten guten Züchtern.

#### a. gefüllte.

66. Caprice (*Bruant & C.*).
67. Christianum (*Br. & C.*). Blauviolet, grau marmorirt, sehr gut gefüllt.
57. Crispiflora plena (*T.*). Violetpurpur, breit weiss gesäumt, Rand wellenförmig gekräuselt.
68. Fantastique (*Br. & C.*).
60. Norma (*T.*). Carminviolet m. weissen Rändern.

61. Omer Pascha (*T.*). Grund weiss; sammtig purpurn illuminirt.
70. Papaveracea pl.
54. Perle von Brünn (*T.*). Sehr gross, sehr gefüllt, schneeweiss, auf jedem Blumenbl. einen rein blauen Fleck.
69. Souvenir de Leopold I. (*Br. & C.*)
56. Virgo Maria (*T.*). Sehr gross, rein weiss.

#### b. Einfache.

11. Abondance (*Bruant*).
12. Activité (*Br. & C.*). Lilarosa mit schwarzem Schlund, dicht purpurviolet geadert.
1. Etoile Potaire (*Bouch.*).
9. Floribunda (*Bruant*).
2. Illustration. Helllila, dunkelviolet geadert.

10. La Renommée (*Bruant*). Violetroth mit blauen Flammen u. Schlund.
14. President de Mesquil (*Bruant*).
6. Purple Bedder. Leuchtend carmoisin mit Atlasglanz, fein schwarz geadert.
3. Séduction. Lilarosa, Schlund strohgelb mit dunkelbraunen Streifen.

Die Sorte 8 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 20 Gr.

**Petunia Inimitabilis marmorata** (*Thalacker*) zeichnet sich durch ihre Blumen, welche neben den Inimitable-Flecken noch marmorartige Variationen haben, oder auch ausser der Grundfarbe mit einer andern Färbung netzartig überzogen sind, wodurch die schönsten und brillantesten Zeichnungen und Nüancirungen gebildet werden, aus.

Die Abbildung dieser Neuheit erscheint im Neubert'schen Magazin.

6 Stück 2 Thlr. — 12 Stück 3 Thlr.

## PHLOX (Flammenblume).

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier- und Florblume hat, ist allgemein bekannt, sodass es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden Varietäten, von den besten Züchtern dieses Genres gewonnen, zeichnen sich durch besonders schöne Färbungen, sowie durch grosse, runde, wohlgeformte Blumen aus.

### I. Phlox decusta.

#### a. Neuere Sorten.

Diese ausgezeichneten Neuheiten sind Producte der Herren *Fontaine* und *Lierval*, den besten Züchtern dieser schönen Zierblumengattung, deren herrliche und mannichfache Blumendolden die reizendsten Blumenbouquets bilden.

47. Alphonse Karr (*F.*). Violet lachsfarben, extra!
55. Arthur Fontaine (*F.*). Lachsfarbig zinnoberroth.
45. Comte de Lambertye (*F.*). Violetroth mit purpurner Mitte.
43. Docteur Parnet (*L.*). Lebhaft roth, extra!

39. **Le Dragon.**  
 40. **Lady Elisabeth Home.** Reinweiss mit grossem violettrothen Auge.  
 48. **Mad. Atger (L.).** Schieferfarbig mit metallischem Widerschein.  
 44. **Mad. de Cannaert d'Hamale (L.).** Lachsfarbigrosa mit purpurrother Mitte.  
 53. **Mad. Levrat (F.).** Grossblumig rosa mit purpurner Mitte.  
 42. **Mad. Antin (L.).** Violettroth mit purpurner Mitte.  
 46. **Mons. Delamarre (L.).** Blume vom schönsten leuchtenden Roth.  
 52. **Mons. Allain (F.).** Lachsfarbig mit purpurnem Centrum.  
 61. **Mons. Bonneau (F.).** Prchtig schieferfarben, Zwergsorte (niedriger Habitus der Staude).  
 56. **Mons. Thibaut (F.).** Orangerosa mit purpurrother Mitte. (Diese Sorte und Arthur Fontaine erhielten vor 2 Jahren bei der Pariser Herbstausstellung zwei Prmien erster Classe.)  
 49. **Pie IX. (L.).** Lachsfarbig, extra!  
 41. **Souvenir de Sultzmatt (L.).** Weiss mit rother Mitte, extra!  
 54. **Souvenir des Thermes (L.).** Weiss mit purpurrother Mitte, prchtig!  
 50. **Souvenir de Trianon (F.).** Lachsfarbig mit lilarosiger und purpurner Schattirung.

*Die Sorte nach freier Wahl 8 Gr.  
 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 20 Gr.*

### b. Aeltere Sorten.

- |  |  |
|--|--|
| 27. <b>Alba striata (Dem.).</b> Weiss, lebhaft rosa gestreift.       | 12. <b>Madame Andry (Liev.).</b> Weiss, Centrum violettpurpur.               |
| 1. <b>Amabilis (Schmitt).</b> Weiss, lila verwaschen, Centr. carmin. | 37. <b>Madame Caen (Lecerf.).</b> Weiss mit grossem purpur Centrum.          |
| 2. <b>Antoine Mueller (R.).</b> Lilarosa, Centrum purpur.            | 38. <b>Madame Houlet (Font.).</b> Weiss m. roth. Auge.                       |
| 3. <b>Belle de Varennes.</b> Zartrosa, Auge roth.                    | 13. <b>Madame Marseaux (Font.).</b> Weiss, Centr. purpurroth.                |
| 28. <b>Belle Normande (Liev.).</b> Lachsfarben.                      | 11. <b>Madame Pothier.</b> Zartrosa mit rothem Auge.                         |
| 4. <b>Beranger (R.).</b> Rosig lila, Mitte carminroth.               | 14. <b>M. Forget (Font.).</b> Violettroth.                                   |
| 29. <b>Bore (Liev.).</b> Levkoyenroth.                              | 15. <b>Mlle. la Comtesse de Bresson.</b> Weiss, Centr. lebhaft rosa.         |
| 5. <b>Boule de Neige (H. Demay).</b> Reinstes weiss.                 | 16. <b>Mlle. Marie Lacroix.</b> Weiss, Centr. rosa.                          |
| 30. <b>Conqueror (Dem.)</b> Weinroth, Centr. zinnob.                 | 17. <b>Mons. Kamm (Rdttr.).</b> Purpurroth mit carmin Stern u. weissem Auge. |
| 32. <b>Eurus (Font.).</b> Weiss, im Centr. rosa.                    | 18. <b>Mons. le Docteur Lacroix.</b> Kupferroth.                             |
| 31. <b>Diomde (Font.).</b> Violettroth.                             | 19. <b>Mons. Roger (Rdttr.).</b> Rosa, Centr. dunkelcarmin.                  |
| 6. <b>Docteur Josset (Liev.).</b> Pfirsichfarben, Centr. feuerroth.  | 20. <b>Mr. Punch (Font.).</b> Lachsrosa.                                     |
| 7. <b>Duguesclin (Rdttr.).</b> Dunkelrosa, Centr. braunroth.         | 21. <b>Prsident Morel (Font.).</b> Violettpurpur.                           |
| 8. <b>Etoile du Matin (Lemoine).</b> Weiss, Centr. carminviolett.    | 22. <b>Prince Troubetzkoy.</b> Rosa, Centrum dunkelroth.                     |
| 33. <b>Eurus (Font.).</b> Lachsfarben mit rosa.                     | 23. <b>Soeur Gronime (Rdttr.).</b> Schneeweiss mit grossem carmin Stern.    |
| 34. <b>Euryale (Font.).</b> Violettroth, Centr. purpur.              | 24. <b>Souvenir de Mad. Morel.</b>   |
| 35. <b>Ferdinand II. (Liev.).</b> Weinrosa, Centr. purpur.           | 25. <b>Surpasse Mad. Fontaine (Rdttr.).</b>                                  |
| 36. <b>Georg Ville (Liev.).</b> Carminrosa.                          | 26. <b>Triomphe de Twickel (Sambg.).</b> Carmin mit weissen Streifen.        |
| 10. <b>Lord Byron (R.).</b> Dunkelrosa.                              |  |

## II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

Sind ein wenig empfindlicher gegen Witterungseinflsse, als die Varietten von *Phlox decussata*.

- |   |  |
|---|--|
| 101. <b>Comte de Montijo (Crousse).</b>                           | 105. <b>Madame van Houtte (Rdttr.).</b> Rosigweiss mit purpur Centr. |
| 109. <b>Francois Lalin (Rdttr.).</b> Rein weiss mit purpur Stern. | 106. <b>Ptronille (Rdttr.).</b> Schneeweiss, Auge violett.          |
| 102. <b>George Mehl (Rdttr.).</b> Hellroth mit carmin Stern.      | 107. <b>Rose Rendatler (Rdttr.).</b> Schneeweiss, Stern dunkelrosa.  |
| 103. <b>L'ami Held (Rdttr.).</b> Lebhaft, Centr. carminpurpur.    | 108. <b>Vicomtesse de Belleval (Rdttr.).</b> Weiss, lila marmorirt.  |
| 104. <b>Madame Parisot (Rdttr.).</b> Lilarosa, weiss marmorirt.   |  |

Von vorstehenden beiden Sortimenten, welche Varietten dieser schnen Florblume aus den Jahren 1858—1863 enthalten, liefern wir nach unserer Wahl: 12 Sorten fr 1½ Thlr., 25 Sorten fr 2½ Thlr., 50 Stck fr 5 Thlr. Einzeln ausgesuchte Sorten  Stck 4 Gr.

# Potentillen

mit gefüllten Blumen.

Mr. Rouillard ( <i>L.</i> ). Blumen sehr gross und gut gefüllt, leuchtend zinnberroth	25
Splendida. Lebhaft amaranth, reichblühend	6
V. Lemoine ( <i>L.</i> ). Grösste Blume, 6—8 Zoll im Umfang, halbgefüllt und in Form einer Ranunkel gewölbt, granatroth mit gelbem Saum, Rückseite der Blbl. mennigroth	25
William Rollisson ( <i>L.</i> ). Blumen gross, halbgefüllt, nankinggelb, Rückseite der Petalen aurorarothe	25

## PYRETHRUM.

Das kaukasische Chrysanthemum in schönen Varietäten.

In Töpfen cultivirt.

8. Charles Baltet ( <i>H. B.</i> ). Rosenroth	10
4. Fr. Neuner ( <i>Rend.</i> ). Prächtig dunkelrosa, Rand reinweiss	6
21. Hermann Stenger ( <i>Lem.</i> ). Sehr gross, stark gefüllt, dunkelrosa, einer Aster ähnlich	10
17. Reine blanche ( <i>Crousse</i> ). Gross, gut gefüllt, reinweiss	10
14. Rendatler ( <i>H. B.</i> ). Purpurroth, Scheibe in rosa Röhren	5
15. Rouillard ( <i>H. B.</i> ). Weiss mit rosa Reflexen	6
29. Tom Pouce	3
16. Vilmorin ( <i>H. B.</i> ). Purpurroth	3

## TROPAEOLUM.

Ganz niedrige, gedrunen wachsende Formen, welche sich besonders zum Anpflanzen ganzer Gruppen eignen.

4. Compactum coccineum.	2. Lobbi atrococcineum.
5. Eclipse.	6. Triomphe d'Hyères.
1. Insigne.	Die Sorte 4 Gr.

## VERBENEN (Verveines).

a. Italienische Sorten,

mit grossen Blumen und äusserst buntem Colorit.

Verveines d'Italie à grandes fleurs panachées.

107. Contessa Carolina Caprioli. Lebhaft rosa, mit leuchtend purpur Centrum und Streifen.	106. Mad. H. Stenger ( <i>Bouch.</i> ). Weiss, rosa und purpur gestreift.
101. Giovanni Cavagnini. Weiss mit rosa und hellcarmin gestreift.	109. Mad. Rougier-Chauvière. Weiss, purpur-carmoisin gestreift.
111. Il Temporale. Blassrosa mit gelbem Auge, carmoisin und lila gestreift.	112. Napoleone Rossi. Dunkelrosa, lila geflammt, purpur gestreift, mit gelbem Auge.
105. Ingegnere Pedrali. Lila, carmoisin und violet gestreift.	104. Nobile Cesare Brigia. Lila, violet gestreift.
100. Lodovico Palassi. Lila, dunkelviolet gestreift.	103. Poetessa del Deserto. Lilarsa, carmoisin gestreift.

Wir liefern nach unserer Wahl (à notre choix): Einzelne ausgesuchte Sorten à 6 Gr. — 6 Sorten für 1 Thlr.

b. Auswahl von ein- und aurikelfarbigen Sorten.

Choix de Verveines de couleurs unies et d'auricules.

5. Alpha. Hellpurpur mit scharlach Auge und gelbem Centrum.	24. Auguste Heidel. Brauncarmoisin mit weissem Auge.
---	--



30. *Azurea grandiflora*. Hellblau mit grünlichem Auge.  
 29. *Carl Fintelmann*. Dunkelrosa mit gelbem Centrum, violet und carmin geflammt.  
 46. *Celestial Blue (Hend.)*. Veilchenblau m. gross. weiss Auge. (Vide pag. 23.)  
 4. *Doctor Albert*. Dunkelveilchenblau mit weissem Auge, sehr wohlriech.  
 25. *Feuerball (M.)*. Hellscharlachroth.  
 47. *Fra Diavolo (Bruant.)*.  
 27. *Frauenlob*. Purpur, mit scharlach Centrum und gelbem Auge.  
 3. *Hercules*. Sammtig scharlachroth mit goldigem Reflex.  
 28. *Lady Victoria (Scott)*. Purpurscharlach mit gelbem Auge.  
 1. *La Géante*. Lilaroth mit carmois. Centr.  
 2. *L'Alhambra*. Carminrosa mit purpur Auge.  
 9. *La Negresse*. Scharlach mit hellgelbem Auge.  
 17. *Mad. Alphonse Dufoy*. Sammtig dunkelpurpur mit lila Auge.  
 7. *Mrs. Woodroff*. Brennend roth.  
 15. *Mons. Rendatler*. Ziegelroth mit gelbem Auge.  
 16. *Mr. Pellé*. Weiss.  
 14. *Ornement des jardins*. Dunkelrosa mit grossem gelben Auge.  
 6. *Osiris*. Scharlachroth.  
 13. *Princesse de Wagram*. Fleischrosa mit carmoisin Auge.  
 23. *Reine des Roses (Bouch.)*. Frisch hellrosa, mit fleischfarbigem Centrum. Schön!  
 12. *Richard Lenoire*. Purpur mit weissem Auge.  
 8. *Rosalinde*. Brauncarmoisin mit lila Centrum.  
 11. *Schneeballen*. Rein weiss.  
 33. *Tadellose (M.)*. Rosenroth, lila geflammt.  
 10. *W. Scheurer*. Violet.

*Nach unserer Wahl*

- 12 Sorten für 1 Thlr. 10 Gr., 25 Sorten für 2½ Thlr. Die Sorte einzeln 4 Gr.  
 26. *Arlequin*. Buntblättrige Verbene . . . . . 15 Gr.

**c. Maonetti-Verbenen.**

Unterscheiden sich von den Varietäten der Stammart durch äusserst gedrungenen Bau, tief eingebuchtete feinere Blätter, kleinere Blumen und durch ein munteres, mehrfach neues Colorit. Zu Einfassungen u. kleineren Gruppen vorzugsweise geeignet.

205. *Coerulea purpurea (Lal.)*. Violet.  
 204. *Impératrice Elisabeth*. Weiss und dunkelviolet.  
 200. *Mad. van Houtte (L.)*. Hellecarmin.  
 201. *Perfezione (L.)*. Carmoisin mit grünlichem Centrum.  
 202. *Princesse Victoria (Hend.)*. Neu! Bläulich carmoisin. (Vide pag. 23.)  
 203. *Pulchella splendens (Roll.)*. Weiss und carmoisinviollet.  
*Einzelne Sorten*  
 à 5 Gr.

12 Stück nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

Ferner empfehlen wir noch folgende Sorten:

19. *Blanche Gué (Bruant)*. Rein Gr. zu Gruppen sehr geeignete, Gr. weiss mit gelblich grünem compact wachsende Sorte; die Auge, grossblumig. . . . . 6 Blumen sind gross, leuchtend carmoisinscharlach, mit reinweisser Mitte . . . . . 6

**Neueste Verbenen, vide pag. 22 und 23.**

**WERBONICA.**

18. *Admiration (Bouch.)* Zwerg- Gr. sorte. Hellamaranthroth. Neu! 10  
 13. *Anna de Blonjeau* . . . . . 5  
 1. *Eliptica* . . . . . 4  
 11. *Gloire de Lorraine* . . . . . 4  
 10. „ *de Lyon* . . . . . 5  
 9. *Impératrice Eugénie* . . . . . 4  
 4. *Mad. Bouchardat* . . . . . 4  
 12. „ *Henri Jacotot* . . . . . 5  
 14. *Mammouth* . . . . . 4  
 19. *Nec plus ultra (Bouch.)*. Rein Gr. lila mit purpur. Zwergsorte. Neu! . . . . . 10  
 15. *Reine de Massifs*. Leuchtend roth; compacte Zwergsorte. . . 6  
 16. *Rosa Bonheur*. Rosig lila mit weissen Spitzen; compacter zwergiger Wuchs . . . . . 6  
 17. *Triomphe de Meaux* . . . . . 5  
*Neueste Sorten vide pag. 24.*

### III. ABTHEILUNG.

## Freiland-Pflanzen.

(Plantes de plein air.)

Bei der im Herbst 1865 stattgefundenen internationalen Ausstellung zu Erfurt wurden uns für 2 Collectionen von Coniferen (aus 90 verschiedenen Arten und Spielarten bestehend) zwei grosse silberne Medaillen von den Preisrichtern zuerkannt.

## CONIFEREN (Nadelhölzer, Zapfenbäume)

für das freie Land.!

### Bäume und Sträucher

zu immer grün bleibenden Gruppen, in größtentheils starken Exemplaren.

*Conifères en arbres et buissons forts.*

Die Coniferen müssen gegenwärtig bei neuen Gartenanlagen und Parks einen wesentlichen Bestandtheil bilden, wenn diese auf guten Geschmack und Abwechslung des landschaftlichen Bildes Anspruch machen wollen. Schon ihre in den mannigfachen Farbenabstufungen sich schmelzende, immergrüne Tracht, die selbst in den härtesten Wintermonaten des Reizes nicht entbehrt, gebietet deren Anpflanzung, fast mehr aber noch ihre so höchst verschiedenen Formen, welche sich von den beweglicheren Contouren der Laubhölzer scharf trennen und dadurch einen lebhaften Contrast hervorbringen. Pflanzte man sie in ausgebrehten Anlagen und Parks in großer Menge an, so sind sie nicht minder eine Zierde kleinerer Gärten, wo einige schöne Arten auf bevorzugte Plätze angepflanzt, von den Besitzern mit Freude betrachtet und mit Vorliebe gehegt und gepflegt werden.

Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir der Cultur der Coniferen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet, so daß wir, unterstützt durch ununterbrochene junge Anzuchten (vide besondere Rubrik) und durch eine besondere Culturmethode, worüber sich ausgezeichnete Gartenzeitschriften, wie die „Gartenflora“ und die „Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzentunde“ anerkennend ausgesprochen haben — im Stande sind, den Freunden dieser prächtigen Pflanzenfamilie, schöne kräftige und gesunde Exemplare von fast allen bekannten Arten, in Körben und andern Gefäßen cultivirt und mit ihrer richtigen Nomenclatur versehen, zu liefern.

Einen großen Theil der zu Anpflanzungen in Gärten und Parkanlagen bestimmten Coniferen lassen wir in der Regel im Laufe des vorübergehenden Jahres in Gefäße (Körbe, Töpfe) bringen und darin cultiviren, eine Methode, welche dem Käufer ohne Zweifel den Vortheil gewährt, daß auf diese Art behandelte Nadelhölzer bei ihrem Auspflanzen in das freie Land sicher anwachsen, was bei dem unmittelbar vor ihrer Versendung dem Lande entnommenen, bekanntlich nicht immer der Fall ist. Außerdem können in Gefäßen cultivirte Coniferen, von denen wir schöne Vorräthe zu Tausenden besitzen, zu jeder Jahreszeit versendet werden.

Das nachstehende Verzeichniß bietet eine große Auswahl ausgesuchter, größtentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den verschiedenen Laubböszern und den immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind, bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effect hervorzubringen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen; in K. bedeutet in Körben, in T. bedeutet in Töpfen; die übrigen sind nur im Lande vorrätlich.

Thlr. Gr.

<b>Abies.</b>	Weiß- oder Silbertanne, Edeltanne, ( <i>vide</i> auch <i>Picea et Tsuga</i> ) .	
„	amabilis. Edeltanne von schönem Habitus und prächtiger Tracht.	
	1 Fuß hoch, in T. . . . .	3 —
„	Apollinis ( <i>A. parnassica</i> ). Die griechische Tanne, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, in T. . . . .	15 —
† „	bracteata. $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $2\frac{1}{2}$ Fuß breit, in T. Schöne, noch äußerst seltene Edeltanne von Ober-Californien . . . . .	20 —
„	cephalonica. Südsche Pflanzen, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T. . . . .	15 —
„	parnassica ( <i>A. Apollinis</i> ). $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	15 —
„	arcadica ( <i>A. Regina Amal.</i> ). $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch . . . . .	15 —
„	cilicica. $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und eben so breit, in K. . . . .	1 —
„	firma. $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch . . . . .	6 à 7 —
„	Fraserii. Die pennsylvanische Tanne, 2 Fuß hoch, in T. . . . .	1 —
„	grandis. Amerikanische Weistanne, der <i>A. nobilis</i> nahestehend. Pflanzen von 2 Fuß Höhe und 1 Fuß Breite, im L. . . . .	3 —
	Pflanzen von 2 Fuß Höhe und $2\frac{1}{2}$ Fuß Breite, in T. . . . .	6 —
† „	lasiocarpa ( <i>Lowii</i> ). Eine der schönsten neueingeführten Silbertannen, $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1$ — $1\frac{1}{3}$ Fuß breit, in K. . . . .	4 —
	Prachteremplare von $3\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und 2 Fuß Breite, in T. . . . .	12 —
„	nobilis. Amerikanische Edeltanne. Eins der schönsten Nadelhölzer der Welt. Nadeln blaugrün, 2—3 Fuß hoch u. $2\frac{1}{2}$ Fuß breit, in K. . . . .	12 —
	$1\frac{3}{4}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuß breit . . . . .	10 —
	4 Fuß hoch und 3 Fuß breit, in K. (von unregelmäßigem Wuchs aber gesund) . . . . .	5 —
	$5\frac{1}{4}$ Fuß hoch und 3 Fuß breit, Prachteremplare, regelmäßig gebaut, in Kübeln . . . . .	50 —
	(Die schönsten, im Gefäße gezogenen Exemplare, die uns bekannt!)	
„	nobilis var. robusta. Selten! $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und von fast gleichem Durchmesser, in T. . . . .	25 —
„	Nordmanniana. Kaukasische Edeltanne. Regelmäßig, schön gebaute Conifere, von $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe . . . . .	15 —
	$1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und gleichem Durchmesser, in K. u. T. . . . .	5 —
	$2$ — $2\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und $2\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser, in K. . . . .	15 —
	$5$ — $6$ Fuß Höhe und 5 Fuß Durchmesser, in K. Prachteremplare von untadelhaftem Bau . . . . .	50 —
„	Pinsapo. Die spanische Tanne. Exemplare von $1$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und gleichem Durchmesser, in K. . . . .	1 15
	$2\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und $2\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser, in K. . . . .	5 —
	$1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser . . . . .	3 à 4 —
†	<i>Araucaria imbricata</i> . Schmucktanne von Chili. $2$ — $2\frac{1}{2}$ F. hoch u. br. . . . .	4 —
	Schöne Pflanzen von 3 Fuß Höhe und gleicher Breite, in K. u. T. . . . .	12 —
	von $4$ — $5$ Fuß Höhe u. $4$ — $5$ Fuß Breite, in T. Prachteremplare . . . . .	24 —
†	<i>Biota aurea</i> . Ausgezeichnete, goldig schimmernde, symmetrisch und compact sich bauende Species. 1 Fuß hohe, $2$ — $3$ jährige Pflanzen . . . . .	12 —
	2 Fuß hoch und 1 Fuß breit, in K. . . . .	4 —
	$2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ Fuß hoch und $1$ — $2$ Fuß breit, in K. u. T. . . . .	5 —
„	compacta ( <i>vera</i> ). Außerst gedrungen u. regelmäßig sich bauende, schöne Art; völlig hart. Buschige Pflanzen $1\frac{1}{2}$ — $2$ F. hoch, $1\frac{1}{4}$ F. br., in T. . . . .	3 —
	$2\frac{1}{2}$ — $3$ Fuß hoch, $1$ — $1\frac{1}{4}$ Fuß breit, in T. . . . .	4 —
„	falcata. Von Japan. Neue Species mit sichelförmigen Nadeln von hellem Grün, $1$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T. . . . .	20 —



- † **Biota filiformis.** Mit hängenden, fadenförmigen Zweigen. 5 Fuß hoch,  $\frac{3}{4}$  Fuß breit, in K. . . . . 2 10  
 1— $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 12  
 „ **Fortunei fastigiata.** 1 Fuß hoch . . . . . — 20  
 † „ **glauca.** Ausgezeichnet durch ihr **blaugrünes** Colorit. Vorzügliche Species. 1— $1\frac{1}{2}$  Fuß hohe, schöne Pflanzen, in L. 10 Gr. à . . . . . 25  
 „ 3 Fuß hoch, in L. . . . . 1 15  
 „ **gracilis (Hort. Angl.).** Von Repaul.  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch . . . . . — 25  
 „ **Meldensis.** Buschiger Strauch. Hybride zwischen Thuja und Cedre,  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch, in L. . . . . — 10  
 „ **monstrosa.** Eigenthümliche Varietät mit verdickten Zweigen u. Blättern, wovon letztere eiförmig stumpf sind.  $\frac{1}{2}$  Fuß h. Pflanzen, in L. . . . . — 20  
 „ **orientalis.** Morgenländischer Lebensbaum. 3—4 Fuß hohe Pflanzen. (12 Stüd 2 Thlr.) . . . . . — 8  
 „ **fol. argenteo varieg.** Der morgenländische Lebensbaum mit **silberfarbener** Panachirung. Pflanzen von  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe, in L. . . . . 1 —  
 „ „ **aureo varieg.** Derjelbe mit **gelblicher** Panachirung,  $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 25  
 „ **Sieboldii Hort. (Biota japonica Sieb.).** Von Herrn von Siebold eingeführte Zwergform, von regelmäßig konischem Bau. 1 Fuß hoch . . . . . — 25  
 „ **tartarica** 5—6 Fuß hoch,  $1\frac{1}{2}$  Fuß breit, im L. . . . . 1 —  
 † **Cedrus atlantica.** Die Cedre vom Atlas. Pflanzen von 5—6 Fuß Höhe . . . . . 2 15  
 „ **Deodara.** Die Cedre vom Himalaya. Von den Hindus ihrer überraschenden Schönheit wegen Devadara, d.i. der Baum Gottes, genannt. Ausgezeichnet schöne Pflanzen von 4— $4\frac{1}{2}$  Fuß Höhe und 3— $3\frac{1}{2}$  Fuß Durchmesser, in K. . . . . 3 —  
 „ „ **var. crassifolia.** 3— $3\frac{1}{2}$  Fuß hohe buschige Pflanzen, i. K. . . . . 2 15  
 „ „ **var. robusta.**  $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch, i. L. . . . . 2 15  
 „ **Libani.** Die Cedre vom Libanon. Pyramidale Pflanzen v. 5—6 Fuß Höhe, i. L. . . . . 2 15  
**Chamaecyparis nutkaensis (Thujaopsis borealis).** Bekannte schöne Conifere, deren Vaterland der südöstliche Theil von Sibirien ist. Hübsche Pflanzen von  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe, i. L. . . . . — 20  
 von  $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß Höhe, i. L. . . . . 1 10  
 $3\frac{1}{2}$ —4 Fuß hoch u. 3 Fuß breit, i. K. . . . . 5 —  
 Schön cultivirtes **Prachteremplar** v. 9 Fuß Höhe u.  $4\frac{1}{2}$  Fuß Durchmesser, im Mübel . . . . . 25 —  
 „ **nutkaensis var. glauca.** Neu u. sehr schön,  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch,  $1\frac{1}{4}$  Fuß breit, i. L. . . . . 1 10  
 $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch . . . . . 2 —  
 Prächtige Pflanze. 4 Fuß hoch, 2 Fuß breit, in L. . . . . 12 —  
 „ **obtus.** Japanesische Lebensbaum-Cypresse v. gedrungenem Wuchs u. blaugrüner Färbung.  $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, i. L. 20 Gr. à . . . . . 1 10  
 „ **pisifera.** 1— $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, i. L. . . . . — 25  
 $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Fuß hoch, i. L. . . . . — 10  
 „ **sphaeroidea var. glauca (atrovirens).** Dunkelblaugrüne Varietät. Passen zur Bepflanzung von Grabstätten. Schöne Pflanzen v. 2— $2\frac{1}{2}$  Fuß Höhe u.  $\frac{3}{4}$ —1 Fuß Breite, i. L. . . . . 1 10  
 „ „ **var. fol. aureo varieg.** Lebhaft gelb panachirte Prachtpflanzen v. 4 Fuß Höhe, i. L. . . . . 7 —  
 2 Fuß hoch u.  $1\frac{1}{2}$  Fuß breit, i. K. . . . . 4 —  
 Sämmtliche Chamaecyparis sind höchst empfehlenswerthe Conifere, von schöner Tracht u. völlig hart.  
 † **Cupressus funebris.** Aus China. Hält bei uns nur in sehr geschützter Lage unter Bedeckung im Freien aus, ist aber seines höchst decorativen Habitus wegen für den Garten sehr empfehlenswerth. Pflanzen von 6 Fuß Höhe, i. K. . . . . 6 —

	Schöne Pflanzen v. 11 Fuß Höhe u. 3 Fuß breit, in Kübeln, <b>Prachtexemplare</b> . . . . .	16 —
†	<b>Cupressus funebris vera.</b> Zweige weit mehr hängend, als bei der vor- stehenden Art; daher auf Begräbnisstätten sehr geeignet. 3—4 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	3 15
"	<b>Lawsonii.</b> Die schönste Cypresse für das freie Land. 1—1½ Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	— 20
	2—2½ Fuß hohe u. 1½ Fuß breite, i. T. u. K. . . . .	1 10
	3—4 Fuß hohe u. 1½—2 Fuß breite, i. T. u. K. . . . .	3 —
"	<b>Lawsonii fol. aureo var.</b> Sehr schön goldgelb panachirt, effect- voll! ¾—1 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	1 10
"	" <b>var. erecta.</b> 2 Fuß hohe, schöne Pflanzen, i. T. . . . .	2 —
"	2—3 Fuß hohe, sehr schöne Pflanzen, i. T. u. K. . . . .	3 —
†	" <b>Mac Nabiana.</b> Süßliche amerikan. Cypresse, 2—3 Fuß hohe Pflan- zen, i. T. . . . .	— 20
†	<b>Cryptomeria japonica.</b> Durch ihren pyramidalen, schlanken Wuchs, ihr lichtgrünes Colorit, u. ihre elegant herabhängenden Zweige eine der schönsten Coniferen, die aus Japan eingeführt wurden. Hält nur in geschützten Lagen unter Bedeckung bei uns im Freien aus. 1½—2½ Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	— 15
	fol. albo var., 2 Fuß hoch, i. T. . . . .	1 —
"	" <b>var. araucarioides.</b> 1½ Fuß hoch, i. T. . . . .	— 25
"	" <b>viridis (Lobbia).</b> Unterscheidet sich von der Stammart durch compacteres Wachsthum u. helleres Grün. 3 Fuß hoch . . .	1 —
	1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 8
<b>Frenella</b>	<b>glauca.</b> 1 Fuß hoch, i. T. Süßliche, buschige Pflanzen . . . .	— 12
<b>Juniperus,</b>	<b>Wachholder.</b>	
"	<b>chinensis.</b> Süßliche Species, die ihre hellgrüne Tracht auch im Winter behält. ¾—1½ Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	— 15
"	<b>chrysouleuca.</b> Goldgelb schimmernde, neue Varietät. 1—2 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	1 —
"	<b>cinerascens.</b> Wachholder von graugrünem Colorit. 2—2½ Fuß hohe Pflanzen . . . . .	1 15
"	<b>drupacea.</b> Von Syrien. 1½—2 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . .	— 20
"	<b>excelsa (occidentalis).</b> Von pyramidalem Bau; Belaubung grau- grün. 1½—2 Fuß hoch, i. T. . . . .	1 —
"	<b>glauca.</b> Tracht graugrün. Ist ganz hart. Süßliche 1—1½ Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	— 20
"	<b>hibernica.</b> Der irische Pyramidenwachholder. 2—2½ Fuß hoch, i. K. . .	— 20
"	3 Fuß hoch, ¾ Fuß breit, i. K. . . . .	1 20
"	<b>phoenicea.</b> Effectvoll u. sehr empfehlenswerth zur Bepflanzung v. Teichränder u. Ufer v. Gewässern in Parkanlagen etc., da seine hängenden Zweige ihm den Anblick eines Trauerbaumes geben. 1½—2 Fuß hohe, sehr schöne Pflanzen, i. T. u. K. 15 Gr. à . .	1 —
"	<b>prostrata (J. decumbens, procumbens).</b> Der kriechende Wach- holder, sich eignend zur Bepflanzung v. Steinpartien. Starke, 1 Fuß hohe Pflanzen von ½ Fuß Durchmesser, i. fr. Lande . . .	— 15
†	" <b>religiosa.</b> Eine der lieblichsten Arten dieser Gattung, fein gegliedert u. bläulichgrün. 1½—2 Fuß hoch, i. T. . . . .	1 —
†	" <b>rigida.</b> Starrer Wachholder, neue Einführung v. Japan. ¾—1 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	15 Gr. à — 20
"	<b>Sabina.</b> 2 Fuß hoch, i. T. . . . .	— 15
"	" <b>fol. albo var.</b> 2½ Fuß hoch u. 1½ Fuß breit, i. K. . . . .	— 25
"	<b>sphaerica (J. Fortunei).</b> Kugelrundfrüchtiger Sevenstrauch aus Nordchina, mit schöner hellgrüner Tracht. 1½—2 Fuß hohe Pflanzen, i. T. . . . .	15 Gr. à — 25

- Juniperus tamariscifolia** (*J. sabinoides*). Baumartiger Wachholder von sehr schönem Ansehen. 1 Fuß hoch, i. L. . . . . — 20  
 3—4 Fuß hoch u. 2 Fuß breit, i. R. . . . . 2 15  
 „ *virginiana*. Rother Ceder, 2—2½ Fuß hoch, i. R. . . . . — 25  
 „ „ *pendula*. Rother Ceder m. hängenden Zweigen, 2—2½ Fuß hoch, i. L. . . . . 1 10
- Larix pyramidalis**, Varietät v. *L. europaea*, von compactem pyramidalen Bau, nach Art d. italienischen Pappeln. 1—1½ Fuß hoch, i. R. 1 —
- † **Libocedrus chilensis**. Eine d. durch gedrungeenen, buschigen Wuchs, eigenthümliche Form d. Blätter u. Zweige, sowie prächtiges, unterhalb silberweißes Colorit derselben, schönsten bekannten Coniferen, welche aber unsere Winter nur unter guter Bedeckung verträgt. Junge ¾—1 Fuß hohe Pflanzen, i. L. . . . . 1 10  
 „ „ *var. viridis*. Varietät der vorstehenden, von hellerem Colorit. 3—4 Fuß hohe Pflanzen u. 1—1½ Fuß Durchmesser, i. L. 4 —
- Picea**. Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.  
 „ *excelsa elegantissime var.* Silberweiß schimmernde Art, 3½—4 Fuß hoch u. 2 Fuß breit, i. L. . . . . 3 —  
 „ „ *inverta*. Zweige völlig zurückgekehrt, fast am Stamme anliegend. 1¾ Fuß hohe Pflanzen, i. R. . . . . 4 —  
 „ „ *monstrosa*. Macht verhältnißmäßig sehr lange Zweige, die, von Nebenästen entblößt, an ihrem Ende Büschel von Nadeln bilden. Höchst seltsame Spielart. 2 Fuß hoch, 1¼ Fuß breit, i. L. 1 15  
 „ „ *pendula*. 2—2½ Fuß hohe Pflanzen, i. R. . . . . 1 20  
 „ „ *pyramidata*. Baut sich regelmäßig u. compact pyramidal, wie eine italienische Pappel. 2½—3 Fuß hoch u. 2—2½ Fuß im Durchmesser, i. R. . . . . 3 —  
 1½ Fuß hoch in Töpfen . . . . . 1 10
- „ **Menziesii**. Ausgezeichnete, fein- u. langnadelige Species v. Nordamerika. Nadeln dunkelblaugrün. Sehr schöne Art. 2 Fuß hoch u. 1½ Fuß im Durchmesser, i. R. u. L. . . . . 1 —  
 3¾ Fuß hoch u. 2 Fuß Durchmesser, i. R. . . . . 4 —
- „ **Morinda** (*Abies Khutrow*, *Ab. Smithiana*). Schöne Species; langnadelig, fein. 1 Fuß hoch u. 2 Fuß breit, i. R. . . . . 1 10
- „ *nigra* (*Mariana*). Feinnadelige schwarzblaue Fichte v. westlichen Nordamerika. 3 Fuß hohe u. 2½ Fuß breite Pflanzen, i. L. 2 —  
 2—2½ Fuß hoch, i. L. . . . . — 20
- „ **orientalis**. Völlig dicht u. gedrungeenen sich bauende Art, m. kurzen zierlichen Nadeln, von den Gebirgen Kaukasien; zu Anpflanzungen sehr zu empfehlende, völlig harte u. schöne Rothtanne. 3—3½ Fuß hoch u. ebenso breit, i. R. . . . . 2 —  
 3—3½ Fuß hoch u. ebenso breit, im freien Lande . . . . . 1 15
- Pinus austriaca**. Österreichische Kiefer. 3—4 Fuß hoch u. ebenso breit, i. R. — 25
- „ **Cembra**. Die Alpenkiefer. Baut sich regelmäßig u. compact. 3—3½ Fuß hoch, 1½—2 Fuß breit . . . . . 1 10  
 4—4½ Fuß hoch, 2—2½ Fuß breit, i. R. . . . . 2 —  
 3—4 Fuß hoch, 2—2½ Fuß breit, im freien Lande . . . . . 1 15
- „ *excelsa*. Hängende Kiefer vom Himalaya. Die sehr langen Nadeln silberweiß glänzend, prachtvolle Species. 1½—2 Fuß hoch u. 1—1½ Fuß breit, i. R. . . . . 1 15  
 2—3 Fuß hoch u. 2 Fuß breit, i. R. . . . . 2 —  
 4 Fuß hoch u. 3 Fuß breit, i. R. . . . . 6 —  
 Prachtpflanzen von 8 Fuß Höhe u. 4—5 Durchm., i. R. . . . 10 —
- „ **Jessreyii**. Noch wenig verbreitete amerikan. Species, m. langen, dichten u. starren Nadeln, welche unsern Winter recht gut verträgt. 1½ Fuß hoch u. 1 Fuß breit, i. R. u. L. . . . . 2 15  
 2 Fuß hoch, i. L. . . . . 3 —



- † **Pinus insignis.** Stattliche Kiefer vom westlichen Nordamerika, welche unter leichter Bedeckung unsere Winter verträgt u. ihrer Schönheit wegen angebaut zu werden verdient, 2—2½ Fuß hohe Pflanzen, i. Z. 1 —  
3—4 Fuß hohe Pflanzen, i. Z. 2 —
- † „ **maritima (P. Brutia).** Die **Seckiefer.** 2—3½ Fuß hohe Pflanzen, in Töpfen 2 —
- „ **montana,** 1—1¼ Fuß hoch u. ebenso breit, i. Z. — 20
- „ **Taeda.** Der Typus dieser Unterabtheilung v. **Pinus.** Vaterland: Virginien, Pennsylvanien in sandigen Ebenen. Süßliche Pflanzen von 1—1¼ Fuß Höhe, i. Z. — 15
- Pseudo-Larix Kaempferii Gord. (Larix Kaempferii Lindl., Abies Kaempferii Fort.)** Die **Goldtanne** der Chinesen. Schöner Baum mit langen, breiten, hellgrünen Nadeln. Durch Tracht u. Habitus einer der anmuthigsten Zierbäume unter den Resinosen; dabei völlig hart. Schöne starke Pflanzen in folgenden Größen: 1 Fuß hoch u. ebenso breit 4 15  
1½ Fuß hoch u. ebenso breit 6 —  
1¾—2 Fuß hoch u. 1½ Fuß breit, buschig, i. K. 8 —  
2¼ Fuß hoch u. 2 Fuß breit, buschig, i. K. 10 —  
2½—3 Fuß hoch u. 2 Fuß breit, buschig, i. K. 16 —  
3¼—3½ Fuß hoch u. 2 Fuß breit, buschig, i. K. 20 —
- Retinispora.** Die **Retinisporen** sind japanische Lebensbaum-Cypressen von elegantem Wuchse u. mannichfaltigem, immer frischem u. schönem Colorit der Blätter u. Zweige. Haben bei uns unter sehr leichter Fichtenreißigbedeckung im Freien ausgehalten.
- „ **obtusa.** ¾—1 Fuß hohe Pflanzen, i. Z. 20 Gr. à 1 10
- „ **pisifera.** 1—1½ Fuß hohe Pflanzen, i. Z. — 25
- „ „ ½—¾ Fuß hohe Pflanzen, i. Z. — 10
- „ **squarrosa.** ½—¾ hohe Pflanzen, i. Z. — 15
- Salisburia** **adiantifolia (Ginkgo biloba).** Japanischer Nußbaum.  
1—1½ Fuß hohe Pflanzen, i. Z. — 10
- „ „ **fol. aureo varieg.** Goldgelbgefleckter ½—1 Fuß hohe Pflanzen, i. Z. — 20
- „ **incisa laciniata.** Geschnittblättriger. 1—1½ Fuß hoch — 20
- Taxodium distichum.** Die amerikanische **Sumpfcypresse.** Durch Tracht u. Färbung ausgezeichnete Conifere, welche im Spätherbste ihre Nadeln abwirft. 5—6 Fuß hohe schöne Pyramiden — 25
- „ **sinensis pendulum (Glyptostrobus pendulus).** Sehr geschätzte, noch wenig verbreitete Species von China, mit elegant herabhängenden Zweigen u. Aestchen. 2 Fuß hohe Pflanzen 1 10
- Taxus** **Eibenbaum.**
- „ **adpressa (Cephalotaxus tardiva).** Von Japan. ¼—½ Fuß hohe Pflanzen, in Z. — 10
- „ **baccata.** 3½—4 Fuß hohe und 2½ Fuß breite Pflanzen — 20
- „ „ **erecta.** Gedrungen aufrecht wachsender Eibenbaum.  
1 Fuß hohe Pflanzen, in Z. — 10  
1½—2 Fuß hohe Pflanzen, in Z. — 15  
2½—3 Fuß hohe Pflanzen, in Z. und K. — 25
- „ „ **fol. aureo varieg.** Mit effectvoller gelber Panachirung.  
½—1 Fuß hoch 5 Gr. à — 12  
1½—2 Fuß hoch, in Z. — 20  
3—4 Fuß hoch, in Z. — 25
- „ „ **fructu luteo.** Der gelbfrüchtige Eibenbaum, 2—3 Fuß hohe, sehr starke, buschige Exemplare, in Z. — 20
- „ „ **var. Nidpathensis.** Aufrechtstehende, sehr gedrungen sich bauende Varietät mit kurzen Blättern; ähnlich dem T. **erecta.** 1—2 Fuß hohe Pflanzen, in Z. 1 —

- Taxus baccata pyramidalis.** Schöne Varietät mit breiter Basis und von gedrungen pyramidalem Bau.  
 $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch und 1 Fuß breit, in K. . . . . 1 —  
 $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch, in L. . . . . — 20
- „ **hibernica.** Frischer Pyramiden-Taxus. Säulenartig sich bauend.  
 4— $4\frac{1}{2}$  Fuß hoch, schöne Pyramiden, im freien Lande. . . . . 1 15  
 12 Stück 10 Thlr.
- „ **fol. albo marginatis** (*T. elegantissima*). Blätterrund rein weiß panachirt.  $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in K. . . . . 2 —
- Thuja dumosa.** Dicht und breit sich bauender Busch, mit zahlreichen, kurzen, sächerförmigen Zweigen, von blaugrünem Colorit.  
 1 Fuß hohe Pflanzen, in L. . . . . — 12  
 2 Fuß hohe,  $1\frac{1}{2}$  Fuß breit, in K. . . . . 1 —  
 4 Fuß hohe,  $2\frac{1}{2}$  Fuß breit, in K. . . . . 3 —
- „ **elegans**, vide *Biota orientalis* Sieboldi.
- † „ **gigantea** (*Libocedrus decurrens*). Riesiger Lebensbaum von Obercalifornien, wo er eine Höhe von 140 Fuß erreicht. Von pyramidalem Bau und frischem, freundlichem Grün.  
 $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 20  
 $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . 1 10  
 5—6 Fuß hohe, buschige, pyramidale Bäumchen, in K. . . . . 6 —
- „ **Lobbii** (*Th. Menziesii*). Ähnlich dem vorstehenden, und auch in Wuchs und Form so großartig wie dieser.  $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. — 20  
 2— $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch und  $\frac{3}{4}$ —1 Fuß breit, in K. . . . . 1 10
- „ **occidentalis.** Amerikanischer Lebensbaum. 9—10 Fuß hoch, in K. . . . . 3 —
- „ **cristata.** Zweige kurz und gedrungen, Blätter fahnenförmig. Spielart von *Th. occidentalis*. 1 Fuß hohe Pflanzen, in L. — 15
- „ **var. macrocarpa.** Der großfrüchtige amerikanische Lebensbaum, von sehr compactem, pyramidalem, pappelähnlichem Bau. 1— $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 10  
 3—4 Fuß hoch, in L. . . . . — 25  
 6 Fuß hoch, in L. . . . . 1 10
- „ **triangularis.** Neue Spielart von *Th. occidentalis*.  
 1 Fuß hohe Pflanzen, in L. . . . . 1 —
- „ **plicata.** Breitgliederig, strauchartig.  $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 12  
 3 Fuß hoch, im Lande. . . . . 1 —
- „ **Vervaeana.** Von schönem, compactem, kegelförmigem Wuchse, mit gelblich grüner Färbung.  $\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in L. . . . . — 10
- „ **Warreana.** Schön pyramidal wachsend, von Sibirien.  
 4—5 Fuß hoch und 3 Fuß Durchmesser, in K. . . . . 4 —  
 3—4 „ „ „ 2— $2\frac{1}{2}$  „ „ „ K. . . . . 3 —  
 3—4 „ „ „ 2— $2\frac{1}{2}$  „ „ „ im L. . . . . 2 —  
 $2\frac{1}{2}$  „ „ „ in L. . . . . — 12
- Thujopsis borealis;** vide *Chamaecyparis nutkaensis*.  
 „ „ var. *glauca*, *dolabrata* et *dolabrata* fol. var.; vide junge Coniferen.
- Tsuga canadensis.** Die Hemlockstanne. Zweige hängend, 4—5 Fuß hoch und 3 Fuß breit, in K. . . . . 3 —  
 $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch und 2 Fuß breit, in K. . . . . — 25  
 $1\frac{1}{2}$ —2 „ „ in L. . . . . — 12  
 $1\frac{1}{2}$ —2 „ „ im L. . . . . — 6
- „ **Douglasii.** Pyramidal und rasch wachsende Tanne vom nordöstlichen Californien; von hellem, freundlichem Grün. Schöne Species. 2— $2\frac{1}{2}$  Fuß hohe schöne Pflanzen, in K. und L. . . . . 1 15  
 7 Fuß hohe, prächtige Bäumchen, in K. und L. . . . . 4 —
- „ **var. taxifolia.** Varietät von vorstehender, mit ein wenig längeren und breiteren Nadeln.  $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch, in L. und K. . . . . 2 15

**Tsuga Williamsonii.** Californische Schierlingstanne. Neu!  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Fuß hohe Samenpflanzen . . . . . 2 —

† **Wellingtonia gigantea.** Die californische Riesentanne. Von diesem prachtvollen Baume, dessen Schönheit und decorativer Werth häufig genug besprochen worden ist, haben wir hübschen Vorrath zu den nachstehenden Größen und Preisen. Wir liefern davon nur Pflanzen, welche aus Samen gewonnen wurden, weil die aus Stecklingen gezogenen niemals den schönen Wuchs mit breiter Basis annehmen, als die Samenpflanzen. Der Baum verträgt unsere Winter vollkommen, und nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir solche Pflanzen, welche der Zugluft stark ausgesetzt sind, vorsichtshalber leicht mit Tannenzweigen.

Wir liefern Pflanzen von $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe . . . . .	— 10
$\frac{1}{2}$ " " und 1— $\frac{1}{2}$ Fuß Breite, in T. . . . .	1 15
2— $2\frac{1}{2}$ " " " $1\frac{1}{2}$ " " " " . . . . .	2 15
4 " " " 2 " " " " . . . . .	8 —
5 " " " 3 " " " " . . . . .	10 —

Jüngere Pflanzen, vide Rubrik „Junge Coniferen“ in der IV. Abtheilung dieses Catalogs.

## Zwergtannen und Zwergkiefern,

### sowie einige andere strauchartige Coniferen.

Da diese reizenden Zwergformen gewissermaßen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen nur eine sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äußerst gedrungenen, eigen thümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelförmige, theils kurze pyramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniaturformen eignen sie sich besonders für kleine Gärten, aber auch als Bospflanzen bei großen Anlagen, wo sie, namentlich mit pyramidalen Coniferen von nicht zu hohem Wuchse, z. B. mit *Juniperus hibernica* und *Taxus hibernica*, sowie den niedrigeren Lebensbäumen, wie *Biota aurea* und *compacta* vermischt, einen reizenden Effect hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb von manchen Arten Pflanzen von einem Fuß Höhe und Breite schon als starke Exemplare zu betrachten sind und fast alle diese Zwergformen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuß ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

Sämmtlich in Gefäßen.

Thlr. Gr.

- Abies Hudsonica.** Species mit kurzen, breiten, dunkelgrünen Nadeln, die eine Höhe von 3—4 Fuß erreicht.  $3\frac{1}{2}$  Fuß hoch und 2 Fuß Durchmesser. In dieser Stärke außerordentlich selten, in T. . 15 —
- Biota pygmaea (R. Smith).** Ohne Zweifel der kleinste Lebensbaum. Niedliche compacte Zwergart von China. 1 Fuß hoch, in T. . . . . — 20
- „ *recurva nana.* Neue Varietät von sehr gedrungenem Bau; die äußeren Zweigenden hängend, sehr hübsch.  $\frac{3}{4}$  Fuß hoch, in T. . . — 25
- Chamaecyparis ericoides (Thuja ericoides).** Ericenblättriger Lebensbaumcypresse, von sehr schönem, dichtem, conischem Bau, welche eine Höhe von 4—5 Fuß erreicht. 1 Fuß hohe Pflanzen von  $\frac{1}{2}$  bis 1 Fuß Durchmesser, in T. . . . . — 12
- Cryptomeria japonica nana.** Buschige Zwergform dieses bekannten Baumes.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Fuß hoch, in T. . . . . — 20
- Cupressus Lawsoni var. compacta.** Sehr gedrungen, niedrig bleibende Spielart dieser schönen und bei uns ausdauernden Cypresse. 9—12 Zoll hoch, 4—5 Zoll breit, in T. . . . . 1 10



† <b>Frenela</b> ericoides. Feine, pyramidal und gedrungen sich bauende Species von Neußholland, die bei uns mit ganz leichter Bedeckung aus- hält. Sie erreicht eine Höhe von 3—4 Fuß.	
1 Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	— 8
<b>Juniperus</b> hibernica var. <b>compressa</b> . Zwergiger Pyramiden-Wachholber. Junge Verebelungen . . . . .	
„ japonica nana. Sich breit bauend. 1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 20
„ squammata. Schuppiger Wachholber mit niederhängenden Aesten; bildet einen Busch von 4—5 Fuß Höhe.	— 20
2 Fuß hoch und ½ Fuß breit, in T. und R. . . . .	1 —
„ virginiana var. nana. ½—1 Fuß hoch, in T. . . . .	— 20
<b>Picea</b> excelsa Clanbrasiliana. Zwergart mit kurzen Nadeln, welche einen kleinen compacten, runden Strauch bildet und ungefähr 4 Fuß hoch wird.	
1 Fuß hoch und 1 Fuß breit, in R. . . . .	1 10
1½ „ „ „ 1⅓ „ „ „ „ . . . . .	4 —
2 „ „ „ 2 „ „ „ „ . . . . .	6 —
„ <b>nana</b> . Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelförmig und erreicht einen Durchmesser von 4—5 Fuß.	
Pflanzen von 1 Fuß Höhe und 1 Fuß Breite, in R. . . . .	3 —
„ „ 1½ „ „ „ 1¾ „ „ „ „ . . . . .	6 —
„ „ 2½ „ „ „ 2½ „ „ „ „ . . . . .	10 —
Letztere sind wahre Prachtexemplare.	
„ „ pygmaea (globosa). Runde Zwergform, die nur eine ganz geringe Höhe erreicht, mit kurzen Nadeln, sehr hübsch.	
¾ Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	3 —
„ nigra nana. ½ Fuß hoch und 5 Zoll breit, in R. . . . .	3 —
„ „ pumila. Elegante, niedliche Zwergart, mit kurzen Nadeln und Aesten; sehr gedrungen und von bläulich grüner Färbung.	
1 Fuß hoch und 2 Fuß breit, in R. . . . .	6 —
<b>Pinus</b> Strobus nana (tubulaeformis). 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen in T. . . . .	
8 Zoll hoch und 9 Zoll breite Pflanzen, in T. . . . .	6 —
„ „ umbraculiflora (rotundata nana). 8 Zoll hohe und 1 Fuß breite Pflanzen, in R. . . . .	5 —
Diese höchst interessante Varietät von Pinus Strobus, welche nur eine Höhe und Breite von 2—3 Fuß erreicht, ist sehr buschig, globulös, mehr oder weniger oben platt und sehr langnadelig.	
„ sylvestris <b>pumila</b> . (Nicht zu verwechseln mit P. Pumilio.) Zwergform unserer Kiefer oder Föhre. Pflanzen von 1 Fuß Höhe und Breite, in R. . . . .	
1 —	1 —
<b>Taxus</b> ericoides. Zwergiger Taxus mit kurzen, breiten Blättern, ½ bis 1 Fuß hoch, in T. . . . .	
— 15	— 15
<b>Thuja</b> canadensis var. nana. 1½—2 Fuß hoch, in T. . . . .	
1 15	— 12
„ ericoides. Sehr zierliche Art, 1 Fuß hoch, in T. . . . .	

Von vorstehenden Zwergconiferen liefern wir, wenn uns die Auswahl überlassen wird,

12 verschiedene, sehr hübsche Arten für 10 Thaler.

## Andere Pflanzen

### zur Bildung immergrüner Gruppen.

<b>Aucuba.</b> (Man beliebe die vollständige Collection dieser Gattung pag. 11 nachzusehen.)	à Stück Thlr. Gr.
<b>Berberis Darwinii.</b> 1—1½ Fuß hoch in Töpfen . . . . .	— 6
12 Stück 2 Thlr.	
<b>Buxus arborescens</b> fol. var. 1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 8
„ „ sempervirens. 7—8 Fuß hoch, unterer Durchmesser 1½ Fuß, schöne Pyramiden, in Körben und Kübeln . . . . .	10 —
<b>Cotoneaster melanocarpa</b> . . . . .	— 8
<b>Hedera</b> , vide rankende Pflanzen.	
<b>Ilex aquifolium</b> 4—5½ Fuß hoch, 1½ Fuß Durchm. . . . .	3 —
„ „ fol. arg. marg. 5 „ „ 1½ „ „ . . . . .	3 —
„ „ „ „ „ 3½ „ „ 1½ „ „ . . . . .	2 15
„ „ aur. marg. 5—6 „ „ 1½ „ „ . . . . .	3 15
„ „ „ „ „ 4 „ „ 1½ „ „ . . . . .	3 —
„ „ var. 4—5 „ „ 1½ „ „ . . . . .	3 —
„ „ fructu luteo 6—7 „ „ 2 „ „ . . . . .	3 —

☞ Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem gut gehaltenen Garten Aufnahme!

<b>Kalmia latifolia.</b> Starke, 2—3 Fuß hohe, blühbare Pflanzen . . . . .	1 10
12 Stück 10 Thlr. Extra-Auswahl 12 Stück 12 —	

Einer der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Menge seiner rosenrothen Blumenbalden.

<b>Luzuriaga radicans.</b> Immergrüne Pflanze von Chili; kriechend . . . . .	— 8
<b>Mahonia aquifolium.</b> 2½ Fuß hoch und buschig . . . . .	— 6
„ fascicularis. 1½ Fuß hoch und buschig . . . . .	— 6
„ Bealii, japonica und intermedia. Die großblättrigen japanischen Species, 1½—2 Fuß hoch, starke Pflanzen . . . . .	à 1 10
<b>Prunus Lauro-Cerasus.</b> Kirchlorbeer, starke Pflanzen von 2½ F. Höhe . . . . .	— 10
<b>Rhododendron ponticum</b> , vide die Varietäten für das freie Land unter der betreffenden Rubrik in diesem Kataloge.	

**Ilex.** Stecheiche, Hülse. Junge Pflanzen.

Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
„ aquifol. ferox. . . . . — 10	<b>Ilex aquifol. myrthifol. argenteo</b>
„ „ fol. arg. marg. — 12	marg — 15
„ „ fol. aureo margin. — 10	„ „ nobile . . . . . — 8
„ „ in medio aur. picta — 10	„ „ opacea . . . . . — 10
„ „ arg. marginata . . . — 12	„ „ dipirena . . . . . — 12
„ „ cupreis pictis. . . . — 10	„ „ furcata . . . . . — 10
„ „ (rubricaula) elegant. arg. marg. — 10	„ „ latifolia . . . . . — 8
„ „ „ „ aur. marg. — 10	„ „ latispina. . . . . — 8
„ „ fructu roseo . . . . — 12	„ „ Maderensis . . . . — 12
	„ „ pendulum . . . . . — 20

## Schling-Pflanzen (rankende Gewächse)

### zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben, Säulen etc.

Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
<b>Boussingaultia basseloides</b> — 5	<b>Cissus heterophyllus</b> fol. var. — 8
Ungemein rasch wachsende	„ Thunbergii fol. pictis . . — 6
Schlingpflanze, welche sich besonders zur Bekleidung v. Säulen eignet. 12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.	„ „ fol. sanguineis. Neu! 1 —
	<b>Clematis atropurpurea</b> . . . . — 25
	„ azurea grandiflora . . . . — 8

Thlr. Gr.

Thlr. Gr.

Clematis candidissima plena . . .	20	Hedera rhombea var. . .	6
» Fortunei . . .	25	Lonicera brachypoda fol. aur.	
» Guascoyi . . .	10	reticulatis . . .	5
» Helene . . .	8	» quercifolia fol. var. . .	6
» hybrida splendida . . .	20	Luzuriaga radicans . . .	8
» Jackmanni . . .	1 20	Periploca graeca . . .	6
» lanuginosa candida . . .	20	Pilogyne suavis . . .	3
» Louise . . .	6	Eine reizende zierliche Schling-	
» rubro-violacea . . .	1 20	pflanze von ausserordentlichem	
» Sophie . . .	6	Wachsthum, eignet sich ihrer	
» Standishi . . .	15	graceusen Belaubung wegen zur	
» violacea . . .	12	Bildung von Festons, Guirland-	
» viticella venosa . . .	12	den etc. 12 Stück 1 Thlr.	

## PAEONIA ARBOREA (P. Moutan var.)

Auswahl der schönsten Varietäten.

Die baumartigen Pfingstrosen, welche in den schönsten und mannichfaltigsten Farben prangen, zum grossen Theil gefüllt blühen und überdem von decorativer Belaubung sind, bilden eine Hauptzierde der Gärten. Sie blühen in den Monaten Mai und Juni.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Veredlungen, die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

	I.	II.
	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
36. Adèle Mouchelet . . .	1	15
37. Alba plena. Rein weiss, mittelgross, halbgefüllt . . .	—	25 — 15
88. Alexander II. (A. Versch.) . . .	1 10	20
103. Arborea fol. aureo var. Mit gelbbunter Belaubung . . .	—	15 — 10
38. Arethusa. Voll, hell lilarosa, in weiss übergehend . . .	—	15 — 10
39. Atrovioleacea grandiflora (Belg.). Gross, voll, dunkellila . . .	1 10	20
40. Carlii. Zart lila, gefüllt . . .	—	15 — 10
100. Carolina (Manetti). Gross, halbgefüllt, fleischfarben mit violeten Spitzen . . .	—	15 —
83. Casoretti. Neu! . . .	1	15
42. Comte de Flandre (Donkelaar). Sehr gross und voll, lebhaft rosa . . .	—	20 — 10
43. De Bugny (Amand). Sehr gross, zart weissfleischfarben, stark gefüllt . . .	—	15 —
110. Elisabetta (Casoretti). Sehr gross, stark gefüllt, lebhaft carminponceau . . .	1	—
112. George (Standish) . . .	—	25 — 15
104. Herbartiana . . .	—	25 —
45. Hissiana. Weiss mit purpurnen Spitzen, halbgefüllt . . .	—	15 —
46. Horatiana. Mittelgross, blass lilarosa . . .	—	20 — 10
47. Impératrice Josephine (Hiss.). Weinroth, rosa flaneirt, sehr gross u. voll . . .	—	25 — 15
48. Koechlinii. Dunkellila, gefüllt . . .	—	15 — 10
49. Laetes plena (David). Rahmweiss, gut gefüllt . . .	—	25 — 15
50. Lilacina major plenissima. Hell violet und stark gefüllt . . .	—	15 — 10
51. Mad. de Vetry (Guérin). Gross, gewölbt, dicht gefüllt, brillant lilarosa . . .	—	25 — 15
122. Marie Thérèse (A. S.). Sehr gross, stark gefüllt, rein weiss mit fleischfar-		
benem Centrum . . .	—	— 20
116. Maxima plena (Italien). Weiss, mit lila Anflug, gefüllt . . .	—	25 — 15
52. Ononis oder Regia. Lebhaft rosa, halbgefüllt . . .	—	12 — 8
53. Prince de Wagram (Amand). Gross, halbgefüllt, schön rosa mit dunkle-		
rem Centrum . . .	—	15 — 10
54. Rinzi (Casoretti). Carminrosa, sehr gross, stark gefüllt . . .	1 10	20
55. Rosea odorata = Rubra odorata. Halbgefüllt und lebhaft rosa . . .	—	10 —
129. Rosea prolifera (Laurentius). Gross, doppelt gewölbt (prolifirend). Rosa.		
im Innern carminrosa, Rand der Blumenblätter blassrosa, fast weiss . . .	1 15	20
107. Speciosissima. Hell lila und voll . . .	—	25 — 15
57. Triomphe de Malines (Bel.). Gross, hellviolet, nach Innen dunkler . . .	—	25 — 15
87. Triomphe de Marseille . . .	1 10	—
59. Vandermaelenii (Belg.). Gross, voll, weiss mit rosa Anflug, in rein weiss		
übergehend . . .	—	15 — 10
58. Vanhouttei (Italien). Sehr gross, voll, hellcarmin . . .	—	25 — 15
115. Victoria (Mathieu). Gross, gefüllt, rein weiss . . .	—	— 15

Von vorstehendem Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 5 Thlr. und für 3 Thlr.

25 „ „ 10 „ „ 6 „



## Varietäten aus China und Japan.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Grösse der Blumen alle älteren bekannten Varietäten, und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils rein weissen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Sorten aus.

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
114. <i>Alba gigantea</i> C. Koch. (Aus Japan durch Siebold eingeführt.) Die grösste weisse Päonie; Blume 12 Z. im Durchm., halbgefüllt; Blumenblätter sehr gross und breit, transparent atlasweiss, an der Basis rosa scheinend. Von grossem Effect (Jeder Bestellung wird eine bunte Abbildung gratis beigelegt.) . . . . .	2	—	1	5
Sehr stark, mit Blütenknospen . . . . .	4	—	—	—
60. <i>Atrosanguinea</i> . Dunkelcarmoisin mit hellrothem Schimmer, halbgefüllt . . . . .	—	—	1	—
61. <i>Beauty of Canton</i> . Lebhaft rosa, lila nancirt, gefüllt . . . . .	1	10	—	20
62. <i>Bérénice</i> . Schön rahmweiss, die Basis der Blumenblätter hellcarmin, voll . . . . .	1	10	—	20
64. <i>Colonel Malcolm</i> . Purpurroth und gefüllt . . . . .	—	—	1	—
63. <i>Confucius</i> . Leuchtend dunkelrosa, gefüllt . . . . .	1	—	—	—
65. <i>Cornelia</i> . Brillant dunkelamaranth, gefüllte Blume von enormer Grösse . . . . .	1	10	—	20
66. <i>Doctor Bowring</i> . Gross, voll, schön dunkelrosa . . . . .	1	10	—	20
67. <i>Globosa</i> . Gross, voll, weiss, die Basis der Blumenblätter mit carmin Anflug . . . . .	—	—	—	25
113. <i>Hippolyte</i> . Schön lebhaft rosa und gefüllt . . . . .	1	10	—	20
70. <i>Ida</i> . Glänzend weiss mit rosa Anhauch, voll . . . . .	—	25	—	15
72. <i>Mandarin</i> . Fleischfarbenlila, gut gefüllt . . . . .	1	10	—	20
74. <i>Pride of Hongkong</i> ( <i>Orgueil de Hongkong</i> ). Leuchtend hellroth . . . . .	1	—	—	20
117. <i>Remembrance of Downing</i> . . . . .	—	—	1	—
75. <i>Reveesiana</i> . Lackfarbenrosa auf fast schwarzem Grunde, halbgefüllt . . . . .	1	10	—	20
76. <i>Robert Fortune</i> . Leuchtend rosa, fast scharlach, gefüllte, gut gebaute Blume . . . . .	1	10	—	20
77. <i>Salmonea</i> . Schön lachstroth und gefüllt . . . . .	1	10	—	20
78. <i>Samarang</i> . Dunkelroth, Mitte ganz schwarz, Anemonenform und gefüllt . . . . .	1	15	—	20
79. <i>Sir George Staunton</i> . Pfirsichrosa, sehr gross und voll . . . . .	1	10	—	20
80. <i>Vivid</i> . Leuchtend hellroth, Basis schwarz, halbgefüllt . . . . .	1	10	—	20
81. <i>Zenobia</i> . Dunkelpurpurroth mit amaranthblauer Schattirung, atlasglänzend, gross und sehr voll . . . . .	1	10	—	20
82. <i>Zoroaster</i> . . . . .	2	—	1	—

Von vorstehenden chinesischen Gartenvarietäten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Sorten für 5 und für 3 Thlr. — 12 Sorten für 10 und für 6 Thlr.

## RHODODENDRON.

Auswahl der schönsten Hybriden für das freie Land,  
sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen von 1½ — 2 Fuss Höhe. — Die der II. Colonne auf kräftige vorjährige Herbstveredlungen.

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
1. <i>Adèle</i> (Byls). Lilarosa, Blume und Dolde gross . . . . .	—	10	—	6
2. <i>Albion</i> (Engl. Hybr.). Roth mit dunkeln Punkten . . . . .	—	12	—	8
4. <i>Album purpureum</i> (Waterer). Blume gross, weiss mit purpurnen Flecken . . . . .	—	10	—	—
265. <i>Alexander von Humboldt</i> (Walther). Fleischfarbenlila. Centrum der Fahne orange, mit braunen Punkten . . . . .	—	25	—	15
269. <i>Amalie Pfeiffer</i> (Walther). Hybride von Catawbiense und maximum, zart incarnatroth, Fahne hellgelb mit rothen Fl. . . . .	—	20	—	10
6. <i>Amazone</i> (Rollisson). Schön roth und leichtblühend . . . . .	—	12	—	8
7. <i>Ambrosilo</i> (Byls). . . . .	—	12	—	8
8. <i>Antagonist</i> (Standish). Dunkelpurpurroth . . . . .	—	15	—	10
9. <i>Antonio</i> . Rosa mit weisser Schattirung . . . . .	—	—	—	8
338. <i>Archiduc Etienne</i> (A. V.). Schönes Rhododendron mit rein weissen Blumen und fast ganz schwarzer Zeichnung. Neu! . . . . .	—	—	2	—
10. <i>Artevelde</i> (Byls). Grosse rein lila Blume; schöne Belaubung . . . . .	—	—	—	8
323. <i>Attila</i> (J. Water). Dunkelpurpur, carmoisin nancirt . . . . .	—	—	2	—
11. <i>Arthur Henderson</i> . . . . .	—	—	—	8

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
12. <i>Atropurpureum novum</i> ( <i>Verschaff.</i> ). Schwärzlich purpur, sehr reichblühend . . . . .	—	12	—	8
257. <i>Auguste van Geert</i> ( <i>A. v. G.</i> ). Blume sehr gross, Bouquet rosa mit breitem, hellvioletem Rande, die oberen Blumenblätter mit vielen dunkelbraunen Flecken . . . . .	1	—	—	15
267. <i>Auguste Walther</i> ( <i>Walther</i> ) . . . . .	—	—	—	10
284. <i>Augustum</i> ( <i>Byls</i> ). Von gt. Bau, frisch carminrosa, hübsch gefl. . . . .	—	12	—	6
324. <i>Béranger</i> ( <i>Noble</i> ). Weiss mit rother und brauner Zeichnung . . . . .	—	—	1	20
14. <i>Betsy Trodwood</i> ( <i>Engl. Hybr.</i> ). Lilarosa, weiss marmorirt . . . . .	—	—	—	8
326. <i>Black eyed Susan</i> ( <i>W.</i> ). Lilapurpur mit ganz schwarzer Zeichnung . . . . .	—	—	1	20
15. <i>Blandyanum</i> ( <i>Standish</i> ). Purpurroth . . . . .	—	12	—	6
16. <i>Bougainville</i> ( <i>Byls</i> ). Amaranthroth, Fahne weisslich . . . . .	—	12	—	6
278. <i>Bouquet de Marie</i> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	—	20	—	10
17. <i>Bouquet de Flore</i> ( <i>Standish</i> ). Grosses rosa Bouq., reichbl. . . . .	—	—	—	8
18. <i>Bride</i> . Rein weiss, sehr reichblühend. Kräftige Belaubung . . . . .	—	12	—	8
19. <i>Bylsianum</i> ( <i>Versch.</i> ). Lebhaft rosa, nach der Mitte weiss . . . . .	—	10	—	6
277. <i>Candidum punctatum</i> . Weiss mit schwarzen Punkten . . . . .	—	12	—	6
20. <i>Captivation</i> ( <i>Standish</i> ). Rosig carmin, schwarz gefleckt. . . . .	—	12	—	6
263. <i>Carl Walther</i> ( <i>Walther</i> ). Eigenthümliche Blütenform von prächtig lilablauer Färbung . . . . .	—	20	—	10
22. <i>Clementine</i> ( <i>Byls</i> ). Rosa . . . . .	—	12	—	6
276. <i>Clethraefolium</i> . . . . .	—	20	—	—
21. <i>Clothilde</i> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	—	12	—	6
23. <i>Clowesianum</i> ( <i>Rollis</i> ). Weiss mit schwarzen Flecken . . . . .	—	12	—	—
26. <i>Colonel van Geert</i> . . . . .	—	15	—	8
27. <i>Compeer</i> ( <i>Engl. Hybr.</i> ). Dunkelrosa, sehr schön punktirt . . . . .	—	12	—	6
286. <i>Comte de Flandre</i> ( <i>Byls</i> ). Atlasrosa . . . . .	—	15	—	8
31. <i>Comtesse de Hainaut</i> ( <i>A. Versch.</i> ). Rosaweisse, halbgefüllte grosse und schöne Blume . . . . .	—	10	—	6
29. <i>Concessum</i> ( <i>Byls</i> ). Hellrosa, Fahne rostbraun . . . . .	—	10	—	6
25. <i>Concinnum punctatum</i> ( <i>Roll.</i> ) . . . . .	—	—	—	8
161. <i>Coronatum</i> ( <i>Jackson</i> ). Rosa, schönes Bouquet . . . . .	—	15	—	8
320. <i>Cunningham's White</i> . Frühblühende Sorte, rein weiss . . . . .	—	—	1	15
34. <i>Delicatissimum</i> ( <i>J. Waterer</i> ). Blass fleischfarben . . . . .	—	10	—	6
245. <i>Donna Maria</i> . . . . .	—	10	—	6
36. <i>Duc de Brabant</i> ( <i>Byls</i> ). Dunkelroth in rosa verlaufend, ohne Flecken . . . . .	—	—	—	8
244. <i>Duchesse d'Orleans</i> ( <i>Byls</i> ). Purpurroth . . . . .	—	—	—	8
162. <i>Electum</i> ( <i>Jackson</i> ). Zwergsorte . . . . .	—	12	—	—
38. <i>Elfriede</i> ( <i>Byls</i> ). Prächtig rosa, schöne Blume mit sehr grosser Fahne . . . . .	—	10	—	6
258. <i>Emma Töpfer</i> ( <i>Walther</i> ). Incarnatrosa, mit bläulichen Reflexen und grosser, zimmetbrauner Zeichnung . . . . .	—	15	—	8
40. <i>Erectum</i> . Carmoisinrosa, grosse Dolde . . . . .	—	—	—	10
41. <i>Erzherzog Stephan</i> ( <i>Jost</i> ) . . . . .	—	10	—	6
42. <i>Esméralda</i> ( <i>Byls</i> ). Lebhaft roth auf weissem Grunde . . . . .	—	12	—	6
43. <i>Etendard de Flandre</i> ( <i>v. H.</i> ). Ausgezeichnete Sorte; dunkellila mit vielen schwarzen Flecken und grosser Fahne . . . . .	—	—	—	8
241. <i>Etendard rose</i> . Blume gross, glänzd. rosa mit hübscher Fahne . . . . .	—	12	—	6
339. <i>Exquisitum</i> ( <i>A. V.</i> ). Schöne, zart rosafarbige Dolde mit kräftiger Zeichnung der obern Petalen. Neu! . . . . .	—	—	2	—
45. <i>Favorite</i> ( <i>Byls</i> ). Purpurroth, braun gefleckt . . . . .	—	12	—	6
46. <i>Fleur de Marie</i> ( <i>Byls</i> ). Carminroth, Mitte weisslich . . . . .	—	10	—	5
47. <i>Fleur du Roi</i> ( <i>v. H.</i> ) . . . . .	—	10	—	6
281. <i>Friedr. Ad. Haage</i> ( <i>Walther</i> ). Purpurviolet, rothbraun gefleckt und marmorirt . . . . .	—	20	—	10

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
232. <b>Franz Joseph (Rinz).</b> Glänzend hochcarmin, dunkel punk- tirt, grosse Bouquets . . . . .	—	—	—	10
49. <b>Gandavense (Byls).</b> Lilaroth, gefleckt und punktirt . . .	—	—	—	8
262. <b>Garteninspector Baumann (Walther)</b> . . . . .	—	15	—	8
50. <b>George Cunningham (Standish)</b> . . . . .	—	12	—	6
53. <b>Gevaert (Byls).</b> Lilarosa . . . . .	—	—	—	6
51. <b>Giganteum</b> . . . . .	—	12	—	—
52. <b>Globosum (Jackson)</b> . . . . .	—	12	—	6
309. <b>Gloire de Bellevue (Verv.).</b> Neu! Zart rosa mit scharf begrenzten, zart rosa Flecken; sehr dichte Bouquets . . .	1	—	—	15
54. <b>Gontran (Byls).</b> Kirschroth in carmin übergehend . . .	—	10	—	6
55. <b>Grande-duchesse Hélène (A. V.).</b> Blassrosa, mit grösser gelblicher Zeichnung; grosse schöne Blume . . . . .	—	—	—	12
258. <b>Grandiflorum (Byls)</b> . . . . .	—	12	—	6
57. <b>Gretry (Byls).</b> Hellrosa mit weissem Reflex. Gross weiss gefl.	—	—	—	6
305. <b>Griffithii</b> . . . . .	—	25	—	15
59. <b>Gulnare (Byls).</b> Blau, mit grosser pyramidaler Dolde . .	—	—	—	8
60. <b>Hartley Lutrell (Engl. Hybr.).</b> Zart rosa, sehr hübsche Sorte . . . . .	—	10	—	6
61. <b>Haydée (Byls).</b> Lebhaft rosa . . . . .	—	15	—	8
63. <b>Héloise (Byls)</b> . . . . .	—	12	—	8
239. <b>Herzog Alexander von Württemberg (Rinz).</b> . . . . .	—	15	—	8
260. <b>Herzog Paul Wilhelm von Württemberg (Walther).</b> Dun- kellila mit rosa nüancirt und purpurn gezeichnet . . . . .	—	15	—	8
64. <b>Hortense (Byls).</b> Carmin mit grossen weissen Streifen . .	—	12	—	6
131. <b>v. Humboldt (Byls)</b> . . . . .	—	—	—	10
321. <b>Jacques von Artevelde (J. Baum.).</b> Zartrosa mit gelber Zeichnung auf allen Petalen . . . . .	—	—	1	20
65. <b>Janthe</b> . . . . .	—	20	—	10
67. <b>Jean Locks (A. V.).</b> Blumegross, blassrosa m. dunkl. Zeichn.	—	15	—	8
68. <b>Jeanette.</b> Schöne lila Blume mit gelber Zeichnung . . .	—	—	—	8
69. <b>Ida (Byls).</b> Tief lilacarmoisin, mit orange Zeichnung . . .	—	—	—	8
164. <b>igneum (Jackson).</b> Zwergsorte . . . . .	—	12	—	6
70. <b>Illuminator (Waterer).</b> Zartrosa . . . . .	—	10	—	6
234. <b>Impératrice Eugénie (Dauvesse).</b> Dunkelpurpurn mit grosser schwarzer Zeichnung . . . . .	—	15	—	8
319. <b>Johann Stern (Rinz).</b> Weiss mit lichtem lila Rande . . .	—	—	1	15
72. <b>Jordaens (Byls).</b> Hellamaranth mit braungelber Fahne . .	—	—	—	8
73. <b>Iphigenia (Byls)</b> . . . . .	—	12	—	—
74. <b>Leopard (Waterer).</b> Zart lilarosa, die ganze Blume ge- fleckt und gestreift . . . . .	—	—	—	10
290. <b>Linné (Walther).</b> Prächtig hellblau, sehr grossblumig u. von gedrungnem Bau . . . . .	—	—	—	10
75. <b>Lord Byron (Engl. Hybr.).</b> Purpurroth, bläul.-schwarz gefl.	—	12	—	6
242. <b>Maculatam nigrum superbum.</b> Carmoisin, schwarz getigert .	—	15	—	8
261. <b>Madame S. Bosse (Walther).</b> Prächtig blau, weiss nüancirt und verlaufend, mit rother Zeichnung, oft hell, gefüllt . .	—	—	—	15
76. <b>Madeleine (Byls).</b> Amaranthroth mit dunklem Reflex . .	—	—	—	8
259. <b>Maja</b> . . . . .	—	—	—	10
77. <b>Maid of Saragossa.</b> Rosenroth . . . . .	—	—	—	10
78. <b>Maid of Athen (Standish).</b> Blassrosa mit braunen Flecken .	—	12	—	8
79. <b>Menziesii (Engl. Hybr.)</b> . . . . .	—	—	—	8
81. <b>Meteor (Wat.).</b> Carmoisinrosa . . . . .	—	12	—	8
82. <b>Minnie (Standish).</b> Weiss mit blasslila Saum und grosser grüngelb getigelter Fahne . . . . .	—	—	—	10
317. <b>Mrs. Fitz Gerald (J. Waterer).</b> Hellearmoisin in grossen dichten Bouquets. Neu! . . . . .	—	—	1	—



	I.		IIr	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
84. <b>Mrs. Hormans</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ). Weiss mit gelber Zeichn.	—	—	—	10
86. <b>Mrs. John Waterer</b> . Schön carmoisin . . . . .	—	—	—	10
85. <b>Mrs. Loudon</b> . Schön carmin, dunkel gefleckt . . . . .	—	10	—	8
83. <b>Mozart</b> ( <i>A. v. G.</i> ) . . . . .	—	15	—	—
84. <b>Napoléon Baumann</b> ( <i>J. Baum</i> ). Lebhaft rosa, durchaus dunkelcarmoisin getigert, sehr grosse Blume und Dolde .	—	20	—	10
249. <b>Neige et Cerise</b> ( <i>von H.</i> ). Glänzend schneeweiss, Rand und Schlundmündung leuchtend carmin . . . . .	—	25	—	20
88. <b>Nobleanum</b> ( <i>Noble</i> ). Lebhaft rosa, mit weissem Schlunde und grüner Zeichnung . . . . .	—	15	—	8
250. <b>Nuits de Young</b> ( <i>J. W.</i> ). Bläul. carmin mit schwarzgef. Fahne	—	25	—	15
233. <b>Othello</b> ( <i>Rinz</i> ). Lebh. amaranthroth mit schwarzem Reflex	—	15	—	8
89. <b>Pardoloten</b> . Amaranthlila mit grossen schwarzen Flecken	—	10	—	5
243. » <b>versicolor</b> ( <i>v. H.</i> ). Grosse weisse Blume, lila nüancirt, breit amaranthroth umsäumt. mit gelber Zeichnung	—	—	—	15
97. <b>Pavonium</b> ( <i>Rollis</i> ). Grosse Dolden, lila, dunkelgelb gefleckt	—	10	—	6
91. <b>Paxtonii</b> ( <i>Standish</i> ). Lebhaft rosa, chocoladenfarben getigert, sehr grosse Dolde . . . . .	—	12	—	6
92. <b>Ponticum album</b> . . . . .	—	—	—	8
93. » <b>atrosanguineum</b> ( <i>Wat.</i> ) . . . . .	—	—	—	8
95. » <b>coccineum</b> ( <i>Ivery</i> ) . . . . .	—	—	—	10
96. » <b>fol. albo var.</b> . . . . .	—	10	—	6
98. » <b>perfectum</b> . . . . .	—	—	—	10
277. » <b>pietum</b> . . . . .	—	25	—	—
99. » <b>pyramidalis fl. pl.</b> . . . . .	—	12	—	6
100. » <b>roseum purpureum</b> . . . . .	—	15	—	8
101. » <b>Vervaeaneanum fl. pl.</b> Blasslila, Fahne ockergelb	—	10	—	6
102. <b>Portia</b> . Violet. Grosse Dolden . . . . .	—	—	—	10
254. <b>Président van den Hecke</b> ( <i>Verv.</i> ). Sehr frisch rosig-ponceauroth mit schwarzbrauner starker Zeichnung . . .	—	15	—	8
107. <b>Prince Camille de Rohan</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Zart rosa, in weiss übergehend, und mit schöner, brauner Zeichnung . .	—	12	—	8
105. <b>Princesse Charlotte</b> ( <i>Byls</i> ). Rein weiss . . . . .	—	12	—	6
310. <b>Princesse Marie</b> ( <i>Versch.</i> ). Blasslila in weiss übergehend, mit starker, schwärzlicher Zeichnung . . . . .	—	20	—	10
108. <b>Pumilum album</b> . . . . .	—	20	—	10
109. <b>Queen Pomare</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) . . . . .	—	15	—	8
322. <b>Queen Victoria</b> ( <i>Prince</i> ). Hellscharlach mit purpur Schattirung, grosse Dolden . . . . .	—	—	1	15
110. <b>Reine des Belges</b> ( <i>Byls</i> ). Zart rosa . . . . .	—	12	—	6
112. <b>Rollisonii</b> . . . . .	—	15	—	—
114. <b>Rose chérie</b> ( <i>Byls</i> ). Zart lichtrosa mit braunen Flecken .	—	15	—	8
115. <b>Rose of Bagshot</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	—	—	—	10
116. <b>Roseum maculatum</b> . Rosa mit dunkler Zeichnung . . .	—	—	—	10
119. <b>Sabina</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) . . . . .	—	12	—	6
330. <b>Salmono roseum</b> . Die rosa lachsfarbigten Blumen haben eine dunkelbraune Zeichnung u. sind breit weiss umrandet. Neu!	—	—	2	—
120. <b>Sappho</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ). Zart carminrosa, gefranst, Fahne weiss und ockergelb . . . . .	—	12	—	6
124. <b>Schiller</b> ( <i>B. Richter</i> ). Leucht. rosa, grosse, pyramid. Dolde	—	—	—	10
121. <b>Sieboldii</b> . . . . .	—	20	—	6
316. <b>Sir Robert Peel</b> ( <i>Waterer</i> ). Dunkelcarmoisinrosa mit scharfer schwarzer Zeichnung . . . . .	—	—	1	—
122. <b>Sophie</b> ( <i>Byls</i> ). Hellroth, grosse kugelförmige Bouquets .	—	20	—	10
315. <b>Sidney Herbert</b> ( <i>Waterer</i> ). Hellcarmin mit schwarzer Zeichnung; schöner Bau der Blume . . . . .	2	—	1	—

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
255. <b>Souvenir de Jean Byls</b> ( <i>J. Versch.</i> ). Blumen u. Dolde gross, leuchtend hellcarmoisin, zart rosa nüancirt, bläulich im Centrum und goldgelb getigert . . . . .	—	25	—	15
238. <b>Stamfordianum</b> ( <i>Rollis</i> ). Dunkelcarmin mit lila Reflexen, Fahne gross und fast ganz schwarz . . . . .	—	—	—	15
318. <b>Surprise</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Helllila mit sehr grosser, ganz schwarzer Zeichnung . . . . .	2	—	1	—
127. <b>Suzanne</b> ( <i>Byls</i> ). Rosa, lebhaft kirschroth umsäumt . . . . .	—	—	—	10
130. <b>The Gem</b> ( <i>Standish</i> ). Schön rosa, chamois gefleckt . . . . .	—	12	—	8
314. <b>The Warrior</b> ( <i>J. Wat.</i> ). Carmoisinrosa, schöne gr. Bouquets . . . . .	2	—	1	—
264. <b>Theodor Körner</b> ( <i>Walther</i> ). Purpurviolet mit carminrother Fahne, dichte Dolde; sehr früh blühend . . . . .	—	12	—	8
266. <b>Thuringia</b> ( <i>Walther</i> ). Hellviolet, matter auslaufend, lebhaft roth gezeichnet . . . . .	—	—	—	15
123. <b>Titian</b> ( <i>Waterer G.</i> ). Brillant rosa . . . . .	—	15	—	—
296. <b>Titania</b> . . . . .	—	20	—	10
129. <b>Triumphaus</b> ( <i>Byls</i> ). Dunkelkirschroth . . . . .	—	12	—	8
312. <b>Uniguttatum</b> ( <i>Versch.</i> ) . . . . .	—	25	—	15
272. <b>Verschaffeltii</b> ( <i>A. V.</i> ). Weiss, lila verwaschen, mit starker, dunkelpurpurrother Zeichnung . . . . .	—	15	—	8
275. <b>Victoria Regina</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) . . . . .	—	12	—	—
133. <b>Victorine</b> ( <i>Byls</i> ). Lebhaft dunkelrosa . . . . .	—	12	—	8
237. <b>William Downing</b> ( <i>Water &amp; Godf.</i> ). Dunkelamaranth mit schwärzlicher Zeichnung . . . . .	—	15	—	—
134. <b>Zuleika</b> ( <i>Engl. Hybr.</i> ) . . . . .	—	12	—	6

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 5 Thaler

25 „ „ 10 „

50 „ „ 20 „

100 „ „ 40 „

und 100 Stück in 30—40 Sorten für 30 Thaler.

## Blattpflanzen für's freie Land,

Plantes pour la décoration des pelouses etc. etc.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber eingepflanzt werden und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Nichtkenner, die ein Sortiment zu haben wünschen, bitten wir, die Auswahl uns zu überlassen.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. — Cultivées en pots.

### I. Canna.

Wohl wenig Pflanzengattungen dürften in so kurzer Zeit eine gleiche Vervollkommenung erhalten haben, als die Canna, und es giebt auch keine tropische Pflanze, welche bei so geringer Pflege, als sie die Canna bedarf, im Freien zu gleicher Vollkommenheit gelangte. Der echt tropische Typus hat derselben schon lange Zeit viele Freunde erworben; seitdem aber durch Hybridisiren sich die Färbung der Blätter aus grün in das dunkelste braunroth und alle Farbenabstufungen, welche zwischen diesen beiden Färbungen liegen, verwandelt hat, und diese Farben durch metallischen Reflex noch besonders hervortreten, ist die Canna in grossen und kleinen Gärten unentbehrlich geworden. Sie kann ebensowohl als Einzelpflanze, wo ihre ornamentalen Formen scharf hervortreten, oder als Gruppenpflanzen zu sechs und mehr vereinigt, wo sie durch ihre Färbung der Blätter dem Auge wohl-

gefällige Gruppen bildet, oder mit anderen Blattpflanzen gemischt, wie *Ricinus*, *Wigandien*, *Zea*, *Solanum* etc. zu grösseren imposanten Gruppen vereinigt, verwendet werden. Hauptbedingung bei ihrer Cultur ist nur reichlich Wasser, sobald sie festgewurzelt ist, welches geschehen, sobald sich aus der Erde junge Triebe zeigen.

Das Auspflanzen geschieht Ende Mai, sobald keine Fröste mehr zu befürchten sind. Im Herbst, wenn sie durch den ersten Frost gelitten, nehme man dieselben heraus, ohne die Erde von den Ballen abzumachen, und bringe sie, am besten in einem trockenen Keller, in Sand zur Aufbewahrung während des Winters.

In nachstehendem Sortimente offeriren wir die Elite der bis jetzt gezüchteten Sorten, darunter die neuesten vom vorigen Jahre.

Wir liefern nach unserer Wahl

6 Sorten mit grünen Blättern 1 Thlr. 15 Gr.

12	"	"	"	"	4	"	—	"
6	"	"	dunklen	"	1	"	15	"
12	"	"	"	"	4	"	—	"
24	"	"	gemischt	"	9	"	—	"

1. **Bihorelli** (*Chretien*). Blätter dunkelgrün, dunkelroth getigert und verwaschen. Blumen sehr gross und leuchtend roth. Diese durch Blatt und Blume höchst ornamentale Varietät erreicht eine Höhe von ca. 6 Fuss. **Neu!** . . . . . 1 —
2. **Bonneti major**. Kräftig wachsende Sorte mit blaugrünen, kastanienbraun verwaschenen Blättern. Blumen sehr gross, lebhaft roth, reichblühend. **Neu!** . . . . . — 25
3. **Bonneti semperflorens**. Die grossen lancettförmigen Blätter sind mit braunrothen Linien durchzogen und gesäumt. Blumen sehr gross, weinroth und ausserordentlich reichblühend. **Neu!** . . . . . — 25
4. **Caledoniensis peltata**. Robuste, kräftig wachsende Sorte. Blätter sehr breit, weisslich grün mit weissem Saum und Mittelrippe. Blumen lebhaft orange . . . . . — 25
5. **Deputé Henon**. Die Blätter dieser Varietät sind oval zugespitzt, hellgrün mit blaugrünem metallischen Schein. Die Blumen, welche sehr reichlich erscheinen, sind zeisiggelb, die unteren Blumenblätter kressenroth. **Neu!** . . . . . 1 20
6. **Discolor**. Bekannte gute Sorte . . . . . — 6  
12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.
7. **Discolor floribunda**. Aehnlich der vorhergehenden, jedoch dunkler und leicht blühend. . . . . — 12
8. **Expansa**. Blätter enorm breit und verhältnissmässig kurz, weisslich grün mit weissem Saum. Diese robuste Sorte hat viel Aehnlichkeit mit einer Musa. . . . . — 20
9. **Gaboniensis**. Blätter lang und schmal, elegant überhängend, von einer schönen blaugrünen Färbung. Die sehr grossen Blumen sind schön violet-rosa. Eine ganz eigenthümliche Färbung. **Neu!** . . . 1 10
10. **Grandis**. Die riesigste aller Varietäten. Sie erreicht eine Höhe von 8 Fuss. Die sehr grossen, elegant überhängenden Blätter sind lebhaft grün mit weissem Saum. Blumen feuerroth, gelb geflammt . . — 15
11. **Gouyaquilla purpurea**. Blätter sehr breit, dunkelgrün mit breitem Rand und stark hervortretenden braunen Blattrippen mit bläulich metallischem Glanz . . . . . — 25
12. **Heliconiaefolia**. Sehr grosse lange, hellgrüne Blätter mit weissem Saum. Reichlich blühende Varietät. . . . . — 15
13. **Hostei**. Blätter lancettförmig, schön braun purpur von metallischem Glanz. Stengel braun. Die sehr grossen Blumen sind hellroth. Sehr reichblühend. **Neu!** . . . . . 1 —



14. **Houlletii.** Blätter sehr gross, dunkelgrün, mit schwärzlichen Mittelstreifen u. starkem bläulich metallischem Glanze. Blumen sehr gross, lebhaft orange . . . . . — 20
15. **Indica fol. var.** Sehr distincte Varietät. Die ziemlich grossen Blätter haben eine breite, gelblichweisse Panachirung in bandartigen Querstreifen. Verlangt im Freien einen halbschattigen Standort . . . . . 1 15
17. **Krelagei discolor.** Blätter sehr gross, rothbraun mit maigrün gestreift. Auffallende Varietät mit blendend orangerothern Blumen . . — 15
18. **Lavallei.** Hochwachsende, kräftige Varietät. Blätter dunkelgrün, weisslich bereift, mit braunem Rande u. Stengeln . . . . . — 12
19. **Lemoinei.** Blätter sehr gross, lederartig, von schöner grüner Farbe, silbergrau bereift. Blütenrispen sehr gross u. weithin leuchtend, von lebhaft orangerother, reich colorirter Färbung. **Neu!** . . . . . 1 10
20. **Maréchal Vaillant.** Robuste u. hohe Varietät v. majestätischer Haltung. Die Blätter sind dunkelgrün, braunpurpur gestreift mit schönem metallischen Glanz. Die sehr grossen, reichlich erscheinenden Blumen sind von orangerother Farbe. Die Blütenrispen erheben sich gut über das Laub. **Neu!** . . . . . 2 —
21. **Metallica.** Blätter mittelgross, braunpurpur mit starkem metallischen Glanz, ausgezeichnet schöne Varietät . . . . . — 15
22. **Metallicoides.** Blätter sehr gross, blaugrün mit reicher kupferrother Zeichnung u. starkem metallischen Glanze. Stengel violet. Blumen gross, prächtig hellroth. **Neu!** . . . . . 1 15
23. **Musaefolia perfecta.** Riesige Varietät. Blätter enorm breit, sehr fest, fast pergamentartig, von schöner lebhaft grüner Färbung. Blumen hellgelb. Diese Varietät gleicht vollständig einer Musa u. ist besonders als Einzelpflanze von grossem Effect. **Neu!** . . . . . 2 —
24. **Nigricans.** Eine der dunkelsten Varietäten. Die Blätter haben eine schwärzlich purpurbraune Farbe mit starkem metallischen Glanz . . — 10  
12 Stück 3 Thlr. 15 Gr.  
24 „ 6 „ 10 „
25. **Peruviana robusta.** Ausserordentliche, kräftig wachsende Varietät mit sehr breiten, dunkelgrünen, weiss bereiften u. weisslich umsäumten Blättern. Eine der decorativsten Arten . . . . . — 20
26. **Picturata fastuosa.** Von sehr hohem Wuchse. Die Blätter sind schmal zugespitzt, von einer bläulichen Färbung. Ausserordentlich reichblühend. Blumen orangegelb, mit reicher blutrother Zeichnung — 15
27. **Purpurea hybrida.** Blätter gross, dunkelbraunroth mit wenig hervortretendem Grün. Leichtblühend . . . . . — 10  
6 Stück 1 Thlr. 20 Gr.  
12 „ 3 „ — „
28. **Rendatleri.** Blätter gross, metallisch blaugrün mit dunkelbraunem Saum. Schnell wachsende Varietät. Blumen gross, orangeroth . . — 8
29. **Rubricaulis.** Blätter gross, dunkelgrün mit bräunlicher Zeichnung. Stengel dunkelbraun . . . . . — 8  
6 Stück 1 Thlr. 10 Gr.
30. **Tinei.** Sehr hochwachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern . — 8
31. **Van Houttei.** Blätter sehr gross, dunkelgrün mit breitem, braunen Saum u. dunkelbraunen Blattrippen. Blumen sehr gross, scharlachroth. Sehr reichblühend . . . . . — 8  
6 Stück 1 Thlr. 10 Gr.  
12 „ 2 „ 15 „
32. **Violacea superba.** Blätter schmal, sehr lang, braunroth, reich mit violeten Tinten bedeckt. Blumen gross, violetteroth. Varietät von grossem Effect. **Neu!** . . . . . 2 —

Thlr. Gr.

Thlr. Gr.

<b>Achyranthes</b> Verschaffelti . . . . .	5
„ aureo-reticulata . . . . .	6
Effectvoll durch ihre rothen und gelbgeaderten Blätter. Besonders als Einfassung höherer Gruppen.	
<b>Althernanthera</b> amoena . . . . .	6
12 Stück 2 Thlr.	
„ spathulata . . . . .	3
12 Stück 1 Thlr.	
„ versicolor . . . . .	3
12 Stück 1 Thlr.	
<b>Amaranthus</b> tricolor . . . . .	3
12 Stück 1 Thlr.	

Diese vier Arten erreichen nur eine Höhe von 5—6 Zoll und eignen sich deshalb mit ihren feurigen und rosa Blättern ganz besonders zu Figuren u. Arabesken.

<b>Andropogon</b> formosum . . . . .	10
<b>Aralia</b> papyrifera . . . . .	10
„ Sieboldii . . . . .	1
„ „ fol. albo margin. 3 à 5	—
<b>Argyranthemum</b> frutescens . . . . .	6
<b>Arundo</b> . <i>Donax</i> var. <i>versicolor</i> . . . . .	15
12 Stück 4 1/2 Thlr.	
„ mauritanica <i>versicolor</i> . . . . .	20
6 Stück 3 Thlr.	

<b>Bambusa</b> Fortunei fol. vittatis . . . . .	5
12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.	

Feine panachirte Pflanze, eignet sich gut zu Einfassungen.

<b>Bambusa</b> verticillata. <i>W.</i> . . . . .	1
--	---

<b>Boehmeria</b> argentea . . . . .	12
Mit sehr grossen, silbergrau marmorierten Blättern.	

<b>Calla</b> aethiopica . . . . .	6
-----------------------------------	---

<b>Centaurea</b> candidissima . . . . .	12
---	----

Empfehlenswerth, ihrer silberweissen Blätter wegen, als Einzelpflanze.

„ <i>gymnocarpa</i> . . . . .	10
-------------------------------	----

<b>Cineraria</b> acerifolia . . . . .	6
---------------------------------------	---

„ <i>maritima</i> . . . . .	5
-----------------------------	---

12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.	
-------------------------	--

Mit silbergrauer Belaubung; eignet sich sehr gut als Einfassungspflanze.

<b>Colocasias</b> antiquorum fol. petiol.	
---	--

violaceis . . . . .	1
---------------------	---

„ <i>euchlora</i> . . . . .	10
-----------------------------	----

„ <i>macrorhizon</i> fol. var. 15 à 1	—
---------------------------------------	---

Erreichen bei etwas geschütztem Standort grossartige Dimensionen.

<b>Cosmophyllum</b> calalifoelium . . . . .	8
---	---

Die sehr grossen Blätter besitzen einen angenehmen Obstgeruch.

<b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	8
--	---

„ „ fol. var. . . . .	20
-----------------------	----

„ <i>Papyrus</i> . . . . .	1
----------------------------	---

<b>Datura</b> Knightii fl. pl. . . . .	15
--	----

<b>Dracaena</b> australis . . . . .	15
-------------------------------------	----

„ <i>indivisa</i> . . . . .	2 à 6
-----------------------------	-------

Als Einzelpflanze sehr effectvoll.

<b>Entelea</b> arborescens . . . . .	6
--------------------------------------	---

<b>Gnaphalium</b> lanatum . . . . .	3
-------------------------------------	---

12 Stück 20 Gr.

Prächtige Einfassungspflanze.

<b>Gunnera</b> scabra . . . . .	8
---------------------------------	---

<b>Gynerium</b> argenteum . . . . .	6
-------------------------------------	---

„ „ <i>verum</i> . . . . .	15
----------------------------	----

„ „ à fleurs soyeuses . . . . .	1 10
---------------------------------	------

„ „ var. <i>giganteum</i> . . . . .	1 10
-------------------------------------	------

<b>Hebeclinium</b> macrophyllum . . . . .	12
---	----

<b>Hibiscus</b> ferox . . . . .	25
---------------------------------	----

<b>Humea</b> elegans . . . . .	5
--------------------------------	---

Composite mit prachtvollen rosenrothen, grasähnlichen Blütenknospen, welche eine Höhe und einen Durchmesser von 3 Fuss erreichen. Herrliche Einzelpflanze.

<b>Hydrangea</b> quercifolia . . . . .	8
--	---

<b>Macleya</b> Jokuhami . . . . .	15
-----------------------------------	----

Von überraschender Schönheit, besonders als Einzelpflanze im Rasen. Erreicht ihre Vollkommenheit erst vom zweiten Jahre an.

<b>Melanthus</b> major . . . . .	10
----------------------------------	----

<b>Montanoa</b> mollissima . . . . .	6
--------------------------------------	---

<b>Muschia</b> aurea . . . . .	10
--------------------------------	----

„ <i>Wellastoni</i> . . . . .	10
-------------------------------	----

Zwei herrliche Campanulaceen.

<b>Nicotiana</b> wigandioides . . . . .	8
---	---

<b>Panicum</b> latifolium . . . . .	10
-------------------------------------	----

„ <i>plicatum</i> . . . . .	5
-----------------------------	---

<b>Selinum</b> decip. 5jähr., sehr stark 1	—
--	---

„ „ 2jähr. . . . .	10
--------------------	----

Prächtige Solitärpflanze im Rasen.

<b>Senecio</b> Farfugium . . . . .	5
------------------------------------	---

„ <i>Ghiesbrechtii</i> . . . . .	8
----------------------------------	---

<b>Solanum</b> atropurpureum . . . . .	8
--	---

„ <i>crinitum</i> . . . . .	10
-----------------------------	----

„ <i>discolor</i> . . . . .	10
-----------------------------	----

„ <i>igneum</i> . . . . .	8
---------------------------	---

„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	12
---------------------------------	----

„ <i>marginatum</i> . . . . .	10
-------------------------------	----

„ <i>robustum</i> . . . . .	12
-----------------------------	----

„ <i>St. Pedro</i> . . . . .	10
------------------------------	----

„ <i>Warszewiczii</i> . . . . .	12
---------------------------------	----

Wahre Schmuckpflanzen für den Rasen.

<b>Sonchus</b> gummiferus . . . . .	10
-------------------------------------	----

„ <i>laciniatus</i> . . . . .	8
-------------------------------	---

<b>Sorghum</b> halepense . . . . .	10
------------------------------------	----

<b>Urtica</b> bipinnatifida . . . . .	10
---------------------------------------	----

„ <i>pinnatifida</i> . . . . .	10
--------------------------------	----

Erreichen beide riesige Dimensionen.

<b>Urtica</b> macrophylla . . . . .	6
-------------------------------------	---

<b>Verbesina</b> Sartorii . . . . .	6
-------------------------------------	---

<b>Wigandia</b> caracasana . . . . .	10
--------------------------------------	----

Ist als Einzelpflanze eine der grössten Zierden jedes Gartens.

<b>Xanthosoma</b> violacea . . . . .	10
--------------------------------------	----

<b>Zea</b> japonica fol. var. ( <i>Benary</i> ) . . . . .	5
---	---

„ <i>Caragua</i> fol. var. ( <i>Krüger</i> ) . . . . .	5
--	---

Buntblättriger Mais. Zwei Pflanzen von überraschendem Effect.

# ROSEN.

## Auswahl von Prachtrofen ersten Ranges,

### grösstentheils neuere Sorten,

in prächtigen, geraden, mehrjährigen Hochstämmen von durchschnittlich 5 Fuss Höhe, mit schönen Kronen.

Diese Collection von hochstämmigen Rosen enthält nur ausgezeichnete Sorten, welche sich in jeder Beziehung als vollkommen bewährt haben und eine bleibende Zierde jeder Gartenanlage sind. Es sind die sammtartig dunkelfarbigen und die leuchtend hellrothen Rosensorten vorzugsweise darin vertreten.

### Remontant-Rosen.

Thlr. Gr.

- |   |      |
|---|------|
| 19. <b>Alphonse Belin.</b> Leuchtend kirschroth mit hellrosa Rückseiten der Petalen; gross, voll und schön gebaut . . . . .   | — 20 |
| 985. <b>Amiral Lapeyrouse.</b> Sammtig feuerroth mit dunkelviolet und purpur schattirt, sehr gross, voll und schön gebaut . . . . .   | — 20 |
| 713. <b>Anna Alexieff.</b> Gross, voll, schalenförmig, rosa und lachsfarben nüancirt . . . . .  | — 15 |
| 64. <b>André Desport.</b> Dunkelrosa; ausser der Farbe in Allem dem Lord Raglan, von dem sie abstammt, vollkommen gleichend . . .   | — 15 |
| 271. <b>Auguste Mie.</b> Glänzend hellrosa, sehr gross und gewölbt . . .  | — 15 |
| 918. <b>Beauté française.</b> Dunkelblutroth mit violetem Saum und breiten weissen Bändern im Centrum; Petalen braungespitzt und mit dunkelrothen Rückseiten, gross, voll, schön gebaut . . . . . | — 25 |
| 972. <b>Bernard Palissy.</b> Leuchtend carminroth, sehr gross, voll und von schönem becherförmigen Bau . . . . .  | — 20 |
| 706. <b>Comtesse Cécilie de Chabrillon.</b> Leuchtend rosa mit silberfarbener Rückseite der Petalen, gross, sehr voll und von vollendet schönem Bau . . . . .                                     | — 20 |
| 903. <b>Deuil du Prince Albert.</b> Sammtig schwarz carmoisin mit feurigrothem Herz, von sehr dichter Füllung und schön geschlossenem Bau, eine der dunkelsten unter den Rosomenen . . . . .      | — 25 |
| 286. <b>Duc d'Arcourt.</b> Leuchtend carminroth, gross, voll und von schönem rundem Bau, sehr reichblühend und effectvoll . . . . .   | — 20 |
| 937. <b>Duc de Bassano.</b> Sammtig dunkelcarmoisin, von schönem schalenförmigem Bau . . . . .  | — 20 |
| 795. <b>Duc de Cazes.</b> Feurig dunkelscharlach mit purpurvioletem, ins Blaue schillerndem Sammt, voll und von vollendet schön gewölbtem Bau . . . . .   | — 20 |
| 861. <b>Duc de Rohan.</b> Feurig roth mit zinnober schattirt, sehr gross, voll und schön gebaut . . . . .   | — 20 |
| 711. <b>Empereur de Maroc.</b> Dunkelschwarzbraun mit dickem Sammt und feurigem Reflex, sehr voll und von schönem Camellienbau . .  | — 20 |
| 803. <b>Enfant de France.</b> Weissfleischfarben mit dunklerem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut . . . . .   | — 15 |
| 700. <b>Eugénie Appert.</b> Sammtscharlachcarmoisin, sehr gross, voll und schön gebaut, eine Prachtrose von ungewöhnlicher Schönheit . . .  | — 20 |
| 815. <b>François Arago.</b> Sammtamaranthroth, ein würdiges Seitenstück zu Lord Raglan, nur dunkler, sehr schön . . . . .   | — 20 |
| 612. <b>Froissard.</b> Lebhaft carminrosa, gross und voll, eine sehr reiche fortwährend blühende Prachtrose . . . . .   | — 15 |



977. **Géorge Prince.** Leuchtend roth mit dunkelrosa schattirt, mit silberfarbenem Reflex der äusseren Petalen, von schönem vollem Centifolien-Bau . . . . . — 25
29. **Géorge Simon.** Leuchtend feurig roth, gross und voll . . . . . — 15
74. **Gloire de Santenay.** Leuchtend dunkelpurpur, gross, voll und gut gebaut, sehr effectvoll . . . . . — 20
975. **H. Laurentius.** Carmoisinroth mit schwärzlichem Sammt, gross, gefüllt und von schönem schalenförmigem Bau . . . . . — 20
915. **Jean Goujon.** Hellroth, sehr gross, voll und von eigenthümlich schönem Bau, mit abgerundeten Petalen, grosse Prachtrose . . . . . — 20
983. **Jean Touvais.** Purpurroth mit carmoisin schattirt, von schön geschlossenem rundem Bau, eine der grössten Effectrosen . . . . . — 20
85. **John Hopper.** Feurigrosa mit carmoisinrothem Herz, sehr gross, voll und von schönem Centifolien-Bau . . . . . — 20
339. **Joseph Durant.** Dunkelroth mit Schieferfarbe, gefüllt und schön gebaut . . . . . — 20
163. **Jules Margottin.** Lebhaft kirschroth, sehr schön . . . . . — 15
979. **La Duchesse de Morny.** Leuchtend dunkelrosa mit silberweiss glänzenden Rückseiten der Petalen, sehr gross, voll und von schönem schalenförmigem Kugelbau, eine der „La Reine“ an Grösse gleichkommende Prachtrose . . . . . — 25
646. **La Phocéenne.** Glänzend carminroth, ins Sammtartige übergehend, gross und voll, in Büscheln blühend und von grossem Effect . . . . . — 20
943. **L'Éclatante.** Ponceauroth, schattirt mit purpurviolett. schöne Färbung, gefüllt und gut gebaut . . . . . — 20
135. **L'enfant du Mont Carmel.** Dunkelrosa mit amaranth . . . . . — 15
594. **Le Rhône.** Glänzend zinnoberroth, eine der leuchtendsten Färbungen, gross und gut gebaut . . . . . — 20
237. **Lord Raglan.** Purpurviolett nach aussen, feurig im Centrum, von „Géant des Batailles“ abstammend . . . . . — 15
122. **Louis van Houtte.** Leuchtend carminrosa, schattirt mit feuerroth, sehr gross und von schönem rundem Bau . . . . . — 20
780. **Louis XIV.** Feurig sammtig scharlachcarmoisin, sehr voll und von schön geschlossenem rundem Bau, eine der glühendsten Färbungen, schwach wachsend . . . . . — 20
874. **Madame Boutin.** Glänzend kirschroth, sehr gross, voll und schön gebaut, eine der besten Rosen . . . . . — 20
917. **Madame Briançon.** Leuchtend carminroth mit ponceaubraun schattirt, gross und schön gebaut . . . . . — 20
357. **Madame Caillot.** Leuchtend kirschrosa, gross und gut gebaut, fast dornenlos . . . . . — 20
650. **Madame Charles Crapelet.** Kirschroth, glänzend silberfarben schattirt, eine vollendet schön gebaute, grosse, reichblühende Prachtrose . . . . . — 25
57. **Madame Dereulx-Douville.** Seidenartig rosa, von schönem Bau . . . . . — 15
159. **Madame Hector Jacquin.** Leuchtend rosenroth mit lila, sehr gross . . . . . — 15
878. **Madame Julie Daran.** Glänzend zinnoberroth, sehr gross, voll und rund gebaut . . . . . — 20
531. **Madame Malesherbes.** Sehr frisch, leuchtend rosa, gefüllt und rund gebaut, in Büscheln blühend . . . . . — 20
422. **Madame William Paul.** Fleischfarbig rosa, sehr gross, voll und schön gebaut . . . . . — 20
738. **Madame Trotter.** Leuchtend roth, voll und gross . . . . . — 15
974. **Madame Victor Verdier.** Leuchtend rosa, schattirt mit hellcarmin, sehr gross, voll und schön gebaut, eine wahre Prachtrose . . . . . — 20

52. **Mademoiselle Adèle Launay.** Sehr zart rosa, im Verblühen weisslich, voll und gut gebaut . . . . . — 25
143. **Maréchal Bazaine.** Dunkelrosa, carminroth umrandet, und von schönem schalenförmigem Bau . . . . . — 20
971. **Maréchal Forey.** (*Marg.*) Sammtcarmoisinroth mit violettem Reflex, sehr gross und dicht gefüllt, rosettenförmiges Centrum, stark duftend . . . . . — 25
7. **Maréchal Souchet.** Schön carmoisinrosa, sehr gross, voll und schön gebaut . . . . . — 20
880. **Maréchal Vaillant.** Leuchtend purpur, gross, von dichter Füllung und sehr schönem Bau, werthvoll in jedem Betracht . . . . . — 20
447. **Marie Baumann.** Leuchtend roth, in Allem dem „General Jaqueminoth“ ähnlich, nur noch heller und leuchtender, voller und schöner gebaut, eine wahre Prachtrose . . . . . — 20
131. **Michel Ange** Sehr leuchtend purpurroth, sehr gross, voll und flach gebaut . . . . . — 20
860. **Monte Christo.** Dunkelscharlachcarmoisin mit dickem, schwarzbraunem Sammt und sehr feurigem Reflex im Innern, dicht gefüllt und schön gebaut . . . . . — 25
80. **Paul de la Mailleray.** Schön kirschpurpurroth, sehr gross, voll und gut gebaut, mit breiten Petalen . . . . . — 20
40. **Pie IX.** Gross, gefüllt, carmoisin . . . . . — 15
102. **Praire de Terre-Noire.** Purpur mit hellviolet schattirt, gross und schön gebaut . . . . . — 20
313. **Prince Camille de Rohan.** Sammtig schwarzcarmoisin mit blutroth, sehr gross und voll, eine Prachtrose vom tiefsten Colorit . . . . . — 20
591. **Prince noir.** Schwarz purpur, schön gebaut . . . . . — 15
274. **Queen Victoria.** Weiss überhaucht, zart fleischroth im Herz . . . . . — 15
799. **Reine des Violettes.** Bläulich purpurviolet mit hellrothem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und von sehr schönem flachem Bau, die prachtvollste Remontante in dieser Färbung, fast dornenlos . . . . . — 25
899. **Reynolds Hole.** Glänzend rosa, gross, voll und eigenthümlich schön geformt . . . . . — 20
885. **Richard Smith.** Dunkel purpurroth mit violet schattirt, in Dol-den blühend, voll und schön gebaut . . . . . — 20
539. **Rose de Puebla.** Leuchtend roth, mit schwarzem Sammt, Centrum weiss gefleckt, gross, voll und becherförmig gebaut, eine auffällige Prachtrose . . . . . — 25
771. **Senateur Vaisse.** Sammtig dunkelscharlach, gross und eigenthümlich schön gebaut . . . . . — 20
902. **Soeur des Anges.** Hell fleischfarben, in weiss übergehend, gross und von dichter Füllung, eine überaus zarte, werthvolle neue Remontante . . . . . — 20
945. **Souvenir de Charles Monteault.** Feurig scharlach, becherförmig, ein prachtvolltes Seitenstück zu der Géant des Batailles, die sie aber bei weitem an brillantem Colorit übertrifft . . . . . — 25
500. **Souvenir du maréchal Serrurier.** Leuchtendroth, umrandet mit weisslichem Schein; gross, voll u. schön gebaut . . . . . — 20
1011. **Souvenir d'une mère** . . . . . — 15
798. **Triomphe d'Amiens.** Leuchtend carmin, dunkelpurpurbraun gestreift u. panachirt; nicht immer constant, aber auch ohne Panachirung eine werthvolle Prunkrose . . . . . — 20
410. **Triomphe de l'Exposition de Paris.** Glänzend hochroth, gross u. voll, schön gebaut . . . . . — 15
904. **Vainqueur de Goliath.** Leuchtend roth mit dunkler Schattirung u. feurigem Reflex; sehr gross, dicht gefüllt u. schön gebaut . . . . . — 20

761. **Victor Verdier.** Leuchtend rosa, schattirt mit hellcarmin, sehr gross, voll u. schön gebaut; eine wahre Prachtrose . . . . . — 20
228. **Voley.** Rosa mit violet schattirt, gross, voll u. von schönem Dachziegelbau . . . . . — 20

### Bourbon-Rosen.

2. **Catharine Guillot.** Purpurrosa u. von vollendet schönem Bau — 20
152. **De Candolle.** Gross, voll, zart rosa, Centrum dunkler . . . . . — 15
3. **Dupetit-Thouars.** Gross, voll, brillant carmoisin . . . . . — 15
83. **Duc de Beaujolais.** Sehr leuchtend purpurroth, in Dolden blühend — 15
924. **Emotion.** Glänzend hellrosa, sehr voll u. von vollendet schönem Bau; eine der feinsten Rosen . . . . . — 20
686. **Giulietta.** In Dolden; weiss mit fleischfarbenem Anhauch, von schönem Effect, gross u. voll . . . . . — 15
400. **Hermosa.** Zartrosa, mittelgross, dicht gefüllt u. sehr schön gebaut, sehr reichblühend . . . . . — 15
354. **Héroïne de Vacluse.** Feurig rosa mit carmin schattirt, gross, voll u. von vollendet schönem runden Bau; in Büscheln u. sehr reichblühend . . . . . — 20
963. **Madame Doré.** Hellrosa, schattirt mit weiss, mittelgross, voll, schön gebaut u. reichblühend . . . . . — 20
10. **Mademoiselle Joséphine Guyot.** Leuchtend scharlachroth, dunkel umrandet u. mit feurigem Reflex im Centrum; gross, dicht gefüllt u. von vollendet schönem Kugelbau . . . . . — 25
81. **Paxton.** Lebhaft rosa, feurig nüancirt . . . . . — 15
284. **Prémices des Charpennes.** Rosa u. weiss berandet . . . . . — 15
20. **Prince de Chimay.** Amaranthroth mit dunkelviolet, voll, von kugelförmig sehr schönem Bau; eine Rose von bewundernswürdigem schönen Colorit . . . . . — 20
973. **Réverend H. Dombrain.** Sehr glänzend carminroth, gross, voll u. von schönem becherförmigen Bau . . . . . — 20
370. **Rochambeau.** Feurig rosa, in Dolden blühend, voll u. gut gebaut — 15
84. **Souvenir de la Malmaison.** Gross, zart fleischfarben . . . . . — 15
705. **Victor Emanuel.** Dunkelpurpurviolet mit feurigem Reflex; sehr gross, voll u. rund gebaut . . . . . — 20

### Thee-Rosen.

378. **Auguste Vacher (Lacharme).** Mittelgross, voll, gelb, goldig kupferorange schattirt . . . . . — 15
481. **Le Pactole.** Mittelgross, fleischfarben in dunkelgelb übergehend — 15

### Noisette-Rosen.

261. **Aimé Vibert.** Sehr gefüllt, rein weiss . . . . . — 15
341. **Gerbe des Roses.** Fleischfarben lila, kleine in grossen, prächtigen, aus 30—50 Blumen bestehenden Dolden blühend, einzig in ihrer Art — 15
338. **Gloire de Dijon.** Lachsgelb; bekannte schöne Rose . . . . . — 15
641. **Isabelle Gray.** Tief goldgelb; sehr voll u. schön gebaut . . . — 20
253. **Jean Hardy.** Dunkel goldgelb, dicht gefüllt u. gut gebaut . . . — 15
859. **Triomphe de Rennes.** Canariengelb, voll u. reichblühend . . . — 15

### Centifolia.

16. **Dométille Bécar.** Gross u. voll, leuchtend rosa, weiss gebändert, wohl die schönste bunte Rose . . . . . — 15
- Von vorstehenden Sorten liefern wir:

12	Sorten nach unserer Wahl für Thlr.	5.	—.
25	" " " " " "	10.	—.
100	" " " " " "	36.	—.

**Trauerrosen** auf 8—10 Fuss hohen gesunden Stämmen, mit starken Kronen, à 1 bis 1 Thlr. 10 Gr.



## Wurzelechte und niedrig veredelte Rosen.

- |   |   |
|---|---|
| <p>993. Achille Gonod.<br/>         347. Adolphi.<br/>         865. Alexander Dumas.<br/>         1050. Alfred Colomb, 10 Gr.<br/>         449. Aurora.<br/>         1033. Aurore boreale, 10 Gr.<br/>         907. Baronne Adolph de Rothschild.<br/>         11. Baron Gonella.<br/>         368. Baronne Heekeren de Wassenauer.<br/>         157. Belle de Baltimore.<br/>         951. Belle de Massifs.<br/>         972. Bernard Palissy.<br/>         690. Bourbon Sämling.<br/>         691. Bourbon Sämling von Cherpin.<br/>         986. Centifolia rosa.<br/>         22. Charles Boissier.<br/>         639. Charles Desprez.<br/>         1020. Charles Margottin, 8 Gr.<br/>         330. Colonel Foissy.<br/>         66. Comte d'Egmont.<br/>         24. Comte de Derby.<br/>         901. Comtesse de Brossard.<br/>         903. Deuil de Prince Albert.<br/>         88. Dimetrius.<br/>         1012. Docteur Andry, 8 Gr.<br/>         517. Doctor Ruschpler.<br/>         861. Duc de Rohan.<br/>         355. Eudoxia.<br/>         402. Eulalia de la Falconieri.<br/>         437. Fabier.<br/>         1037. Fanny Petzold, 10 Gr.<br/>         969. Fernando.<br/>         856. François Lacharme.<br/>         44. Géant de Bataille.<br/>         45. Général Blouet.<br/>         120. Général Cavaignac.<br/>         922. Général de Mirandol.<br/>         309. Général Jacqueminot.<br/>         72. Général Dupuy.<br/>         565. Général Simpson.<br/>         807. Général Washington.<br/>         851. Gloire de Bordeaux.<br/>         1046. Gloire de Ducher, 10 Gr.<br/>         649. Gloire de Lyon.<br/>         1010. James Veitch.<br/>         915. Jean Goujon.<br/>         744. Imperatrice Elisabeth.<br/>         85. John Hopper.<br/>         641. Isabella Gray.</p> | <p>1042. Julius Caesar.<br/>         721. La Comète.<br/>         852. La Brillante.<br/>         201. La Dauphiné.<br/>         474. La Fontaine.<br/>         336. La Reine Victoria.<br/>         1034. La Tendresse.<br/>         716. L'Avenir.<br/>         989. Le Géant.<br/>         398. Le Grellet.<br/>         906. Le juif errant.<br/>         135. L'enfant de mont Carmel.<br/>         5. L'obscurité.<br/>         780. Louis XIV.<br/>         829. Louise Odier.<br/>         57. Madame Dereulx Douville.<br/>         963. Madame Doré.<br/>         900. Madame Palembourg.<br/>         249. Madame Rivers.<br/>         974. Madame Victor Verdier.<br/>         422. Madame William Paul.<br/>         879. Mlle. Dubus.<br/>         1035. Mlle. Marie Raddi, 10 Gr.<br/>         971. Maréchal Forey.<br/>         1008. Maréchal Niel, 20 Gr.<br/>         73. Marie Tripont.<br/>         881. Maurice Bernardin.<br/>         1036. Monsieur Gustave Persin, 10 Gr.<br/>         685. Ophelia.<br/>         175. Panachée d'Orleans.<br/>         978. Pavillon de Bregny.<br/>         284. Prémices des Charpennes.<br/>         912. Président Lincoln.<br/>         4. Princesse Adelaide.<br/>         799. Reine des violets.<br/>         973. Reverend H. Dombrain.<br/>         902. Soeur des Anges.<br/>         94. Solfatare.<br/>         1048. Souvenir d'Abrah. Lincoln, 10 Gr.<br/>         1052. Souvenir du Dr. Jamain, 10 Gr.<br/>         779. Triomphe d'Alençon.<br/>         798. Triomphe d'Amiens.<br/>         933. Triomphe d'Angers.<br/>         162. Triomphe en Beauté.<br/>         904. Vainqueur de Goliath.<br/>         489. Vivid.<br/>         858. Vulcain.<br/>         929. William Paul.</p> |
|---|---|

*Jede Sorte, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 6 Gr.*

*12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thaler*

25    „    „    „    „    4    „

50    „    „    „    „    8    „

Die neuesten Rosen für 1867 vide pag. 20.

## Zwergobst oder Obst-Orangerie.

In Töpfen cultivirte Bäumchen, 2—3 Fuss, stark und tragbar.

### a. Aepfel.

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Agathenapfel, gestreifter.        | Reinette, gris du Canada.     |
| Alantapfel.                       | Reinette, graue französische. |
| Borowitzky.                       | Reinette, graue Gold-         |
| Calville, blanc d'hiver.          | Reinette, grosse Kaiser-      |
| Calville, rothe Herbst.           | Reinette, königliche.         |
| Calville, Blumen-                 | Reinette Baumann.             |
| Calville, Malingre-               | Reinette, Carmeliter.         |
| Calville St. Sauveur.             | Reinette Damason.             |
| Calville rouge d'été transparent. | Reinette de Breda.            |
| Calville rouge d'hiver.           | Reinette de Montbrun.         |
| Champagner-Reinette.              | Reinette de Sargoliet.        |
| Cornwalliser Gewürzapfel.         | Reinette, grosse Casseler.    |
| Cardinal, blutrother Winter-      | Reinette, holländische Gold-  |
| Dominica.                         | Reinette, Kronen-             |
| Edler Winter-Borsdorfer.          | Reinette, marmorirte.         |
| Edler Princessin-Apfel.           | Reinette, Menoniten-          |
| Esopus Spitzlenberg.              | Reinette, Muscat-             |
| Garibaldi.                        | Reinette, Niemann's rothe.    |
| Glasapfel.                        | Reinette, Pariser Rambour-    |
| Golden noble.                     | Reinette, röthliche.          |
| Goldzeugapfel.                    | Reinette von Prag.            |
| Goldparmaine, engl. Winter-       | Reinette, weisse canadische.  |
| Gülderling, französischer.        | Reinette, Kranter-            |
| Grafensteiner, gelber.            | Reinette, weisse Wachs-       |
| Hausmütterchen.                   | Revalischer Birnen-Apfel.     |
| Jeffrey's Sämling.                | Ripstons Pepin.               |
| Kantapfel, Danziger.              | Rosmarin blanc.               |
| Kernel Achmeads.                  | Roi d'Angleterre.             |
| Kleiner Api.                      | Rosenapfel, calvillartiger.   |
| Koestlicher von Kew.              | Seidenhemdchen, weisses.      |
| Kurzstiel, königlicher.           | Scharlachrother Nonpareil.    |
| Kaiser Alexander.                 | Schöner aus Kent.             |
| Lothringer, Rambour-              | Schweizer Reinette.           |
| Luikenapfel.                      | Sommer Gewürz-Apfel.          |
| Oestreicher National-Apfel.       | Sperberapfel, früher.         |
| Old Nonpareil.                    | Stettiner, gelber.            |
| Ostogate.                         | Stettiner, rother Winter-     |
| Parmaine, Herefordshire.          | Streifling, Wormser bunter.   |
| Parmaine, rothe Winter-           | Strichapfel, weisser Sommer-  |
| Prinzen-Apfel.                    | Taffetapfel, weisser.         |
| Pfirsichapfel, amerikanischer.    | Taubenapfel, gestreifter.     |
| Posart Nalivia.                   | Taubenapfel, rother.          |
| Pomme Saint Louis.                | Tiefblüthe.                   |
| Reinette du Roi.                  | Walliser Limonen-Reinette.    |
| Reinette de New-York.             | Weisskante.                   |
| Reine des Reinettes.              | Zimmet-Reinette.              |
| Reinette, Dietzer-Mandel-         | Zucker-Apfel, polnischer.     |

**b. Birnen.**

2—3 Fuss hoch, in Töpfen.

Bergamotte, Fortunée-  
 Bergamotte, Fürstenzeller.  
 Beurré d'Amanlis.  
 Beurré d'Hardenpont.  
 Beurré gris d'Anjou  
 Beurré blanc.  
 Beurré van Geert.  
 British Queen.  
 Butterbirne, Napoleons-  
 Catinka.  
 Clapp's Favorite.  
 De Colmar.  
 Dechantsbirne, rothe.  
 Espagne.

Knight's Monarch.  
 Louise bonne d'Avanches.  
 Marie Louise.  
 Pastorenbirne.  
 Seigneur d'Espèren.  
 Sirenen Citronen-Birne.  
 Sonnen-Birne.  
 Suzette de Bavay.  
 Saggerets Bergamotte.  
 Triomphe de Jodoigne.  
 Van Marum's Schmalzbirne.  
 Wildling von Kresnitz.  
 Wildling von Motte.  
 William's Christbirne.

à Sorte 20 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

12	„	„	„	„	6	„
25	„	„	„	„	12	„

**c. Pfirsiche.**

2 Fuss hoch, in Töpfen.

Belle de Douai.

Mignonne, grosse.

Vineuse.

à Sorte 25 Gr.

**d. Johannisbeeren.**

1 — 1½ Fuss hoch, in Töpfen.

Du Caucase.  
 Englische grosse weisse.  
 Grosse rothe Crüdener.  
 Grosse rothe Holländische.  
 Gonduin.

Grosse rothe Kirsch-Johannisbeere.  
 Impérial jaune.  
 Prince Albert.  
 Rothe langtraubige.  
 Striata.

Weisse grosse Holländische.

à Sorte 10 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 18 Gr.

**e. Feine Gehölze in Töpfen.**

	Thlr.Gr.
Acer Ginala . . . . .	— 20
„ Leopoldii fol. var. Veredlungen . . . . .	— 10
„ trifidum . . . . .	1 —
Celastrus Orizia . . . . .	— 20
Deutzia crenata flore pleno . . . . .	— 6
„ „ extra purpureo plena . . . . .	— 15
„ „ gracilis fol. var. . . . .	— 6
Fagus asplenifolia . . . . .	— 15
„ sylvat. atropurp. macroph. . . . .	— 15
Kerria japonica fol. var. . . . .	— 4
Magnolia acuminata, 5jährig . . . . .	1 —
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) — 10
„ discolor, 5jährig . . . . .	(12 Stück 12 Thlr.) 1 10
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 2 Thlr.) — 10
„ glauca, 2 Fuss hoch . . . . .	1 10
„ gracilis, 5jährig . . . . .	(12 Stück 10 Thlr.) 1 —
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 2 Thlr.) — 10
„ macrophylla 5jährig . . . . .	2 —
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 5 Thlr.) — 20
„ obovata (purpurata), 5jährig . . . . .	1 —
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 2 Thlr.) — 10
„ Soulangeana, 5jährig . . . . .	1 10
„ „ 3jährig . . . . .	(12 Stück 2 Thlr.) — 10



<i>Magnolia tripetala</i> (umbrella) 5jährig	(12 Stück 5 Thlr.)	— 15
„ „ Youlan, 3jährig	(12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.)	— 6
<i>Planera acuminata</i>	(12 Stück 5 Thlr.)	— 15
„ „ Kiaki		— 10
<i>Quercus asplenifolia</i>		— 10
<i>Rhodotypus kerrioides</i>		— 15
<i>Salix laurifolia</i> fol. var.		— 6
<i>Styrax japonica</i>		1 —
<i>Tilia americana</i> pend. fol. luteo var.		— 20
„ „ asplenifolia (laciniata)		1 15
		— 15

## KNOLLEN- UND ZWIEBELGEWAECHSE.

(Plantes bulbeuses et tuberculeuses.)

### Georginen (*Dahlia variabilis*).

#### Auswahl der besten neueren und älteren Sorten

deutschen, englischen und französischen Ursprungs.

*Sämmtliche nachstehend verzeichnete Georginen werden in jungen, kräftigen, gut bewurzelten Pflanzen geliefert.*

Die Versendung der Pflanzen beginnt Mitte April.

#### a. Grossblumige (*à grandes fleurs*).

- |  |  |
|--|--|
| 90. <b>Alwine Richter</b> (S.). Zart rosa incarnat m. hellcarminvioletem Saum. Rosenform.                | 79. <b>Deutsch. Fürstenschmuck</b> (S.). Nan-kingfarbig mit carminrosa, hellweinstroth u. carmoisin gestreift u. gespritzt.      |
| 12. <b>Bianca</b> (S.). Rein weiss.  | 50. <b>Deutscher Goldfürt</b> (S.). Goldig ochergelb mit chamois Centrum, sehr blumenreich.                                      |
| 16. <b>Brennende Liebe</b> (S.). Leuchtend hell zinnober.  | 13. <b>Deutscher Goldorden</b> (S.). Gesättigt kupferscharlach a. goldbraun. Rückseite mit constanten feinen goldgelben Punkten. |
| 26. <b>Cantor Müller</b> (S.). Goldorange zinnober.  | 51. <b>Deutscher Jubilar</b> (S.). Violetcarmin u. purpur, a. dunkelcochenille Grund mit feinen goldgelben Punkten.              |
| 27. <b>Carl Noltenius</b> (S.). Goldgelb in amaranth übergehend.   | 77. <b>Deutscher Rosenstern</b> (S.). Blassrosa, nach aussen m. carmin Spitzen. Halbkugelhöhrenform.                             |
| 28. <b>Carl Schmitz</b> (S.). Orangescharlach.   | 5. <b>Deutscher Sänger</b> (S.). Amaranthcarmoisin a. schwarzbraun. Grunde, abwechselnd mit weissen Spitzen.                     |
| 89. <b>Commerzienrath Küster</b> (S.). Zart rosa pfirsichblüth mit völlig constantem weissen Centrum.    | 30. <b>Deutsches Vorbild</b> (S.). Schwarzkirchroth mit lichtvioleter Rückseite. Muschelrosenform.                               |
| 31. <b>Deutsche Ausdauer</b> (S.). Hellamaranthcarmin, nach innen dunkler, nach aussen hellvioletoarmin. | 18. <b>Emil Böttcher</b> (S.). Kupferfarbig m. rostroth. Rücks. goldgelb. Rosenform.   |
| 85. <b>Deutsche Blondine</b> (S.). Milchweiss, auf grünlich paille Grunde.                               | 22. <b>Étoile du Nord</b> (Miq.). Scharlach, weiss gebändert.  |
| 92. <b>Deutsche Jugendfülle</b> (S.). Lilarosa, nach aussen mit graurosa Rand.                           | 10. <b>Feldmarschall Radetzky</b> (Fichelle). Leucht. mennigzinnober m. weissen Spitzen.   |
| 76. <b>Deutsche Treue</b> (S.). Zart gelblich isabell mit rosa Schein. Rosenform.                        |  |
| 34. <b>Deutsche Zauberrose</b> (S.).   |  |
| 95. <b>Deutsche Zellenrose</b> (S.). Lila pfirsichblüth, Rücks. silberweiss. Zellenrosenform.            |  |
| 8. <b>Deutsche Feuerzelle</b> (S.). Purpurscharlach.   |  |
| 6. <b>Deutsche Sonne</b> (S.). Rein hellcitrongelb.  |  |

57. **Ferdinand von Schill** (S.). Dunkel-cochenillecarmoisin. Rosenform.
17. **Friedrich Schlegel** (D.). Bläulich carmoisin, mit tief eingehenden weissen Spitzen.
7. **Gambrinus** (S.). Gesättigt dunkel-cochenillecarmin auf rein cochenillescharlach Grund.
52. **Graf Klebelsberg** (S.). Grünlich erbsfarben, blassrosa überhaucht.
9. **Gruss an Osnabrück** (S.). Dunkel-scharlach.
19. **Gruss an Teterow** (S.). Lachsroth.
11. **Gruss an Zarskoë-Selo** (S.). Dkl. lila.
20. **Gruss an Zwickau** (S.). Ponceau-scharlach.
1. **Hofgärtner Kindermann** (S.). Hellgoldigchamois auf röthl. Grunde. Rosenform.
24. **King of Autumn** (Salt.). Lila, rosa umsäumt.
49. **Kohinoor** (S.). Helleitrongelb.
29. **Lass of Gowry** (Salt.). Orange m. rothen Spitzen.
32. **Leuchtende Deutsche** (S.). Orange-scharlach.
83. **Liebliche Köstritzerin** (S.). Rosa-weiss m. purpurblaugespitzt. Zellenflachform.
82. **Madame Ehret** (S.). Gesättigt hochrosa, nach aussen lichter.
93. **Madame Hegeler** (S.). Grauchamois mit pfirsichlila Schein u. goldig-olivengrünen feinen Spitzen.
43. **Mignon** (Mck.). Lilarosa m. weissen Spitzen.
86. **Oeconomierath R. Glass** (S.). Dkl. amaranthearmoisin a. schwarzbraun. Grunde. Muschelrosenform.
46. **Ophide** (Morea). Chamois m. purpur-lila Spitzen.
37. **Pastor Berger** (S.). Purpurblau.
23. **Peter Bottay** (S.). Scharlachcarmoisin, selten m. weissen Spitzen. Rosenform.
3. **Prince Alfred** (W.). Orangeroth.
35. **Prinz Friedrich Wilhelm v. Preussen** (S.). Glühend dkl. cochenillescharlach, im Verblühen m. ledergelbem Rand.
33. **Professor Dr. Bock** (S.). Carminviolet auf dunklem Grunde, nach aussen hellviolet.
38. **Schöne Deutsche** (S.). Milchweiss mit carminblau umschlossen.
14. **Schulze-Delitzsch** (S.). Schwarzkirschroth mit amaranthearmoisin Rand.
41. **Selma Kapphan** (S.). Rosa, Spitzen dunkelkirschroth.
2. **Seltene von Köstritz** (S.). Pfirsichlila, nahe an blau.
87. **Silberrose von Köstritz**. Silberweiss, Rückseite graulila.
21. **Silberschmuck** (S.). Silberweiss.
75. **Sonderling von Köstritz** (S.). Hellgoldigisabelle mit lackroth u. carmingetuschten Spitzen. Kugelfrunde Zellenform.
39. **Tricolore von Köstritz** (S.). Goldgelb mit weissen Spitzen.
88. **Venusta** (S.). Blasspaille auf dunklerem Grunde. Rosen-Pyramidenform.
96. **Wacht am Rhein** (S.). Schwarzbrauner Grund in feurig dunkelcarmoisin übergehend mit leuchtend violetcarmin u. lilabrun, oft fast weiss gesäumten Rand.
15. **Zarte Nelke** (S.). Weiss m. zartlila u. schwarzpurpur, fein gestreift u. gespritzt.
4. **Zimmermann Neumann** (S.). Kirschbraun mit weissen Spitzen.

## b. Kleinblumige oder Lilliputen.

### Bouquet-Georginen.

(*A fleurs petites dites Lilliputiens. Bouquet, or Pomponé Dahlias.*)

310. **Bunter Knabe** (S.). Canariengelb m. rosacarmin u. scharlach gestreift u. gespritzt.
304. **Deutscher Fortschritt** (S.). Blasspfirsichblüth mit rosa u. weissem Reflex. Zellenpyramidenform.
308. **Deutsches Mohrenröschen** (S.). Sammtig kohlschwarz auf dunkelpurpurkirschroth. Rückseite und Grund rosalila mit glühend carmoisin Anflug.
314. **Deutsches Nordlicht** (S.). Leuchtend scharlachzinnob, im Verblühen mit goldgelbem Rande.
303. **Deutsches Schneeröschen** (S.). Blendend weiss. Rosenform.
328. **Emilie Raymond** (S.). Blasschamoisrosa m. purpurblauen Spitzen.
307. **Erbkönig** (S.). Violetcarmin m. tief eingehenden weissen Spitzen.
335. **Freier Knabe** (S.). Purp. m. schwarzbraun. Spitzen. Grund purpurrosa.

334. **Fr. Siebenfreund (S.)**. Weiss m. zart pfirsichlila gefleckt. Zellenflachform.
336. **Frl. Auguste (S.)**. Weiss m. lilafarosa Schein.
306. **Fürstenkind (S.)**. Hellgoldgelb m. scharlach. Spitz. u. fein. gelb. Saum.
311. **Gretchen (Mck.)**. Weiss mit lilacarmoisin Spitzen.
338. **Gretchen von Köstritz (S.)**. Leuchtend goldgelb m. purpurcarmoisin Spitzen.
309. **Gretchen vom Osterland (S.)**. Hellgoldorange, nach aussen purpurcarmoisin.
330. **Gruss an Essen (S.)**. Helliceitrongelb. Sehr reichblühend.
339. **Herzblättchen (S.)**. Dunkelcochenillescharlach.
316. **Kleine Nymphe (S.)**. Elfenbeinweiss mit blasslila Schein. Zellenform.
313. **Kleine Rosa (S.)**. Blasslilarosa mit weissem Centrum.
332. **Kleine Silbercentifolia (S.)**. Zart atlasweiss mit silberlila Schein.
337. **Kleine Zellenfürstin (S.)**. Dunkelpurpurcarmin auf weissem Grunde. Zellenform.
312. **Kleine Valentine (S.)**. Blasschamois.
325. **Kleiner Fixstern (S.)**. Cochenillescharlach.
340. **Kleiner Häuptling (S.)**. Amaranthcarmoisin.
315. **Kleiner Hermann (S.)**. Blasskirschroth mit weissen Spitzen.
318. **Kleiner Leuchtkäfer (S.)**. Leuchtend hellgoldgelb m. hellzinnob. Spitzen.
333. **Kleiner Schwarzkopf (S.)**. Schwarzbraun.
331. **Kleines Goldlicht (S.)**. Leuchtend hellgrünlich goldgelb mit hellzinnob. Spitzen.
302. **Kleines Modell (S.)**. Weiss mit leuchtend dunkelpurpurcarmin stark getuschten Spitzen.
329. **Kleines Vollblut (S.)**. Blendend weiss mit hellpurpurcarmin Rand und weissrosa Rückseite.
343. **Kleiner Osterländer (S.)**. Goldgelb, Spitzen rosa und purpurviolet.
317. **Kleined von Köstritz (S.)**. Dunkelcochenillescarmoisin mit hellleder-gelb gesäunt.
342. **Liebe Kleine (S.)**. Rosaweiss mit purpurvioletem Saum.
324. **Lilliputprinz (S.)**. Carmoisinbraun auf schwarzbraunem Grunde.
341. **Mohrenkind (S.)**. Schwarzbraun mit feurigcarmoisin Rand. Vielblumig.
326. **Picta formosa (S.)**. Dunkelmennigorange, öft. m. scharlach marmorirt.
300. **Prinz Kolibri (S.)**. Nankinggelb, rosa schattirt.
327. **Treuliebchen (S.)**. Rosalila mit purpurcarmin Spitzen.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:

à notre choix:					au choix de l'amateur:				
12	Sorten	nach	unserer	Wahl	1	Thlr.	12	Sorten	nach freier Wahl
25	"	"	"	"	2	"	25	"	"
50	"	"	"	"	5	"	50	"	"
100	"	"	"	"	8	"	100	"	"

Einzelne ausgesuchte Sorten à 5 Gr.

### c. Zwerg-Georginen.

*Dahlia's nains.* — *Dwarf Dahlia's*,  
die nur eine Höhe von höchstens 2 $\frac{1}{2}$  Fuss erreichen.

Nachstehende, grösstentheils neuere Sorten blühen schon bei einer Höhe von 1 Fuss, sind sämmtlich compacten Wuchses und vielblumig und daher zu kleinen Gruppen und zu Einfassungen grösserer gut verwendbar. Ebenso eignen sie sich ganz vorzüglich zur Topfcultur.

	Gr.		Gr.
209. <b>Alba floribunda nana (W. P.)</b> . Rein weiss, vielblumig. 2 Fuss	8	204. <b>Crimson Dwarf (K.)</b> . Hellearmoisin, vielblumig. 2 Fuss . .	10
219. <b>Apotheker Th. Leiblin (S.)</b> . Hellvioletweinroth. 2 Fuss. .	10	207. <b>Dwarf Queen (K.)</b> . Purpurroth, weiss punktirt. 1 $\frac{3}{4}$ Fuss. . .	10
211. <b>Capitain Ingram (W. P.)</b> . Dunkelcarmoisin. 2 Fuss . . . .	12	217. <b>Glühende Kohle (S.)</b> . Dunkelfeuerscharlach mit purpur-	



Gr.

Gr.

	schwarzem Anflug auf hellgoldgelbem Grunde. 2 Fuss .	8	212. <b>Marvel.</b> Violetpurpur. 2 Fuss	12
210.	<b>Glühwürmchen (S.).</b> Leuchtend hellzinnober, im Verblühen m. goldgelbem Rande. 1½ Fuss	12	206. <b>Perle (Mard.).</b> Rein weiss. 1½ Fuss . . . . .	10
201.	<b>Gruss an Frankfurt (S.).</b> Mennigroth, mit röthlichweissen Spitzen. 2½ Fuss . . . . .	10	203. <b>Pluton (Dean.).</b> Gelb mit weissen Spitzen. 2 Fuss . . . . .	10
218.	<b>Gruss an Reutlingen (S.).</b> Schwefelgelb, sehr blumenreich. 2 Fuss . . . . .	10	213. <b>Rose Gem (Dean.).</b> . . . . .	10
208.	<b>King of the Dwarfs (W.P.).</b> Purpurcarmoisin. 1½ Fuss . . . . .	12	202. <b>Scharlachzwerg (S.).</b> Cochenillescharlach. . . . .	8
215.	<b>Little Wonder (Hend.).</b> Scharlachroth. 1½ Fuss . . . . .	12	216. <b>Sir James Watt (W.P.).</b> Feuerroth. 2½ Fuss . . . . .	10
			233. <b>Wilhelm Koelle (S.).</b> Dunkelcochenillecarmoisin. Rosenform. 1½ Fuss . . . . .	10
			205. <b>Wizard of the Nord (W.P.).</b> Schwarzbraunviolet . . . . .	8

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

## Italienische Georginen, Dahlia's nouveaux d'Italie.

Nachstehende Varietäten sind von den Gebrüdern Cavagnini, den glücklichen Züchtern der in allen Farben prangenden lebhaft bunten Verbenen, durch vielfältige Befruchtung aus Samen gewonnen. Diese Auswahl ist das Resultat einer doppelten Sichtung; denn nachdem die Herren Producenten aus einer Auswahl von mehreren tausend Samenpflanzen 33 Sorten ausgewählt, und uns übersendet hatten, haben wir diese zur Zeit ihrer Blüthe nochmals genau geprüft, und davon nur nachstehende Sorten festgehalten, von denen wir hoffen, dass sie die Ansprüche der zahlreichen Freunde dieser prachtvollen Herbstblume in jeder Weise befriedigen werden. Bei gutem vollkommenem Bau in verschiedener Form zeichnen sie sich durch lebhaftes, feuriges Färbung u. häufig auffallend buntes u. effectvolles Colorit aus.

### a. Grossblumige (à grandes fleurs).

- |  |   |
|--|---|
| <p>62. <b>Carlotta Ferranti.</b> Goldgelb mit chamois marmorirt u. hellblutroth gespritzt u. gestreift. Röhrenform.</p> <p>60. <b>Contessa Sofia Mazzuchetti.</b> Goldig chamois mit scharlachcarmoisin stark gestreift u. gespritzt; schöne glänzende Farbe.</p> <p>61. <b>Contessa Giulia Cassagno.</b> Rein weiss, nach aussen mit lilacarmin fein gestreift u. getuscht; sehr zarte Färbung.</p> <p>59. <b>Contessa Pauline Bettoni.</b> Schönes hellpfirsichrosa m. sammtig cochenille gestreift und gespritzt.</p> <p>65. <b>Il 23 Marzo 1848.</b> Milchweiss mit zart lila und purpurviolet ge-</p> | <p>sprengt und marmorirt; ausgezeichnete Stellung.</p> <p>66. <b>Il 21 Aprile 1849.</b> Helleitrongelb mit weissen Spitzen; gross.</p> <p>70. <b>Mad. Franchi.</b> Goldocher mit hellcochenille feingespritzt u. gestreift; sehr blumenreich in schöner Zellenf.</p> <p>68. <b>Marianna Baldazare.</b> Dunkelcanariengelb, mit pfirsichfarbener Rückseite, feurig carmoisin gespritzt u. gestreift.</p> <p>71. <b>Scultore Bresciani.</b> Dunkelgoldigisabellfarbig mit purpurcarmin getuschten Spitzen.</p> <p>72. <b>Soffia Legati.</b> Rehgrau mit amaranthviolet fein gestreift, auch abwechselnd einfach amaranthviolet.</p> |
|--|---|

### b. Lilliputen (à petites fleurs).

- |  |   |
|--|---|
| <p>320. <b>Angelina Frusca.</b> Elfenbeinweiss mit zart blassrosa Anhauch; zuweilen nach aussen purpurcarminfarben gestreift.</p> <p>321. <b>General Cialdini.</b> Leuchtend mennigzinnober.</p> <p>322. <b>Madame Müller.</b> Weiss fleischfarben</p> | <p>mit kupfer- u. ziegelroth gestreift u. gespritzt, u. breiten canariengelben Seitenrändern; ungemein auffallend bunte Färbung!</p> <p>323. <b>Orticultore Cavagnini.</b> Gesättigt dunkelschwefelgelb mit silberrosa Spitzen.</p> |
|--|---|

Von Vorstehenden liefern wir von Mitte April an in jungen, kräftigen, gutbewurzelten Pflanzen.

Die Sorte à 15 Gr. — Die ganze Collection für 6 Thaler.

Nous fournissons les précédentes dès le 15. Avril en jeunes plantes très vigoureuses.

Chaque variété, au choix, à 15 Gr. — La collection de 14 variétés pour 6 Thaler.

## GLADIOLUS.

### Gladiolus gandavensis.

Schöne französische Hybriden, abgebar in blühbaren Knollen.

	Thlr. Gr.
3. <b>Bérénice.</b> Rosa, roth gestreift, purpurn gefleckt . . . . .	— 4
5. <b>Canari.</b> Hellgelb. unterhalb rosa gestreift . . . . .	— 8
6. <b>Calendulaceus.</b> Rosa mit nankinggelben Flecken . . . . .	— 6
9. <b>Comtesse de Bresson.</b> Roth, zuweilen weiss gestreift . . . . .	— 4
10. <b>Edith.</b> Gross, fleischfarbenrosa, dunkler panachirt . . . . .	— 5
11. <b>Egérie.</b> Hellorangerosa, dunkelrosa gestreift . . . . .	— 4
12. <b>Flore (Souchet).</b> Grosse Blumen und Rispen. Grundfarbe lilaweiss mit scharf markirten rosa Streifen . . . . .	— 25
14. <b>Greuze (Souch.).</b> Kirschroth, purpurn geflammt. Schöne kräftige Sorte . . . . .	— 20
24. <b>Madame de Vatry.</b> Weiss mit gelbem Anflug, carmin gefleckt . . . . .	— 8
25. <b>Madame Victor Verdier (Truff.).</b> Dunkelrosa, violetcarmin gefleckt . . . . .	— 6
26. <b>Marie (Souch.).</b> Rein weiss, mit dunkelcarmin gefleckt . . . . .	— 12
27. <b>Mirabilis (Souch.)</b> Ganz hellroth; schöne kräftige Sorte . . . . .	— 15
29. <b>Napoléon III.</b> Scharlach, Mitte der Blumenblätter rein weiss gefleckt . . . . .	— 8
30. <b>Némésis (Malet.)</b> Lebhaft rosa, weiss gestrichelt, mit carminrothen Flecken auf gelb . . . . .	— 6
31. <b>Ophir.</b> Dunkelgelb, purpurn gefleckt . . . . .	— 6
32. <b>Pallas (S.)</b> Lebhaft violetcarmin gestreift . . . . .	— 4
33. <b>Princess of Wales.</b> Weiss, carminrosa geflammt und dunkelcarmin gefleckt. Kräftige Sorte von gedrungenem Wuchse . . . . .	— 15
34. <b>Princesse Clotilde.</b> Blumen sehr gross, zart, lachsfarbig rosa mit violeten Flecken auf weissem Grunde . . . . .	— 15
35. <b>Raphael.</b> Lebhaft zinnoberroth, nach der Mitte weisslich mit violet . . . . .	— 8
36. <b>Rubens.</b> Leuchtend hell zinnober und auf weissem Grunde carmin gestreift . . . . .	— 15
37. <b>Solfatare (D.).</b> Schwefelgelb, Blumen sehr gross . . . . .	— 10
38. <b>Surprise (M.).</b> Johannisbeerroth, mit violetbläulichen Flecken und weissen Linien. Zwergsorte . . . . .	— 10
39. <b>Sulphureus.</b> Schwefelgelb . . . . .	— 6
40. <b>Triomphe d'Enghien.</b> Feurig dunkelroth . . . . .	— 5
41. <b>Versicolor.</b> Ziegelroth, dunkelgelb gestreift . . . . .	— 6
42. <b>Vesta.</b> Rein weiss mit carminvioleten Flecken . . . . .	— 8
34. <b>Vulcain.</b> Sammtig dunkelscharlachroth, in der Mitte violet schattirt . . . . .	— 8

Hiervon und von den nachstehenden Sorten liefern wir nach unserer Auswahl je nach ihrem Werthe:

12 Stück in 12 Sorten für  $1\frac{1}{3}$  und für 2 Thlr.

25 „ „ 25 „ „  $2\frac{1}{2}$  „ „ 5 „

50 „ „ 35-40 „ „ 5 „ „ 10 „

Die nachstehenden Sorten können wir zu Dutzend- und Hundert-Preisen liefern.

a. Hybriden von *Gladiolus gandavensis*.

12 Stück 100 Stück

Thlr.Gr. Thlr.Gr.

51. <b>Archimède</b> (S.). Hellroth mit chamois und carmin gestreift . . . . .	1 —	7 —
52. <b>Aristote</b> . Hellrosafleischfarbig und roth gestreift . . . . .	1 —	7 —
53. <b>Brenchleyensis</b> (Youell). Grosse Blume, leuchtend scharlachroth . . . . .	1 10	8 —
54. <b>Chateaubriand</b> (S.). Kirschrosa auf hellem Grunde . . . . .	1 15	10 —
55. <b>Couranti fulgens</b> (S.). Hellroth . . . . .	— 20	5 —
56. <b>Don Juan</b> (S.). Feuerig orange, fast roth . . . . .	— 20	5 —
57. <b>Emma</b> (Verd.). Hellecarmin, Zwergsorte . . . . .	— 20	5 —
59. <b>Galathée</b> . Fleischfarben, fast weiss, mit gelben Flecken auf carminrothem Grunde . . . . .	1 5	8 15
60. <b>Goliath</b> . Sehr gross hellroth, carmin gestrichelt . . . . .	1 5	8 15
61. <b>Hector</b> . Zart rosa, manchmal dunkel panachirt . . . . .	1 —	6 —
65. <b>Madame Hérinck</b> (Verd.) Matt weiss, lebhaft lila marmorirt . . . . .	1 —	7 —
66. <b>Mlle. Fanny Rouget</b> . Lebhaft rosa, carmin gebändert . . . . .	— 16	4 —
67. <b>Monsieur Blouet</b> . Carminrosa, grosse Blume . . . . .	— 20	5 —
69. <b>Monsieur Vinchon</b> (S.). Lachsroth, heller gestreift und weiss liniirt . . . . .	— 24	6 —
70. <b>Neptune</b> . Roth mit carmin panachirt . . . . .	— 24	6 —
71. <b>Pégase</b> . Fleischfarbig mit Purpurflecken . . . . .	— 24	6 15
72. <b>Pellonia</b> . Schön rosa, carmin gestreift . . . . .	— 24	6 15
73. <b>Prémices de Mont rouge</b> . Gross, blendend roth. Zwergsorte . . . . .	1 10	9 —
74. <b>Rembrandt</b> . Brillant, dunkelscharlach . . . . .	1 10	7 —
75. <b>Robert Blum</b> (Bouchy.) Leuchtend orangeroth . . . . .	1 —	6 —

b. Hybriden von *Gladiolus ramosus*.

100. <b>Grandeur Triomphante</b> . . . . .	— 16	5 —
101. <b>Jenny Lind</b> . Orange, weiss gestreift . . . . .	2 —	12 —
102. <b>Insignis</b> . . . . .	1 —	7 —
103. <b>Queen Victoria</b> (Krelage) . . . . .	— 20	4 —
104. <b>Sir Robert Peel</b> . . . . .	1 10	8 —
<b>Byzantinus Species</b> . Violet und weinroth mit weissen Flecken . . . . .	— 12	2 15
<b>Cardinalis</b> „ . . . . .	— 20	3 —
<b>Colvillii</b> „ Violet, lachsfarbig nuancirt, mit gelben Flecken . . . . .	— 24	4 —

Von vorstehendem Sortiment liefern wir gemischt nach unserer Auswahl mit Namen:

12 Stück in 6—8 Sorten für 1 Thlr.

50 „ „ 10—12 „ „ 4 „

100 „ „ 12—15 „ „ 7 „

Die *Gladiolus*zwiebeln sind an einem trockenen, kühlen, aber frostfreien Orte bei einer möglichst gleichmässigen Temperatur von 4—6 Grad R. in leichter trockener Erde oder dergleichen Sande bis zu ihrer Ausspflanzung aufzubewahren. Diese erfolgt, sobald keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April. Will man den Flor verlängern, so kann man einen Theil im Mai, selbst noch später pflanzen, und wird dadurch den ganzen Sommer und Herbst hindurch den Anblick dieser prächtigen Blumen geniessen.

Die *Gladiolus* *byzantinus*, *cardinalis*, *Colvillii* und die *G. ramosus*-Hybriden leiden nicht durch den Frost.



# LILIUM.

Diejenigen Lilien, welchen ein † vorsteht, verlangen eine leichte Bedeckung während des Winters, denen ein k vorsteht, sind fürs Kalthaus. Die übrigen halten ohne Bedeckung im Freien aus.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Auratum</b> ( <i>L. specios. var. imperialis Sieb.</i> )		<b>Speciosum corymbiflorum rubrum.</b> Stark!	1 —
„ Junge Zwiebeln . . . . .	— 20	„ „ punctatum. Neu!	3 —
„ Stärkere Zwiebeln, die vielleicht		„ macranthum. Stark!	1 —
blühen werden . . . . .	1 15	„ punctatum. Echt. Stark!	2 —
„ Starke blühbare Zwiebeln (5 Zoll		„ purpureum. Stark!	3 —
Umfang) . . . . .	4 —	„ roseum. Stark! (12 St. 2Thlr. 20 Gr.)	— 8
<b>Brownii.</b> Stark, echt! . . . . .	1 20	„ „ verum . . . . .	1 —
<b>Candidum</b> flore pleno . . . . .	— 12	„ rubrum. Stark! (12 St. 2Thlr. 20 Gr.)	— 8
„ fol. albo marginat. . . . .	1 —	„ „ extra. Stark! Prachtige	
„ maculatum . . . . .	— 10	„ „ Varietät! . . . . .	1 10
<b>Chalcedonicum</b> . . . . .	— 6	„ „ „Flora“. Stark! Die edelste	
<b>Colchicum</b> ( <i>Snowitzianum</i> ) . . . . .	20 Gr. à 1 —	der Speciosum-Varietäten 3 —	
† <b>Cordifolium.</b> Klein . . . . .	1 10	<b>Spectabile</b> Fischer ( <i>tauricum Ker.</i> ) Klein	— 15
† <b>Coridion.</b> Selten! . . . . .	8 —	<b>Superbum.</b> Stark!	— 12
† <b>Giganteum.</b> Starke Zwiebeln. Blühbar.	5 —	<b>Tenuifolium.</b> Herrliche Art . . . . .	1 10
„ Kleinere Zwiebeln 20 Gr. à	1 20	<b>Thompsonianum</b> ( <i>roseum</i> ) . . . . .	— 15
<b>Isabellinum</b> (= <i>excelsum</i> = <i>testaceum</i> )	— 8	<b>Thunbergianum</b> . . . . .	— 8
<b>Japonicum</b> var. <i>Takesimae.</i> Stark!	— 15	„ <i>atrosanguineum</i> . . . . .	1 10
† <b>Longiflorum</b> eximium verum . . . . .	— 15	„ <i>aureum</i> . . . . .	1 —
„ <i>Liukiu</i> fol. var. Stark!	1 10	„ <i>flore pleno</i> (= <i>fulgens</i> var.	
<b>Pomponicum</b> . . . . .	— 6	„ <i>staminosum</i> ) . . . . .	1 20
<b>Speciosum</b> Sieb. (= <i>lanceifolium</i> Hort.)		„ <i>grandiflorum</i> . . . . .	1 —
„ album. Stark. (12 Stück 2Thlr. 20 Gr.)	— 8	„ <i>latimaculatum</i> . . . . .	1 —
„ „ praecox. Sehr stark!	1 15	<b>Tigrinum</b> <i>angustifolium.</i> Stark!	2 —
„ <i>atropurpureum.</i> Sehr stark! Pracht-		„ <i>latifolium.</i> Stark!	1 10
voll! . . . . .	4 —	„ <i>sinense</i> . . . . .	— 8
„ <i>corymbiflorum</i> album. Stark!	1 10		

Von vorstehenden Lilien offeriren wir:

12 Sorten nach unserer Wahl für 3 und für 6 Thlr.

24 „ „ „ „ „ 10 „ „ 20 „

## ERD-ORCHIDEEN.

ORCHIDÉES TERRESTRES. — TERRESTRIAL ORCHIDS.

Keine Pflanzenfamilie ist in den Ansprüchen, welche sie zu ihrem Gedeihen macht, so bescheiden als die Erdorchideen. Freilich können sie mit ihren tropischen Schwestern nicht in der glühenden Farbenpracht und den grossen Blüten rivalisiren, jedoch sind sie mit ihren zierlichen, interessant geformten Blüten sehr wohl der Cultur werth. Jedes schattige Plätzchen reicht hin, um dieselben zur Vollkommenheit zu bringen, und wer dieselben einmal blühend gehabt, wird dieselben bald zu seinen Lieblingen zählen.

Die Ruhezeit ist vom August bis October, jedoch lassen sich dieselben noch ganz gut bis Ende Mai versenden. Dieselben bedürfen während des Winters keinerlei Decke.

	Thlr. Gr.
<b>Cephalanthera</b> pallens. <i>Rich.</i> Weiss, Lippe gelb liniirt . . . . .	— 3
„ rubra. <i>Rich.</i> Purpurroth, Lippe gelb liniirt . . . . .	— 5
<b>Coeloglossum</b> viride. Hellgrün . . . . .	— 6
<b>Cypripedium</b> acaule . . . . .	— 25
„ Calceolus. <i>L.</i> Rothbraun, Lippe gelb, innen roth punkirt . . . . .	— 6
„ pubescens. <i>W.</i> Chocoladenbraun, Lippe goldgelb . . . . .	— 25
<b>Epipactis</b> latifolia. <i>Sie.</i> Schmutziggelb, röthlich violett . . . . .	— 3
„ palustris. <i>Sie.</i> Grün u. rosenroth, Lippe mit purpurrothem Fleck . . . . .	— 3
„ rubiginosa. <i>Hoffm.</i> Dunkelroth . . . . .	— 3
<b>Goodiera</b> repens. <i>R. Br.</i> Grün . . . . .	— 3
<b>Gymnadenia</b> conopsea. <i>L.</i> Purpurroth bis schneeweiss; sehr wohlriechend . . . . .	— 3
<b>Listera</b> ovata. <i>R. Br.</i> Gelblichgrün . . . . .	— 3
<b>Nigritella</b> angustifolia. <i>Rich.</i> . . . . .	— 8
<b>Ophrys</b> arachnites. <i>All.</i> . . . . .	— 5
„ <i>Myodes.</i> <i>Jacq.</i> Sammtig schwarzpurpurroth, grau gefleckt . . . . .	— 3

	Thlr. Gr.
<b>Orchis</b> fusca. Jacq. Purpur, mit weisslicher rosa punktirter Lippe . . . . .	— 3
latifolia. L. Lila bis weiss, Lippe roth gezeichnet . . . . .	— 3
laxiflora . . . . .	— 10
maculata. L. Fleischfarbig bis dunkelrosenroth . . . . .	— 3
mascula. L. Purpur, Lippe dunkler punktirt . . . . .	— 3
Morio. L. Purpur, Lippe gefleckt, oft rein weiss . . . . .	— 3
pallens. L. Hellgelb mit dunklerer Lippe. Fliederduftend . . . . .	— 3
pyramidalis. L. Dunkelroth . . . . .	— 5
sambucina. L. Hellgelb od. fleischroth, oft auch dunkler, m. schwachem Hollundergeruch . . . . .	— 5
ochroleuca . . . . .	— 8
ustulata. L. Rothbraun, mit weisser roth punktirter Lippe . . . . .	— 8
variegata. L. Fleischfarbig-purpur . . . . .	— 5
<b>Platanthera</b> bifolia. L. Weiss mit hellgrüner Lippenspitze u. Sporn. Sehr wohlriechend . . . . .	— 3
<b>Spiranthes</b> autumnalis. Rich. Weiss . . . . .	— 5

Hieron liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr.

„ „ „ 24 „ „ „ „ „ 2 „

Ausserdem empfehlen wir noch als prächtige Blüher für das freie Land folgende Pflanzen:

<b>Campanula</b> pyramidalis. Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von 5 Fuss . . . . .	— 6
<b>Dodecatheon</b> integrifolium. Herrliche Primulacee . . . . .	— 8
<b>Fritillaria</b> imperialis aureo var. Goldbuntblättrige Kaiserkrone . . . . .	— 15
<b>Gaillardia</b> Loiselii. Blume Schwarz, roth, gold, gleich einer Cocarde. Prächtig . . . . .	— 8
<b>Geranium</b> Endressi. Prachtvoll . . . . .	— 10
<b>Gunnera</b> scabra. Decorative Prachtpflanze mit riesigen Blättern . . . . .	— 8
<b>Hemerocallis</b> Kwanse fl. pl. mit orange gefüllten Blüten . . . . .	— 6
<b>Heterotropa</b> asaroides . . . . .	2 —
<b>Iris</b> reticulata. Dunkelviolett mit weiss, gelb u. schwarz, zart punktirt . . . . .	— 15
<b>Lychis</b> Gampli . . . . .	— 5
„ Senno . . . . .	— 10
„ variegata . . . . .	— 10
„ sanguinea grandiflora . . . . .	— 10
<b>Saranna</b> camschatica. Schwarze Lilie von Kamschatka . . . . .	— 20
<b>Schizostylis</b> coccinea. Prächtig carminroth. (12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	— 4
<b>Sisyrinchium</b> vernal. Violett, sehr grossblumig. Schön! . . . . .	— 8
<b>Statice</b> latifolia. Dunkelblau . . . . .	— 10
<b>Trierythra</b> hirta . . . . .	— 8
„ „ grandiflora . . . . .	— 8
„ „ nigra. Neu! Fast schwarz . . . . .	— 20

## Farne für das freie Land.

### Fougères de plein air = Hardy Ferns.

Die Farnen lieben sämmtlich einen schattigen Standort und wo möglich etwas leichtere Erde.

	Thlr. Gr.
<b>Aspidium</b> Drepanopterum. Mett. . . . .	— 10
<b>Asplenium</b> Filia fem. var. Frizelliae. Zierliche Art . . . . .	10 Gr. à — 20
<b>Cyrtomium</b> falcatum. Pr. . . . .	— 8

Schöner harter Farn mit schwarzgrünen lederartigen, sichelförmig geschnittenen Blättern. 12 Stück kräftige 2jährige Pflanzen 3 —  
24 „ „ „ „ „ 5 20

<b>Lastraea</b> filix mas. Pr. Decorativer Farn . . . . .	— 6
„ „ „ monstrosa. Eine Varietät v. Vorstehenden, m. schmälern Blattfedern u. moosähnlichen, quastenförmigen Spitzen. Ebenso hart als der Vorstehende . . . . .	— 10

<b>Osmunda</b> regalis. L. Die Species ist eine der herrlichsten Formen unter den Farnen. Gedeiht ausserordentlich auf einem etwas feuchten Standort. Dasselbe gilt auch von der folgenden: . . . . .	— 10
„ „ „ var. cristata. Mit kammartig zertheilten Blättern . . . . .	— 20

**Polystichum** vestitum Pr. var. venustum. Prachtvoller Farn. Derselbe bildet mit seinen spitzgezähnten harten Wedeln herrliche Rosetten u. zeichnet sich noch durch einen sehr gedrunenen Wuchs aus. Selten! 3 —

**Woodsia** ilvensis. B. Kleiner nur 3 Zoll hoch werdender Farn, auf kleine Felspartien, am liebsten in der Nähe des Wassers . . . . . — 8

**Struthiopteris** germanica. Willd. Schöne schnellwachsende Art m. langen decorativen Wedeln. Aeusserst hart. Starke Pflanzen! . . . . . — 10

# IV. ABTHEILUNG.

## Kalthaus - Pflanzen.

Plantes de Serres froide et d'Orangerie.

Um die Uebersicht zu erleichtern, ist die hier beginnende wichtige Hauptabtheilung von Pflanzenculturen in folgende Rubriken eingetheilt worden, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

Kalthauspflanzen im Allgemeinen. — Liliaceae (Agave, Yucca etc.). — Succulente Pflanzen. — Proteaceae. — Azalea indica. — Camellia. — Rhododendron. — Coniferae. — Buntblättrige Pflanzen. — Wasserpflanzen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Acacia dealbata</b> Link. . . . .	— 8	<b>Aucuba</b> jap. pygmaea (masc.) . . . . .	2 —
Douglasii Hort. . . . .	6	» » salicifolia . . . . .	— —
Hügelii Benth. . . . .	— 8	» » sulphurea . . . . .	— —
inermis Hort. . . . .	8	<b>Bambusa</b> Fortunei fol. niveo-vit-	
ixiophylla . . . . .	6	tatis (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.) . . . . .	5
Latrobei . . . . .	6	<b>Berberis</b> Darwinii (12 Stück	
mucronata Willd. . . . .	8	2 Thlr.) . . . . .	6
Oxycedrus Sbr. . . . .	8	Fortunei . . . . .	2 —
pugioniformis Wendl. . . . .	6	<b>Bignonia</b> jasminoides alba	
Sophorae Desf. . . . .	6	magna Lem. . . . .	15
<b>Agapanthus umbellatus</b> L. . . . .	6	» » splendens Lem. . . . .	15
» » sehr stark,		<b>Blandfordia</b> grandifl. R. Br. 1 à 2 —	
in Kübeln . . . . .	6 —	<b>Boussingaultia</b> basseloides H.	
» » fol. var. . . . .	10	B. K. . . . .	5
§ <b>Alstroemeria</b> multifl. Mirb.		<b>Brugmansia</b> Knightii Hort.	
(Bomaria multiflora) . . . . .	25	(Datura cornigera Hook.) . . . . .	6
<b>Amaryllis</b> phycelloides. (Neue		<b>Calothamnus</b> quadrifida R. B. . . . .	10
Species von Chili) . . . . .	25	<b>Campanumoea</b> lanceolata 10 Gr. à —	25
<b>Astelia</b> Banksii Don. var. rub-		<b>Camphora</b> officinalis N. v. E	
venia . . . . .	12	(Laurus camphora L.) . . . . .	8
<b>Aucuba</b> himalaica . . . . .	10	<b>Cassia</b> stipulacea Ait. . . . .	15
» » macrophylla (foem.) . . . . .	25	<b>Centaurea</b> babylonica . . . . .	15
» japonica (Typus) = A. vi-		» candidissima vera . . . . .	12
ridis (foem.) . . . . .	10	<b>Cestrum</b> elegans Schlecht. (Ha-	
» jap. (Typ.) = A. v. (masc.) . . . . .	—	brothamnus elegans Scheidw.) . . . . .	6
» » angustifolia . . . . .	—	<b>Chorizema</b> cordata Lindl. var.	
» » » maculata (foem.) . . . . .	4 —	splendens . . . . .	6
» » arborea vera (masc.) . . . . .	4 —	ilicifolia Lem. . . . .	8
» » bicolor (masc.) . . . . .	15	Soulangeana . . . . .	8
» » in medio var. (masc.) . . . . .	2 —	<b>Cissus</b> antarctica Vent. . . . .	10
» » latimaculata (foem.) . . . . .	10	<b>Citrus</b> Aurantium L. crispum Hort. . . . .	12
» » limbata . . . . .	3 —	» flore pleno . . . . .	20
» » longifolia . . . . .	2 —	» fol. albo var. . . . .	12
» » » aureo varieg. . . . .	4 —	» multiflorum Hort. . . . .	12
» » macrodentata (foem.) . . . . .	—	» myrtifolium Ht. . . . .	10
» » maculata (masc.) . . . . .	2 —	» salicifolium . . . . .	20
» » ovata (masc.) . . . . .	1 15	<b>Medica</b> L. . . . .	10
» » » aureo punctata . . . . .	2 —	» fol. luteo var. . . . .	15
» » picta (foem.) = fol.		Von Orangen- u. Citronenbäumen	
aureis marg. . . . .	1 —	sind Hochstämme in verschiedener	



Thlr. Gr.

Thlr. Gr.

Höhe, Grösse und Stärke. abgebar,  
und zwar zu 12, 18, 24 bis 50 Thlrn. u.  
mehr, sowie niederstämmige mit brei-  
ten Kronen zu 10—24 Thlrn. pr. Stück.

<b>Clerodendron Bungei Steud.</b> . . . . .	— 6	<b>Eurya japonica</b> . . . . .	— 10
<i>fragrans Vent.</i> . . . . .	— 6	<i>latifolia fol. var.</i> . . . . .	1 —
" <i>flore albo pleno</i> . . . . .	— 8	<b>Evonymus japonicus fol. arg. var.</b> . . . . .	— 6
<b>Clethra arborea Ait. fol. var.</b> . . . . .	— 10	" <i>fol. albo margin.</i> . . . . .	— 10
<b>Cleyera japon. arg. et rubr. var.</b> . . . . .	2 15	" <i>fol. aureo marg.</i> . . . . .	— 10
<b>Cobaea scandens fol. var.</b> . . . . .	— 10	" <i>fol. aureo varieg.</i> . . . . .	— 10
<b>Colletia Bictoniensis Lindl.</b> 1 à 3 —		" <i>fol. tricoloribus</i> . . . . .	— 10
<i>spinosa Lam. (Coll. horrida</i>		" <i>macrophyllus</i> . . . . .	— 8
<i>Willd.)</i> . . . . . 15 Gr. à 1 —		" <i>ovatus Wall.</i> . . . . .	— 8
<b>§ Convolvulus mauritanicus</b> . . . . .	— 6	" <i>in medio aur. pictis</i> . . . . .	— 15
<b>Correa cardinalis F. Müll.</b> . . . . .	— 15	" <i>radicans fol. arg. marg.</i> . . . . .	— 6
<i>alba Andr.</i> . . . . .	— 5	" <i>fol. roseis marg.</i> . . . . .	— 8
<i>speciosa Andr. var. major.</i> . . . . .	— 15	" <i>foliis pictis</i> . . . . .	— 10
<b>Crowea saligna Smith.</b> . . . . .	— 15	<b>Fabiana imbricata R. et P.</b> . . . . .	— 8
<b>Cotoneaster Hookeri</b> . . . . .	— 6	<b>Farfugium grande Lindl.</b> vide	
<b>Cyclamen Atkinsii Hort.</b> . . . . .	— 25	<i>Senecio Farfugium C. Koch.</i>	
<i>Coum vernum</i> . . . . .	— 20	<b>Fragaria vesca fol. var.</b> . . . . .	— 8
<i>macrophyllum Hort. = african.</i>	— 15	<b>Gardenia florida L.</b> . . . . .	— 10
<i>neapolitanum Ten.</i> . . . . .	— 20	<i>Fortunei</i> . . . . .	— 12
<i>persicum Mill. var. albiflorum</i>	— 15	<i>Maruba Reg.</i> . . . . .	— 15
<b>Cytisus filipes Hort. Selten!</b>		<i>radicans Thunb.</i> . . . . .	— 8
2—3 F. hohe Veredelungen	1 15	<b>Gaultheria procumbens L.</b> . . . . .	— 6
<i>praecox</i> . . . . .	— 8	<b>Genethyllis tulipifera</b> . . . . .	— 20
<i>palmensis</i> . . . . .	— 8	<b>Grewillea robusta Cunningham.</b>	
<b>Daphne Dauphinii Hort.</b> . . . . .	— 15	<i>(vide Proteaceen).</i>	
<b>Datura cornigera Hook., vide</b>		<b>Griselinia littoralis Raoul. (Pu-</b>	
<i>Brugmannsia Knightii fl. pl.</i>		<i>kateria littoralis)</i> . . . . .	— 10
<b>Deeringia Amherstiae fol. var.</b> . . . . .	— 5	<b>Gynierium argenteum verum</b>	
<b>Desfontainea spinosa R. et P.</b>		<i>R. v. E.</i> . . . . .	— 15
15 Gr. à 1 —		<i>argenteum à fleurs soyeuses</i> . . . . .	1 10
<b>Dillwynia cinerascens R. B.</b> . . . . .	— 10	" <i>giganteum</i> . . . . .	1 10
<b>Diosma ambigua Lodd.</b> . . . . .	— 10	<b>§ Hardenbergia ovata Benth.</b>	
<b>Doryanthes excelsa R. Br.</b> 1 à 2 —		<i>(Kennedyia ovata Sims.)</i> . . . . .	— 10
<b>Dracaena australis</b> . . . . .	— 15	<b>Hedera japonica fol. arg. var.</b> . . . . .	— 6
<b>Drimia marmorata</b> . . . . .	2 —	<i>rhombea fol. argenteo var.</i> . . . . .	— 6
<b>Drymis Winteri Forst.</b> . . . . .	— 15	<b>Hibiscus macrophyllus Horn.</b> . . . . .	— 8
<b>Elaeagnus reflexus</b> . . . . .	— 10	<b>Hovea purpurea Sweet.</b> . . . . .	— 10
" <i>argent. marg.</i> . . . . .	1 10	<b>Humea elegans Sm.</b> . . . . .	— 5
" <i>aureo marg.</i> . . . . .	1 10	<b>Hydrangea hortensis Sm.</b> . . . . .	— 5
" <i>varieg.</i> . . . . .	— 15	" <i>Stark u. schön;</i>	
<b>Epacris carminata</b> . . . . .	— 10	<i>in Kübeln, Das Paar 8 à 10</i> —	
<i>Princess Royal</i> . . . . .	— 10	<i>japonica Rosalba Hort.</i> . . . . .	— 8
<i>pulchella major</i> . . . . .	— 10	" <i>fol. argenteo var.</i> . . . . .	— 6
<i>pungens</i> . . . . .	— 10	" <i>eleg. maculata</i> . . . . .	— 15
<b>Eranthemum tuberculatum</b>		<b>Jasminum grandiflorum L.</b> . . . . .	— 8
<i>(12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.)</i> . . . . .	— 5	<i>heterophyllum Wall.</i> . . . . .	— 10
<b>Eriostemon linearifol. Dne.</b>		<i>nudiflorum</i> . . . . .	— 6
15 Gr. à 1 —		<b>Ilex Fortunei Sieb.</b> . . . . .	— 10
<i>macrophyllum</i> . . . . . 20 Gr. à 1 15		<i>furcata</i> . . . . .	— 10
<b>Escallonia macrantha Hook. et</b>		<i>latifolia Thunb.</i> . . . . .	— 8
<i>Arn.</i> . . . . .	— 6	<i>Opacca Ait.</i> . . . . .	— 10
<b>Eugenia australis (Wendl. Jam-</b>		<i>paraguaiensis St. Hil.</i> . . . . .	— 10
<i>bosa australis D. C.)</i> . . . . .	— 8	Die Ilex für d. freie Land vide pag. 64.	
<i>Ugnii Hook. et Arn.</i> . . . . .	— 5	<b>Illicium anisatum L.</b> . . . . .	— 8
		<i>floridanum L.</i> . . . . .	— 8
		<b>Josephia rachidifolia Salisb.,</b>	
		<i>vide Dyandra nivea.</i>	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Kalmia latifolia</b> var. <i>splendens</i> Walther . . . . .	1 —	<b>Pictetia Devauxii</b> DC. . . . .	8
<b>Kennedyia arenaria</b> Benth. . . . .	8	<b>Pylogine</b> suavis . . . . .	5
» <i>andomarensis</i> Hort. . . . .	8	<b>Pimelia decussata</b> R. Br. . . . .	8
» <i>glabrata</i> Lindl. . . . .	8	» <i>elegans</i> Hort. . . . .	15
» <i>rubicunda superba</i> Vent. . . . .	8	» <i>Hendersonii</i> Grah. . . . .	15
<b>Lambertia formosa</b> Smith. (Prot.)		<b>Pittosporum Tobirae</b> Ait. (P.	
§ <b>Lapageria rosea</b> R. et P. 1½ à 3	—	» <i>chinense</i> Stark! . . . . .	20
§ » var. <i>splendens</i> 8	—	» <i>fol. var.</i> . . . . .	20
<b>Laurus macrocephala</b> . . . . .	10	<b>Polygonum platycladon</b> . . . . .	8
» <i>macrophylla</i> Wall. . . . .	10	<b>Primula sinensis</b> L. fl. albo	
» <i>nobilis</i> L. (12 St. 1-2 F. h. 3 Th.)	10	» <i>pleno</i> . (12 Stück 3 Thlr.) . . . . .	8
» <i>regalis</i> . . . . .	15	» <i>sinensis</i> L. fl. rubo pleno. . . . .	8
» <i>sericea</i> . . . . .	10	» (12 Stück 3 Thlr.) . . . . .	
<b>Tinus Hort.</b> , vide <b>Viburnum</b>		<b>Pterostyrax hispidum</b> . . . . .	20
» <i>stricta</i> Hort., vide <b>Viburnum</b>		<b>Pukateria Raoul.</b> , vid. <b>Griselina</b>	
» <i>stricta</i> L. β. <i>stricta</i> .		» <i>littoralis</i> .	
<b>Leechenaultia formosa</b> R. B. . . . .	8	<b>Pultenaea thymifolia</b> Sieb. . . . .	8
<b>Leucophyta Brownii</b> Cass. . . . .	6	<b>Punica Granatum</b> L. Grosse	
<b>Leucopogon</b> Cunningh. R. Br. 1 à 1	15	» <i>Bäume in Kübeln</i> . . . . .	30 à 40 —
<b>Libertia ixioides</b> var. <i>versicol.</i>		» <i>Granatum fl. rubo plena</i> {	
» vide <b>Sisyrinch.</b> <i>ixioid.</i> var.		» var. <i>nanum</i> . . . . .	15
» <i>versicolor</i> .		» var. <i>nanum fl. albo pleno</i> . . . . .	12
<b>Libonia floribunda</b> . . . . .	6	<b>Raphiolepis ovata</b> . . . . .	15
<b>Ligustrum glabrum</b> fol. aur. var. . . . .	6	<b>Reineckia carnea</b> fol. var. . . . .	6
» <i>nepalense aureo varieg.</i> . . . .	15	<b>Rhamnus crenulatus</b> Ait. . . . .	8
<b>Limonia trifoliata</b> L. (Triphasia		<b>Rhodea japonica</b> fol. var. . . . .	20
» <i>Aurantiola</i> Lour.) 20 Gr. à 1	—	<b>Rubus australis</b> Forst. . . . .	8
<b>Linum juniperifolium</b> Eckl. . . . .	6	» <i>moluccanus</i> L. . . . .	8
» <i>Makraei</i> . . . . .	15	<b>Salvia splendens compacta</b> . . . . .	6
<b>Luzuriaga radicans</b> R. et P. . . . .	8	<b>Saxifraga tricolor</b> . . . . .	8
<b>Magnolia Youlan</b> Desf. 15 Gr. à 1	15	<b>Schinus</b> L. <i>molle</i> . . . . .	10
<b>Mahernia glabrata</b> Cav. (Mah.		<b>Sedum</b> Sieb. <i>in medio aurea picta</i> . . . . .	8
» <i>odorata</i> Andr.) . . . . .	5	<b>Selinum decipiens</b> . . 10 Gr. à 1	—
<b>Melaleuca armillaris</b> Sm. . . . .	8	<b>Serissa foetida</b> fol. alb. marg.	
» <i>thymifolia</i> Sm. . . . .	10	» (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . . . . .	4
<b>Menispermum laurifolium</b> DC. . . . .	8	<b>Sisyrinchium ixoides</b> (Libertia	
<b>Melianthus major</b> L. . . . .	10	» <i>ixioides</i> ) . . . . .	8
<b>Metrosideros albicans</b> . . . . .	10	» <i>ixioides versicolor</i> . . . . .	15
» <i>florida</i> fol. var. . . . .	15	<b>Skimmia japonica</b> Thunb. . . . .	6
<b>Muraltia Heisteri</b> DC. . . . .	10	» <i>spec. nova</i> . . . . .	1 —
<b>Muschia aurea</b> Dum. . . . .	10	<b>Smilax maculata</b> . . . . .	10
» <i>Wollastoni</i> Stark! . . . . .	15	<b>Solanum jasminoides</b> fol. var. . . . .	10
<b>Myrrhinum sarcopetalum</b> . . . . .	10	<b>Stachyurus praecox</b> . . . . .	15
<b>Myrtus communis</b> L. fol. var. . . . .	6	<b>Sutherlandia frutescens</b> fl. albo . . . . .	8
<b>Nandina angustifolia</b> Sieb. . . . .	15	» <i>spectabilis floribunda</i> . . . . .	12
<b>Olea europaea</b> L. . . . .	10	<b>Swainsonia Grayana</b> . . . . .	15
» <i>ilicifolia</i> Hort. angl. . . . .	10	» <i>Osborni</i> . . . . .	15
<b>Osmanthus aquifolius diversifol.</b>		§ <b>Tecoma capensis</b> G. Don., vid.	
» <i>ilicifolius argent-marg.</i> . . . .	8	» <i>Bignonia capensis</i> Thunb.	
» » <i>aureo marg.</i> . . . . .	8	» <i>jasminoides</i> G. Don. <i>flore rubro</i>	15
<b>Ophiopogon Jaburan</b> fol. aur. var. . . . .	20	<b>Testudinaria elephantipes</b> Her.	
» <i>spicatum</i> fol. albo-striatis		» 3 à 8 —	
» vide pag. 5.		» <i>rupicola</i> Hort. Amst. . . . .	3 —
<b>Philesia buxifolia</b> Willd. . . . .	2 —	<b>Thea Bohea</b> L. . . . .	20
<b>Phormium tenax</b> Forst. . . . .	15	» <i>chinensis</i> DC. β <i>assamica</i> . . . . .	20
		» <i>viridis</i> L. . . . .	20

	Thlr. Gr.		Thr. Gr.
<i>Thibaudia florib. H. B. K.</i> . . . . .	2 —	( <i>Laurus Tinus Hort.</i> ) . 5 à	15
<i>Trierytis hirta Hort.</i> ( <i>Uvularia</i>		<i>punctatum</i> . . . . .	8
<i>hirta Thunb.</i> ) . . . . .	8	<i>Tinus var. stricta (Laurus Ti-</i>	
<i>hirta var. grandiflora</i> . . . . .	8	<i>nus Hort. var. stricta)</i> . . .	10
» » <i>nigra</i> . . . . .	20	<i>Vitis Thunbergii fol. pictis</i> . .	6
§ <i>Tropaeolum azureum Miers.</i>		» » » <i>sanguineis</i> 1	—
<i>Starke Knollen</i> . . . . .	25	<i>Weinmannia trichosp. Cav.</i> . .	15
<i>Jarattii Paxt. Starke Knollen</i> —	20	<i>Witsenia corymbosa Sm.</i> . . .	15
<i>Veronica, vide pag. 54.</i>		<i>Xylosteum Phylomele v. Sieb.</i> .	20
<i>Viburnum macrocephal., vid.</i>		<i>Yucca, vide besondere Rubrik.</i>	
<i>Laurus macroceph. Tinus L.</i>		<i>Zauschneria californica</i> . . . .	10

## LILIACEAE.

(Im engeren Sinne.)

### Agave. — Beschorneria. — Bonapartea. — Fureraea. — Yucca.

Von diesen prachtvollen u. äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke u. ausserlesene Collectionen, welche die seltenen und neu eingeführten Species sämmtlich in sich schliessen, u. die durch zahlreiche Erwerbungen aus der, vor einigen Jahren stattgefundenen Auction der berühmten Sammlung des Herrn van der Winnen in Brüssel, noch bedeutend vermehrt worden sind. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen und manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Ausstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balcons verwendet werden, wie z. B. von *Agave americana* und deren Varietäten, von *Agave filifera*, *Yucca canaliculata*, *glauca*, *quadricolor*, *recurva* etc., grosse Exemplare in Couples von gleicher Höhe und Stärke, abgebar, und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt. Zugleich machen wir Liebhaber dieser herrlichen Gattungen darauf aufmerksam, dass unsere Sammlungen sich in vorzüglichem Culturzustande befinden und dass wir Pflanzen mit fleckigen, gelben und arg bestossenen Blättern nicht liefern. Denn bei keiner anderen Pflanzengattung erhöht die Sauberkeit und das gesunde Aussehen der Blätter den Werth der Pflanzen mehr, als bei den Geschlechtern der Agaven etc.

	Thlr. Gr.
<b>Agave americana.</b> Schöne Pflanzen mit 8—12 Blättern 1—1½ Fuss hoch	1 10
» Junge Pflanzen mit 4—6 Blättern . . . . .	6 Gr. à — 15
» fol. aureo margin. 4 Fuss hoch, starke Exemplare mit	
25 Blättern . . . . .	40 —
» » » » Ein Couple von obiger Stärke . . .	70 —
» » » » Junge Pflanzen von ½ Fuss Höhe . . .	25
» » » striatis 3¾ Fuss hoch u. 5 F. breit, unvergl.	
schöne Exemplare . . . . .	40 —
» » » » 1½ Fuss hoch u. 2½ F. breit . . .	10 —
» » » » Junge Pflanzen 4—6 Zoll hoch . . .	20
» in medio aureo picta. 2 Fuss hoch, m. 12—18 Blättern	25 —
» » » » 4—6 Zoll hoch . . . . .	3 à 4 —
<b>applanata.</b> Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau.	
Blätter kurz, breit, imbricquirt, blaugrün, Zwergart, 14 Zoll hoch,	
16 Zoll breit mit 25 Blättern . . . . .	15 —
» Jüngere Pflanzen mit 5—10 Blättern . . . . .	5 —
<b>attenuata Hort. Berol.</b> mit 10—14 Blättern . . . . .	6 —
» Stark von 2¼ Fuss Höhe mit 12—16 Blättern . . . . .	25 —
» latissima. Prachtexemplar von 3¼ Fuss Höhe u. 4 Fuss Breite	
mit 20 Blättern . . . . .	50 —
<b>Besseriana.</b> Varietät v. <i>A. macroacantha Zucc.</i> 1 Fuss hoch, m. 32 Bl.	30 —
<b>Bouchei Hort. Berol.</b> 3—7 Zoll hoch, mit 6—10 Blättern . . . . .	6 —
» <i>chiapensis.</i>	
<b>Celsiana.</b> Mit 10—12 Blättern . . . . .	4 —
» <i>mitis.</i> . . . . .	—
<b>Chiapensis</b> . . . . .	—





<b>Agave rupicola</b> <i>Rgl.</i> ( <i>A. chloracantha Hort.</i> )	—
<i>Salmiana Karw.</i> 2—3 Fuss hoch, mit 10—15 Blättern	25 —
„ „ $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ „ „ 4—9 „	15 —
„ „ Junge Pflanzen	3 à 4 —
„ <i>latifolia</i> . 6 Zoll hoch	—
<i>Saundersi Hook.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, 4 Fuss breit, mit 17 Blättern	25 —
„ „ $\frac{1}{2}$ „ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ 10 „	8 —
„ „ Junge Pflanzen	4 —
<b>Schiedigera</b> <i>Lemaire</i> . Starke Pflanzen mit 24—28 Blättern	8 à 10 —
Jüngere „ „ 10—18 „	5 à 6 —
Junge „ „ 6—8 „	3 à 5 —
<i>scolymus Karw.</i>	—
<i>stricta</i> . Stark! $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 2 Fuss breit	10 —
<b>Tehuacanensis</b> <i>Hort. Berol.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 3 Fuss breit, mit 12 Bl.	20 —
„ „ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ 2 „ „ 12 „	8 —
„ „ „ 7 Zoll „ 12 Zoll „ „ 6 „	3 —
<i>univittata Haw.</i> Echt! 1 Fuss hoch, mit 30 Blättern	35 —
„ „ Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, mit 16—20 Bl.	8 —
„ „ Junge Pflanzen mit 3—4 Blättern	3 —
<i>Verschaffeltii Hort.</i> Pflanzen von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Höhe, mit 20—24 Bl.	30 —
<i>xalapensis</i> ( <i>Littaea xalapensis Roez.</i> ) Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft, mit rothen Dornen und Stacheln.	—
1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 20—30 Blättern	8 —
$\frac{3}{4}$ —1 „ „ „ 16—18 „	5 —
<i>xylacantha Salm.</i> $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{4}$ Fuss Durchm., mit 20 Blättern	20 —
„ „ Junge Pflanzen mit 3—4 Blättern	4 —
„ „ <i>cornuta</i>	—
„ „ var. <i>longifolia</i> . 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchm., mit 14 Blättern	35 —
8 Zoll hoch, 20 Zoll breit, mit 6 Blättern	12 —
<i>yuccaefolia Red.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 13—15 Blättern	6 —
$\frac{1}{2}$ „ „ „ 5—7 „	1 à 3 —
<b>Beschorneria</b> <i>multiflora</i> . $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	12 à 15 —
1 „ „ „ $\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser	8 —
<i>yuccoides</i> . 8—12 Zoll hoch, mit 5—8 Blättern	$1\frac{1}{2}$ à 5 —
<b>Bonaparte</b> <i>hystrix Hort. Gand.</i> , vide <i>Agave recurva</i> .	—
<i>junceae Willd.</i> ( <i>Agave geminiflora Gawl.</i> ) 1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12 —
„ var. <i>filamentosa</i> . $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	15 —
„ „ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „ „ „ „	8 —
<b>Furcraea</b> <i>Beddinghausii C. Koch.</i> , vide <i>Yucca argyraea</i> .	—
<i>gigantea Vent.</i> ( <i>Agave foetida L.</i> ) $2\frac{1}{4}$ Fuss hoch, mit 20 Blättern	10 —
„ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ „ 18 „ 4 à 6 —	—
<i>tuberosa Ait.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 30 Blättern	12 —
<b>Lomatophyllum</b> <i>borbonicum Willd.</i> Starke Pflanzen, 1— $1\frac{1}{2}$ F. h.	2 à 5 —
<i>macrum Salm-D.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	1 15 —
<b>Roezlia</b> <i>regia (vera)</i> . Starke Pflanzen	3 —
<b>Yucca</b> ( <i>Palmilie</i> ) <i>aloifolia L.</i> 3 Fuss hoch, 2 Fuss breit	3 —
<i>aloifolia foliis variegatis Hort.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{4}$ Fuss breit	8 —
2 „ „ 2 „ „	6 —
Junge Pflanzen	— 20
<i>albo-spica</i> . $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $\frac{1}{4}$ Fuss breit	7 —
<i>argyraea Lindl.</i> (Als <i>Yucca Parmenterii</i> und unechte <i>Roezlia regia</i> im Handel), sehr hübsche Pflanzen von $1\frac{1}{2}$ Fuss Höhe.	$1\frac{1}{2}$ , 5 à 8 —
<i>canaliculata</i> . $3\frac{1}{2}$ Fuss hohe und $2\frac{1}{2}$ Fuss breite, schöne Exemplare	30 —
„ $2\frac{1}{2}$ „ „ „ $2\frac{1}{4}$ „ „ „	25 —
„ 1 „ „ „ 2 „ „ „	3 à 4 —

	Thlr.	Gr.
<i>Yucca conspicua</i> Haw. 2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 3 Fuss breit . . . . .	6	—
1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	1 $\frac{1}{2}$	à 3 —
cornuta. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 2 Fuss breit . . . . .	6	—
» var. latifolia (Hort. v. d. W.) . . . . .	—	—
crenulata Haw. 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser . . . . .	10	—
filamentosa L. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen . . . . .	15	Gr. à 1 —
Jüngere Pflanzen . . . . .	8	Gr. à — 10
» foliis variegatis Hort. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, stark . . . . .	—	—
flaccida Haw. 1 Fuss hoch, stark . . . . .	1	—
1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .	—	20
glauca Nois. (Y. plicata Hort.) 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch . . . . .	6	à 8 —
1 $\frac{1}{2}$ —1 » » . . . . .	15	Gr. à 1 15
Junge Pflanzen . . . . .	—	10
gloriosa L. 3 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen mit 2 Fuss Kronendurchmesser . . . . .	6	—
2 $\frac{1}{2}$ » » » » 1 $\frac{1}{2}$ » » . . . . .	3	—
Junge Pflanzen von 1 Fuss Höhe . . . . .	—	20
» var. purpurea Hort. In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen . . . . .	4	à 5 —
obliqua Haw. 3 Fuss hohe Prachtpflanzen und 2 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . .	8	—
2 » » » 2 » » . . . . .	4	—
quadricolor. Hort. (Y. Draconis fol. var. oder fol. tricoloribus und quadricoloribus.) Eine der schönsten und zugleich härtesten Schmuckpflanzen unter den buntblättrigen.		
1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen, 1 Fuss Kronendurchmesser . . . . .	30	—
3 $\frac{1}{4}$ —1 » » » . . . . .	15	—
Jüngere Pflanzen . . . . .	5, 7	à 12 —
Sämmtlich angemessen mit schönen Blättern garnirt.		
recurva Salisb. 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Pflanzen . . . . .	3	—
1 $\frac{1}{2}$ —1 » » » . . . . .	10	Gr. à — 25
rufo-cincta Haw. Schöne und seltene Varietät. 1 Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . .	10	—
stenophylla Steud. (Y. angustifolia Karw.) 1 Fuss hoch, 1 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{4}$ Fuss breit . . . . .	2	à 3 —
stricta Sims. 3—6 Zoll hoch . . . . .	1	—
tenuifolia Haw. 1 Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ Fuss breit . . . . .	6	—

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl 12 verschiedene Arten in jungen, hübschen Pflanzen für 8 Thlr.

## Succulente Pflanzen.

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
<i>Alöë ferox</i> Lam. . . . .	2	—	<i>Mesembrianthemum</i> croceum Jacq. . . . .	—	5
mitraeformis Salm-Dyck . . . . .	—	12	echinatum L. . . . .	—	5
pulchra Haw. . . . .	10	—	Ecklonis Salm-D. . . . .	—	6
umbellata D. C. var. picta. . . . .	10	Gr. à 1 —	lacerum Haw. . . . .	—	5
xanthacantha W. . . . .	—	15	Lehmannii Eck. . . . .	—	8
<i>Apicaria</i> coarctata Haw. . . . .	—	10	lupinum Haw. . . . .	—	10
fasciata Salm-D. . . . .	—	10	maximum Haw. . . . .	—	5
tesselata . . . . .	—	10	molle Ait. . . . .	—	10
tortuosa Haw. . . . .	—	10	multipunctatum S.-D. . . . .	—	6
turgida Haw. . . . .	—	8	muricatum Haw. . . . .	—	5
<i>Crassula</i> coccinea (Roechea versicol. D. C.)			nobile Haw. . . . .	—	10
vide pag. 30.			perfoliatum . . . . .	—	5
<i>Diostemon</i> Hookerit. . . . .	1	—	purpurascens S.-D. . . . .	—	5
<i>Drimis</i> lanceolata Gaubl. . . . .	—	15	rhomboideum S.-D. . . . .	—	6
marmorata Hort. . . . .	—	20	rigidaule Haw. . . . .	—	5
<i>Echeveria</i> campanulata . . . . .	—	20	scabiger S.-D. . . . .	—	5
secunda Booth. . . . .	—	6	scalpratum Haw. . . . .	—	6
<i>Mesembrianthemum</i> bidentatum Haw. . . . .	—	6	uncinatum Mill. . . . .	—	5
caninum Haw. . . . .	—	8	verruculatum L. . . . .	—	4



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Pachyphytum bracteosum</b> <i>Lk.</i> . . . . .	— 10	<b>Sedum carneum</b> fol. var. <i>H.</i> . . . . .	3
<b>Bochea falcata superba</b> ; junge, zum Theil		<b>Sieboldii</b> <i>Hort.</i> . . . . .	4
aber blühbare Pflanzen . . . . .	— 6	„ in medio aureo picta . . . . .	8
12 Stück . . . . .	2 —	<b>Sempervivum californicum</b> . . . . .	6
<b>falcata superba</b> ; starke blühbare Pflanz. . . . .	— 10		
12 Stück . . . . .	3 —	12 <i>Species nach unserer Wahl</i> 1 Thlr. 10 Gr.	

## Proteaceen.

Diejenigen, denen ein † vorsteht, müssen während des Winters im temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>GREWILLEA ROBUSTA</b> <i>Cunningh.</i> . . . .	2 —	<b>PROTEA MELLIFERA</b> <i>Thbg.</i> . . . .	1 —
<b>HAKEA CANALICULATA</b> . . . . .	— 15	† <b>RHOPALA R. Br.</b> , <i>Pohl.</i> (Ru- pala <i>Willd. Apr. Dietr.</i> ) . . . . .	—
» <b>EUCALYPTOIDES</b> . . . . .	— 15	† <b>AUSTRALIS</b> <i>Hort.</i> . . . . .	10 —
» <b>LEHMANNI</b> <i>Meissn.</i> . . . . .	— 15	† <b>CORCOVADENSIS</b> <i>Hort.</i> (Rh. Pohl. <i>Meissn.</i> ) . . . . .	1, 6 à 8 —
» <b>SPECIES</b> . . . . .	— 10	Prachtexempl. 10 F. hoch. . . . .	35 —
» <b>PINNATA</b> . . . . .	2 —	† <b>JONGHEI</b> <i>Hort. Jonghe.</i> Sehr stark . . . . .	— —
» <b>PUGIONIFORMIS</b> <i>Cav.</i> . . . . .	— 10	<b>LIBONIANA</b> . . . . .	8 —
» <b>SEMIPLANA</b> . . . . .	— 15	† <b>ORGANENSIS</b> <i>Gardn.</i> . . . .	10 —
» <b>STRICTA</b> . . . . .	— 10	† <b>PRINCEPS</b> <i>Lind.</i> . . . .	3 à 8 —
» <b>SUAVEOLENS</b> <i>R. Br.</i> . . . . .	— 10		
<b>LAMBERTIA FORMOSA</b> <i>Sm.</i> . . . .	1 —		
<b>LOMATIA BIDWILLI</b> . . . . .	2 —		

## AZALEA INDICA.

### a. Vorjährige Neuheiten.

Die Preise der I Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen, theils in halbstämmigen Kronenbäumchen, theils in buschigen Pflanzen.

Die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

	I.	II.
	Gr.	Gr.
204. <b>A. Borsig</b> ( <i>Mardner</i> ). Die schönste gefüllte reinweisse Azalea, welche existirt . . . . .	—	15
153. <b>Agnes Bernauer</b> ( <i>Schulz</i> ), das reinste Rosa mit entsprechender Zeichnung, von regelrechtem Bau und grosser Blume . . . . .	15	—
205. <b>Baron Hruby</b> ( <i>v. H.</i> ). Glänzend lila mit weissem Reflex, von gutem Bau . . . . .	—	15
154. <b>Brunhilde</b> ( <i>C. Sch.</i> ). Blasslila, violet schattirt, kräftige Zeichnung und schöner Bau . . . . .	—	10
155. <b>Charlotte von Schiller</b> ( <i>C. Sch.</i> ). Aeusserst zarte lila Grundfarbe mit dunkler Zeichnung. Ausgezeichneter Bau . . . . .	20	10
180. <b>Coloris nova</b> ( <i>Vervaine</i> ), die Blumen dieser neuen Varietät sind mittelgross, ziemlich gut gebaut, vom frischesten Purpurroth und leuchtend lila schattirt. Die Zeichnung ist sehr markirt, fast schwarz . . . . .	—	15
182. <b>Coquette de Gand</b> ( <i>Vervaine</i> ), grosse, halbgefüllte Blume mit lila-purpurrother Grundfarbe, die sich nach dem Rande zu, welcher ganz weiss ist, nach und nach heller verläuft. Ausserdem ist die ganze Blume dunkelroth punktiert und gestreift. . . . .	—	15
148. <b>Dominique Vervaine</b> ( <i>Verv.</i> ). Schöne gefüllte, hellorangerothe Blume von rundem Bau . . . . .	20	10
156. <b>Ernst Moritz Arndt</b> ( <i>Schulz</i> ), carmoisin in gesättigt zinnober übergehend mit schöner kräftiger carminrother Zeichnung: gross und von vollkommenem Bau . . . . .	25	10

	I. Gr.	II. Gr.
181. <b>Eugène Mazel</b> ( <i>Vervaine</i> ), Blumen sehr gross, von festem guten Bau, blutroth mit lila leicht verwaschen; die oberen Blumen dunkelpurpur mit blauen Flecken. Erhielt bei der Ausstellung zu Amsterdam den ersten Preis für neue Azaleen . . . . .	—	15
152. <b>Fascination</b> ( <i>Williams</i> ), Blumen von gutem Bau, halbgefüllt, hellfleischfarbig mit weissem Rande und röthlich schattirt. Die Zeichnung der oberen Blumenblätter ist sehr kräftig in rosa carmoisin . . . . .	—	20
179. <b>Frère Orban</b> ( <i>Maenhaut</i> ), ponceauroth mit kräftiger Zeichnung; Blume gross und von schönem Bau . . . . .	20	10
157. <b>Friedrich Barbarossa</b> ( <i>Schulz</i> ), Blume gefüllt und von bedeutender Grösse; hellzinnober in dunkelzinnober übergehend . . . . .	—	20
158. <b>Friedrich Schleiermacher</b> ( <i>Schulz</i> ), hellzinnober mit carmin schattirt, Blumen von vollkommenem Bau u. kräftiger Zeichnung . . . . .	25	—
183. <b>Gloire avant tout</b> ( <i>Vervaine</i> ), musterhafter Bau und desshalb in mehreren Ausstellungen gekrönt. Die Blumen sind zirkelrund, vom reinsten Schneeweiss und mit carminrothen breiten Streifen geziert . . . . .	—	20
168. <b>Gneisenau</b> ( <i>Schulz</i> ), Blumen brennend zinnober mit kräftiger Zeichnung und von sehr gutem Bau . . . . .	25	15
150. <b>Grande-Duchesse de Bade</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ), Blumen gross, feurig orange, fast voll und von elegantem Bau. Sehr reichhlühende schöne Varietät . . . . .	—	10
159. <b>Grossfürstin Helene</b> ( <i>Schulz</i> ), regelmässig und edelgeformte, an den Rändern wellenförmige Blume. Grundfarbe hellkirschroth in lichtrosa übergehend, mit kräftiger dunkelrother Zeichnung, höchst effectvoll! . . . . .	25	15
160. <b>Jean Paul</b> ( <i>Schulz</i> ), Blumen purpurn in dunkelbraun übergehend mit kräftiger Zeichnung; Blumenblätter am Rand leicht zurückgebogen . . . . .	25	15
162. <b>Kleist von Nollendorf</b> ( <i>C. Sch.</i> ), Brillant scharlach mit purpur schattirt und kräftiger Zeichnung. Gut gebaute, sehr effectvolle Blume . . . . .	—	15
161. <b>Klopstock</b> ( <i>Schulz</i> ), lachsrothe Grundfarbe mit tiefvioletter reicher Schattirung und Zeichnung; vollkommenster Bau! . . . . .	20	10
174. <b>La reine des Pays-bas</b> ( <i>Maenhaut</i> ), schöner Bau mit neuem Colorit; lilarosa mit sehr prononcirter rother Zeichnung und weissem Saume. Kräftige Varietät, welche bei der Ausstellung zu Amsterdam einen ersten Preis erhielt . . . . .	25	15
147. <b>Madame de Cannaert d'Hamale</b> ( <i>Vervaine</i> ), ausserordentlich grosse lilienförmige Blume, glänzend weiss und auf den oberen Blumenblättern hellgelb gefleckt . . . . .	—	15
148. <b>Mad. Dominique Vervaine</b> ( <i>Verv.</i> ), Fleischfarbigrosa mit purpur Streifen und weissem Rande . . . . .	20	10
212. <b>Margaretha Louise</b> ( <i>Maenh.</i> ), Blume gross, weiss, lackfarbig gestreift und geflammt . . . . .	—	15
163. <b>Max von Schenkendorf</b> ( <i>Schulz</i> ), carmoisinroth, dunkelviolet schillernd, mit kräftiger Zeichnung; vollkommenster Bau! . . . . .	25	15
164. <b>Mignon</b> ( <i>C. Sch.</i> ), Dunkelstes Scharlach mit kräftiger schwarzrother Zeichnung und gutem Bau. Die Petalen sind gewellt und leicht zurückgebogen . . . . .	20	10
177. <b>Princesse d'Espinay</b> ( <i>Maenhaut</i> ), sehr grosse gefüllte Blume, carminrosa mit rother Zeichnung und gutem Bau . . . . .	25	15
165. <b>Prinz Ferdinand v. Preussen</b> ( <i>C. Sch.</i> ), Feurigste blutrothe Färbung mit stark markirter, lackrother Zeichnung. Von ausgezeichnetem Bau . . . . .	—	15
166. <b>Rahel von Varnhagen</b> ( <i>Schulz</i> ), lebhaft dunkelrosa mit reicher		

	I.	II.
Zeichnung; die Blume ist gross, von gutem Bau u. am Rande ein wenig zurückgeschlagen . . . . .	Gr. 25	Gr. 15
206. <b>Romeo</b> ( <i>Fürst</i> ). Grosse Blume von dunkelvioletblauer Färbung . . . . .	—	15
207. <b>Rubra foliis marginatis</b> . Lachsfarbige Blumen mit lila Zeichnung. Die Blätter dieser Var. sind rein weiss marginirt . . . . .	—	15
171. <b>Souvenir de C. Backer</b> ( <i>Maenhaut</i> ), Blume gross u. halbgefüllt, lebhaft rosa mit schöner Zeichnung und gutem Bau . . . . .	20	10
170. <b>Souvenir de M. Donkelaar</b> ( <i>Maenhaut</i> ), Blumen mittelgross, gefüllt, ganz hellroth und von vorzüglichem Bau . . . . .	25	15
146. <b>Souvenir de van Peene</b> ( <i>Vervaine</i> ), Blumen sehr gross und von vorzüglichem Bau, hellroth in zart atlasrosa übergehend; mit grosser, kräftiger dunkelpurpurrother Zeichnung . . . . .	—	25
167. <b>Theodor Preusser</b> ( <i>Schulz</i> ), dunkelstes Violet, in schwarzbraun übergehend, mit schwarzrother Zeichnung und sammtartiger violetter Schattirung. Die dunkelste aller bekannten Azaleen; dabei sind die Blumen gross und von tadellosem Bau . . . . .	—	20
210. <b>Triumph von Mainz</b> ( <i>Mard.</i> ). Feuerig rosenroth, von musterhaftem Bau . . . . .	—	15
151. <b>Vesuvius</b> ( <i>Veitch</i> ), die Blumen dieser gut gebauten Sorte sind v. leuchtend orangerothem Colorit mit purpurrother Zeichnung . . . . .	—	15
169. <b>Wilhelm Tell</b> ( <i>Schulz</i> ), hellkupferroth mit carmin schattirt, markirter Zeichnung und vollkommenem Bau . . . . .	20	10

### b. Neuere und vorzügliche Sorten

von den bekanntesten Züchtern, unter andern auch von *C. Schulz*, dessen beste, in den letzten Jahren von ihm in den Handel gegebenen Sorten diese Abtheilung enthält.

*Wir liefern davon nach unserer Wahl:*

12 Stück in 12 Sorten für 3 Thlr. 15 Gr. und für 2 Thlr.

25 „ „ 25 „ „ 6 „ „ „ „ 4 „

50 „ „ „ 30—40 „ „ 10 „ „ „ „ 7 „

118. <b>Aennchen</b> ( <i>Schulz</i> ). Lebhaft kirschroth und von gutem Bau. Lässt sich leicht treiben: Frühsorte . . . . .	10	—
175. <b>Alba illustrata</b> ( <i>Klein</i> ). Rein weiss, zuweilen rosiglila gefleckt . . . . .	10	6
173. <b>Alba maculata</b> ( <i>Maenhaut</i> ) . . . . .	10	6
116. <b>Alba magnifica</b> ( <i>Schulz</i> ). Glänzend silberweiss, von gutem Bau und reichblühend . . . . .	8	—
1. <b>Alexander II.</b> ( <i>van Houtte</i> ). Weiss mit rosa carmoisin Bändern und Flecken, gelbe Zeichnung; reichblumig . . . . .	10	—
107. <b>Alexander von Humboldt</b> ( <i>Schulz</i> ). Lebhaft saturnroth mit kräftiger Zeichnung, die oberen Blätter mit bläulich. Anflug . . . . .	—	6
119. <b>Amalia Elisabeth Landgräfin von Hessen</b> ( <i>Schulz</i> ). Leuchtend violetroth mit kräftiger Zeichn. u. gedrungenem Bau . . . . .	15	—
142. <b>Amaranthina</b> ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	8	—
103. <b>Ambroise Verschaffelt</b> . . . . .	8	6
2. <b>Amoena Species</b> . . . . .	8	—
3. <b>Amoena grandiflora</b> ( <i>Stand.</i> ). Varietät m. grösseren Blumen . . . . .	8	—
4. <b>Amoena lateritia</b> ( <i>Stand.</i> ). Neue Hybride; ausgezeichnet! . . . . .	8	—
117. <b>Andreas Hofer</b> ( <i>Schulz</i> ). Dunkelscharlach mit bläulicher Schattirung, gleicher Zeichnung und gutem Bau . . . . .	10	—
115. <b>Atrosanguinea</b> ( <i>Schulz</i> ). Rhododendron-Hybride; dunkelblutroth mit schwarzrother Zeichnung. Die Blume ist langkelchig und von mittlerer Grösse . . . . .	—	8
81. <b>Baron de Prét</b> ( <i>v. H.</i> ). Lilaroth mit safranrother Zeichnung, Blume gross . . . . .	8	—
99. <b>Baron de Pycke</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	8	6



	I.	II.
	Gr.	Gr.
5. <b>Baron de Vrière</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	8	6
70. <b>Belle Gandoise</b> ( <i>Verv.</i> ). Blume gross, lilarosa, mit breitem weissem Saume und lebhaft rother Fahne . . . . .	10	—
46. <b>Bellissima albo marginata</b> ( <i>Bodd.</i> ). Sehr grosse, halbgefüllte Blume, Grund weiss, mit blassrosa verwaschen, Band rein weiss, Zeichnung lebhaft rosa . . . . .	12	—
6. <b>Blanc de Neige</b> ( <i>J. Versch.</i> ). Schneeweiss mit wenig carmoisinrothen Streifen, halbgefüllt . . . . .	10	6
79. <b>Brillant</b> ( <i>Scheuermann</i> ). Gesättigt tiefscharlach mit amaranthrother Zeichnung, grosse Blumen, von guter Form . . . . .	8	—
80. <b>Brillantina</b> ( <i>Verv.</i> ). Feurig purpurn mit amaranthroth, sehr gross, ausgezeichnet gebaut . . . . .	8	—
43. <b>Bouquet des roses</b> ( <i>Delmotte</i> ) = <i>Rosaeflora plena</i> ; rein rosa mit halbgefüllten Blumen; prächtig! . . . . .	8	—
125. <b>Carl Schulz</b> ( <i>C. Petzold</i> ). Blume gross, von gutem Bau, vom schönsten zinnoberscharlach, alle Blumenblätter weissbe-franzt; sehr reichblühend. . . . .	—	8
121. <b>Caroline Weisshaupt</b> ( <i>Schulz</i> ). Grundfarbe weiss, mit einzelnen rothen Punkten u. sehr kräftiger, grosser scharlachrother Zeichnung. Grosse gutgebaute Blume. Frühsorte von <i>Az. vittata</i> . . . . .	12	—
172. <b>Charles van Eeckhaute</b> ( <i>van Houtte</i> ). Höchst reichlich blühende Sorte, orangeroth mit amaranthroth violetter Zeichnung . . . . .	12	8
45. <b>Charles Enke</b> ( <i>A. V.</i> ). Blassrosa mit weissen Rändern und violet gestreift . . . . .	8	—
127. <b>Clärchen</b> ( <i>Schulz</i> ). Blume weiss, durch kräftig markirte grüne Zeichnung sich auszeichnende Sorte. Blumenblätter am Rande zurückgeschlagen . . . . .	15	—
7. <b>Clementine Vervaine</b> ( <i>Verv.</i> ). Rein weiss, carmoisin gestreift, mittelgross, gut geformt . . . . .	8	—
101. <b>Commerzienrath Rost</b> ( <i>C. Petz.</i> ). Schöngeformte Blume, feurig rosa, von guter Zeichnung, leichtblühend . . . . .	—	8
8. <b>Comte de Haynaut</b> ( <i>Verv.</i> ). Gefüllte Blume von gutem Bau, dunkelfleischfarben . . . . .	—	6
54. <b>Corvecta</b> ( <i>Mrdn.</i> ). Orangerosa, grosse safrangelbe Zeichnung . . . . .	8	—
47. <b>Crispata elegans</b> ( <i>Bodd.</i> ). Sehr grosse Blume mit wellenförmig gefransten Rändern . . . . .	10	6
83. <b>Criterion</b> ( <i>Ivery</i> ). Lachsfarbenrosa mit weissem Saum, gut geformt. . . . .	6	—
128. <b>Cuprea plena</b> ( <i>Schulz</i> ). Dunkelkupferfarbig mit tiefbrauner Zeichnung, gefüllt und von vollkommen rundem Bau . . . . .	10	—
123. <b>Cyclop</b> ( <i>Liebig</i> ). Zinnober mit dunkler Zeichnung; grossblumig . . . . .	10	6
112. <b>Diana</b> ( <i>Schulz</i> ). Zart mennigroth, sehr gross u. von edlem Bau . . . . .	10	6
129. <b>Dianthiflora</b> ( <i>Schulz</i> ). Varietät von <i>Az. vittata</i> . Aehnelt in der Färbung der <i>A. Beauté de l'Europe</i> , nur tritt das Violette darin mehr hervor; mittelgross und regelmässig gebaut. Frühsorte. . . . .	—	6
84. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>F. Sp.</i> ). Zart rosa in weiss übergehend; reichblumig . . . . .	8	—
48. <b>Director Augustin</b> ( <i>Rinz</i> ). Dunkelroth mit fast schwarzer Zeichnung . . . . .	10	6
9. <b>Distinction</b> ( <i>Ivery</i> ). Lebhaft lachsroth mit weissem Rande, oben dunkel gefleckt. . . . .	8	—
10. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> ( <i>Mard.</i> ). Grosse Blume, wellenförmig, lebhaft carmoisinrosa . . . . .	—	8
12. <b>Duc de Brabant</b> ( <i>van Loo</i> ). Blume gross, fast voll, fleischfarbigrosa; sehr frisch. . . . .	10	6
11. <b>Duc de Malakoff</b> ( <i>Bodd.</i> ). Brillantroth, Blumenbl. gewimpert . . . . .	10	6

	I.	II.
60. <b>Emilie Jauner-Krall</b> ( <i>Liebig</i> ). Carmin mit bläulichem Anflug und carminrother Zeichnung; rund- und grossblumig. . . . .	Gr. 10	Gr. 6
51. <b>Erbprinz Ludwig</b> ( <i>Mard.</i> ). Dunkellila gefüllt . . . . .	10	—
15. <b>Etendart de Flandre</b> ( <i>Verv.</i> ). . . . .	10	6
14. <b>Etoile de Gand</b> ( <i>Spae.</i> ). Gutgebaute Blume m. breiten weissen Petalen, jede mit einem rosa Mittelstreifen . . . . .	10	6
13. <b>Eulalia van Geert à feuilles panachées</b> ( <i>J. V.</i> ). Varietät mit schön weiss panachirten Blättern . . . . .	8	—
59. <b>Fidelio</b> ( <i>Liebig</i> ). Orange zinnober m. prachtvoll dunkler Zeichnung, gut geformt, gross . . . . .	8	—
105. <b>Freund Brechtel</b> ( <i>C. Schulz</i> ). Blassrosa m. bläulicher Schattirung, starker Zeichnung, von enormer Grösse und vortreflichem Bau . . . . .	12	8
130. <b>Friedrich der Grosse</b> ( <i>Schulz</i> ). Blume leuchtend rothbraun, gut gefüllt, u. grösser als alle bisher bekannten Sorten. Ausserdem ist diese schöne Neuheit von markirter Zeichnung u. stahlblauer Schattirung . . . . .	—	10
102. <b>Friedrich von Schiller</b> ( <i>Schulz</i> ). Feurig purpurcarmin, nach dem Rande carmoisin mit blutrother Schattirung und kräftiger Zeichnung. Blumen gross und von runder, geschlossener Form . . . . .	10	6
113. <b>Fritz Neumann</b> ( <i>Schulz</i> ). Reinstes Dunkelrosa, nach den Rändern zu blässer; mit sehr markirter Zeichnung . . . . .	8	—
85. <b>General Tottleben</b> ( <i>de Witt</i> ). . . . .	8	—
18. <b>Gloire de Ledeborg</b> ( <i>Verv.</i> ). Rosigpurpurn, gefüllte Blume . . . . .	8	—
17. <b>Glory of Sunninghill</b> . Lebhaft rosa und stark gefüllt . . . . .	—	6
16. <b>Goethe</b> ( <i>Liebig</i> ). Gross, weiss, oft rosa gefleckt . . . . .	8	—
42. <b>Grenwillii</b> . Dunkelcarmoisin, colossale Blume . . . . .	—	8
61. <b>Gretchen</b> ( <i>Lieb.</i> ). Leucht. carm. m. brillant. schwarz. Zeichn. . . . .	—	6
91. <b>Harry Veitch</b> ( <i>Schulz</i> ). Hellincarnat m. zarter Zeichnung von untadelhaftem Bau; grossblumig . . . . .	10	—
122. <b>Heinr. Siessmeyer</b> ( <i>Schulz</i> ). Hellzinnober mit bläulicher Schattirung, starkgefüllte Blume m. Wellenrand . . . . .	—	8
53. <b>Hélène Théléman</b> ( <i>Mard.</i> ). Pfirsichblüthrosa, gefüllt und reichblühend . . . . .	8	—
44. <b>Hercules</b> ( <i>Verv.</i> ). Sehr grosse purpurrothe Blume mit breiter dunkler Zeichnung . . . . .	10	—
50. <b>Hermine</b> ( <i>v. H.</i> ). Gutgef. Blume, rein weiss, carmin gebändert . . . . .	—	6
56. <b>Herzogin Adelheide von Nassau</b> ( <i>Mrdn.</i> ). Gross, dunkelrothviolet schattirt; halbgefüllt . . . . .	8	—
69. <b>Hortense Vervaene</b> ( <i>Verv.</i> ). Grosse, gutgebaute Blume, rosacarmin geflammt, mit Weissm Rande . . . . .	8	—
98. <b>Jacques von Artevelde</b> ( <i>A. Ver.</i> ). Blume sehr gross, halb gefüllt, glänzend rosa mit carmoisin gestreift . . . . .	—	6
94. <b>Imperialis</b> ( <i>Veitch.</i> ). Lebhaft dunkelrosa, Blume cirkelrund, reichblühend . . . . .	—	6
145. <b>Indica foliis aureis variegatis</b> . Lebh. gelb panach. Belaub. . . . .	10	6
108. <b>Johanna Arndt</b> ( <i>C. Schulz</i> ). Rein weiss mit hellgrüner Zeichnung und sehr regelmässigem Bau, auffallender Grösse, stark gefüllt, einer Camellia ähnlich . . . . .	12	—
106. <b>Leonore</b> ( <i>C. Schulz</i> ). Dunkellila mit schöner Zeichnung und rother Schattirung; halbgefüllt, Bau vollkommen . . . . .	15	—
21. <b>Leopold I.</b> ( <i>C. v. Low</i> ). Sehr grosse Blume, prächtig rosa mit feurig rother Zeichnung; Mitte gefüllt . . . . .	8	—
93. <b>Lion des Flandres</b> ( <i>Veitch.</i> ). Lachsroth m. starker u. schöner Zeichnung, schönem Bau u. von enormer Grösse . . . . .	12	8
126. <b>L. L. Liebig</b> ( <i>C. Petz.</i> ). Carmoisin mit dunkler Zeichnung, enorm gross, gut gebaut, sehr reichblühend . . . . .	8	—

	I.	II.
	Gr.	Gr.
87. <b>Louise Margottin</b> ( <i>Marg.</i> ). Glänzend weiss, gut geformt, mit carmoisinroth. Zeichnung, am Rande gekräuselt, z. Frühlreiben . . . . .	8	—
141. <b>Lützow</b> ( <i>Schulz</i> ). Zinnober mit bläulichem Anflug u. sehr auffallender Zeichnung, guter Bau mit gewelltem Rande . . . . .	10	—
132. <b>Mainblume</b> ( <i>Schulz</i> ). Grund gelblichweiss, sämmtl. Blumenblätter nelkenartig punktirt u. gestrichelt, die Zeichnung markirt. Blumen ansehnlich gross . . . . .	—	10
55. <b>Mad. Verschaffelt</b> ( <i>A. V.</i> ). Rosa, dunkel geädert, m. weisser Einfassung u. sehr schön carmoisinrother Zeichnung, am Rande gekräuselt . . . . .	10	—
24. <b>Mad. Lagalliserie</b> ( <i>Marg.</i> ). Gross, von guter Form, lebhaft rosenroth . . . . .	—	6
23. <b>Marie Vervaene</b> ( <i>Verv.</i> ). Sehr gross, von guter Form, wellenförmig, weiss m. lachsgelbem Grunde oft rosa und carmin leicht panachirt . . . . .	8	—
88. <b>Maximilian I.</b> ( <i>van H.</i> ). Gutgefüllte Blumen; dreifarbig, zart rosa mit weissem Rande und carminrother schöner Zeichnung . . . . .	10	—
111. <b>Mercur</b> ( <i>Schulz</i> ). Prächtig lila mit eigenthümlichem Metallglanz und äusserst kräftiger Zeichnung . . . . .	10	—
66. <b>Minerva</b> ( <i>Verv.</i> ). Blume mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne und bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig . . . . .	—	8
22. <b>Modèle</b> ( <i>Miellez</i> ). Die schönste Varietät in rosa. Bau musterh. . . . .	10	6
131. <b>Monarch</b> . . . . .	10	6
25. <b>Narcissiflora plena</b> . . . . .	—	6
133. <b>Nymphe</b> ( <i>Schulz</i> ). Weissgrundig mit gelber Schattirung und Zeichnung und roth gestreift; sehr regelmässiger Bau, halb gefüllt. Frühsorte, Hybride von <i>Az. vittata</i> . . . . .	10	—
26. <b>Obusa Species</b> . . . . .	—	6
134. <b>Otilie</b> ( <i>C. Sch.</i> ). Weiss mit reicher granatrother Panachirung u. gelbgrüner starker Zeichnung; guter Bau. Frühblüh. Sorte . . . . .	12	8
27. <b>Pauline Mardner</b> ( <i>M.</i> ). Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa mit schöner Zeichnung . . . . .	—	8
28. <b>Pelargoniflora nova</b> ( <i>J. V.</i> ) . . . . .	—	6
135. <b>Pfingströschchen</b> ( <i>C. Sch.</i> ). Leuchtend carminroth mit kräftiger Zeichnung; Blumen mittelgross; frühblühende Sorte . . . . .	10	—
109. <b>Philippine Welser</b> ( <i>Schulz</i> ). Die zarte lichtrosa Grundfarbe ist mit rothen Streifen durchlaufen; die dunkelrothe, stark hervortretende Zeichnung verleiht der Blume ein äusserst brillantes Aussehen . . . . .	12	—
94. <b>Président Humann</b> ( <i>J. Versch.</i> ). Blume von ausserordentlicher Grösse und gutem Bau. Blumenblätter wellenförmig, schön rosa mit carmoisin Zeichnung . . . . .	10	6
30. <b>Prince Impérial</b> ( <i>J. V.</i> ). Gross, von gutem Bau, lilarosa mit carmoisinrother Zeichnung . . . . .	10	6
29. <b>Prinz Franz Joseph</b> ( <i>Mard.</i> ). Salmroth mit dunkler Zeichn. . . . .	—	6
52. <b>Professor Dr. Koch</b> ( <i>Mard.</i> ). Aehnlich der <i>Az. Roi des doubles</i> , ebenso gefüllt; nur dunkler von Colorit . . . . .	8	—
178. <b>Punctulata</b> ( <i>van Houtte</i> ). Rahmweiss und kirschroth gefleckt, gestreift und geflammt; sehr bunt . . . . .	—	10
124. <b>Recurvata</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) . . . . .	—	6
72. <b>Reine des beautés</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Blume gross, halb gefüllt, von guter Form, lachsfarbenrosa mit breitem weissen Rande und dunkelcarmoisin Flecken . . . . .	10	6
65. <b>Reine des Blanches</b> ( <i>Verv.</i> ). Sehr grosse, gut gebaute Blume, rein weiss m. grosser gelber Fahne, Blumenblätter gut gerundet . . . . .	10	—
31. <b>Reine des Doubles</b> ( <i>J. V.</i> ). Sehr grosse halb gefüllte Blume . . . . .		



	I.	II.
Gr.	Gr.	Gr.
von gutem runden Bau, schön lebhaft rosa, die oberen Blumenblätter carmin gefleckt; brillante Farbe . . . . .	—	6
63. <b>Reine des Roses</b> ( <i>Verv.</i> ). Ausserordentl. grosse Blume, schön lilarosa, mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen . .	8	—
86. <b>Roi des Beautés</b> ( <i>Verv.</i> ). Schöne Rosenform, gut gefüllt, lebhaft rosa mit violetem Anhauch und weissem Saum; kräftige rothe Zeichnung . . . . .	8	—
49. <b>Roi des Blancs</b> ( <i>Verv.</i> ). Grossblumig, gut gebaut, glänzend weiss, leicht und reichblühend . . . . .	8	—
32. <b>Roi Léopold</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ). Musterform, orange mit gefüllter amaranthrother Fahne . . . . .	—	6
33. <b>Rubens</b> ( <i>Vervaene</i> ). Sehr grosse, lebhaft hellrothe Blume . . .	—	6
34. <b>Rubra plena</b> . Lebhaft kupferfarben; sehr gefällt . . . . .	—	6
97. <b>Sannchen</b> ( <i>Schulz</i> ). Milchweisse Grundfarbe mit kirschrothen Strichen u. Punkten, die von oben nach unten verlaufen u. der Blume eine eigenthümliche Färbung geben. Frühblüh. Sorte . . .	—	8
92. <b>Scharnhorst</b> ( <i>C. Schulz</i> ). Dunkelstes kirschroth mit kräftiger Zeichnung und von gutem Bau . . . . .	—	8
136. <b>Schneeglöckchen</b> ( <i>Schulz</i> ). Reinstes Schneeweiss, ohne alle Schattirung u. Zeichnung; von untadelhaftem Bau; kleinblumig . .	8	—
143. <b>Schöne Mainzerin</b> ( <i>Mard.</i> ). Rosa mit rothen Streifen und weissem Saume; kräftige Zeichnung . . . . .	—	6
75. <b>Secrétaire Clauss</b> ( <i>J. V.</i> ). Hübsche Varietät mit grossen Blumen, weiss mit zart lila verwaschen . . . . .	8	—
36. <b>Semi-duplex maculata</b> ( <i>Smith</i> ). Blume gross, halb gefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Zeichnung . . . . .	8	6
176. <b>Striata formosissima</b> ( <i>Mard.</i> ). . . . .	—	8
73. <b>Souvenir du Prince Albert</b> ( <i>J. V.</i> ). Varietät erster Classe, die auf mehreren Ausstellungen prämiirt wurde, und überall grossen Beifall geerntet hat. Die Blumen sind über mittlere Grösse, von gutem Bau, halb gefüllt, wellenförmig, vom schönsten rosa und nach dem Rande rein weiss; ausserdem carmin schattirt . . . . .	—	10
35. <b>Souvenir de l'Exposition</b> ( <i>M.</i> ). Lilarosa m. weissem Rande . . .	—	6
90. » <b>de Mieliez</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Habitus d. Azalea Roi Léopold, aber von einer stärkeren orange Färbung; ungemein effectvoll . . . . .	8	—
38. <b>The Bride</b> ( <i>Henders.</i> ). Rein weiss mit hübsch hervortretenden Staubfäden . . . . .	8	—
37. <b>Theresia</b> ( <i>Liebig</i> ). Orange, gut gebaut, reichblühend . . . . .	—	6
39. <b>Thusnelda</b> ( <i>Mard.</i> ). Lila mit amaranthem Schein . . . . .	8	6
64. <b>Triomphe de Ledeborg</b> ( <i>Verv.</i> ). Musterform, grosse Blume, lachsfarbig und ziegelrother Fahne . . . . .	8	6
62. <b>Triumph von Hanau</b> ( <i>Schulz</i> ). Besser als Az. Herzog von Nassau und Antoinette Théléman . . . . .	10	—
137. <b>Tubiflora striata</b> ( <i>Schulz</i> ). Weissgrundig m. einzelnen rothen Streifen . . . . .	8	—
144. <b>Variegata superba</b> ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	8	—
104. <b>Venus</b> ( <i>Schulz</i> ). Reinstes Weiss, effectvolle Blume, vortrefflicher Bau; gross, leichtblühend . . . . .	12	—
41. <b>Venus Amathusia</b> ( <i>Scheidecker</i> ). Leuchtend dunkelviolet m. schöner Zeichnung . . . . .	8	6
140. <b>Vesuv</b> ( <i>Schulz</i> ). Feurigstes Blutroth m. bläulicher Schattirung; kräftige Zeichnung, gefälliger Bau . . . . .	—	8
77. <b>Vicomte de Forceville</b> ( <i>J. V.</i> ). Blume gross, halb gefüllt, gut gebaut, die inneren Blumenblätter gefranst und von prächtig dunkelpurpurrothem Colorit . . . . .	—	10

	I.	II.
95. <b>Virginalis</b> ( <i>Veitch.</i> ). Schönstes Weiss, gutgebaute Blume mit wellenförmigem Rande . . . . .	Gr. 12	Gr. 8
40. <b>Vittata rosea punctata</b> . . . . .	8	—
96. <b>Vittata rosea crispiflora</b> ( <i>Schulz.</i> ). Weiss, stark punktirt und gestreift, Blume mittlerer Grösse, am Rande wellenförmig gekräuselt. Frühblühende Sorte . . . . .	10	—
110. <b>Vittata rosea flore pleno</b> ( <i>Schulz.</i> ). Aehnliche Färbung der Az. vittata rosea nur mit vollkommen gefüllter Blume . . . . .	10	—
138. <b>Vittata rosea superba</b> ( <i>Schulz.</i> ). Prachtvolle Zeichnung und bedeutende Grösse der Blumen . . . . .	—	8
71. <b>Waxwork</b> ( <i>Bull.</i> ). Rein weisse, ungewöhnl. substantiöse wachsähnliche Blumenblätter, mit purpurrothen Streifen und Flecken . . . . .	—	8
100. <b>Wilhelm Neubert</b> ( <i>Petz.</i> ). Carmoisinroth, dicht gefüllt, mit schöner glänzender grüner Belaubung; sehr kräftiges Wachstum . . . . .	8	—
76. <b>William Bull</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Sehr grosse halb gefüllte Blume m. breiten Petalen, lebhaft rosa m. violetcarmin nancirten Flecken . . . . .	—	6

## CAMELLIA.

### a. Neue und neuere Sorten, sowie Auswahl der besten älteren. Collection d'Élite.

Die Camellien, welche wir liefern, sind sämmtlich völlig gesunde, gutbewurzelte Pflanzen. Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2—3jährige Pflanzen von mindestens einem Fuß Höhe, die der II. Linie auf junge Herbstveredelungen von kräftigem Wuchse. Das große Sortiment, welches wir hier darbieten, enthält eine bedeutende Anzahl neuer Sorten ersten Ranges, welche sich noch in keiner andern Collection befinden.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2—3 ans et d'une hauteur d'un pied au moins; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne. Tous les Camellia's que nous fournissons, sont des plantes vigoureuses, bien pourvues de racines et parfaitement saines. Les prix sont côtés en Gros (Groschen).

1. <b>Abbate Branzoni</b> ( <i>Italien</i> ). Dunkelkirschroth, von schönem imbriquirtem Bau . . . . .	12	6
2. <b>Adele Puccioni</b> ( <i>Italien</i> ). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten . . . . .	10	—
6. <b>Alba grandiflora</b> . Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt . . . . .	—	6
8. <b>Alexina</b> ( <i>Low.</i> ) Weiss mit carmin geflammt und bespritzt . . . . .	—	6
10. <b>Amalie Servi</b> . Imbriquirte form, zart rosa mit einigen weissen Streifen . . . . .	12	6
12. <b>Andrea Doria</b> ( <i>Faragiana</i> ). Mittelgrosse Blume, vollkommen imbriquirt, dunkelroth mit weissen Streifen . . . . .	12	6
13. <b>Angelo Landi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	—	6
14. <b>Annette Franchetti</b> ( <i>Miellez</i> ). Carminlila, mit weissen Streifen, gut imbriquirt . . . . .	12	6
11. <b>Antonietta Lomellini</b> . Ranunkelform, gut imbriquirt. Die rosafarbenen Petalen sind fast ganz mit weissen Flammen bedeckt, wodurch sie ein federartiges Ansehen erhalten . . . . .	12	6

	I.	II.
	Gr.	Gr.
419. <b>Apicaeformis</b> ( <i>W. Bull.</i> ). Mit fischschwanzähnlichen Blättern	30	15
425. <b>Archiduc Etienne</b> ( <i>A. Verschaft.</i> ) Rosig fleischfarben, eine Sorte von vorzüglichem Bau. Neu! . . . . .	—	20
16. <b>Archiduchessa Augusta</b> ( <i>Gaetano di Corsi</i> ). Dunkelkirsch- roth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in Bläulichlila . . . . .	12	6
17. <b>Archiduchesse Marie</b> ( <i>van H.</i> ). Schöne Ranunkelform, stark gefüllt, lebhaft roth mit weissen Bändern . . . . .	12	6
18. <b>Archiduco Carlo</b> . Lebhaft carmin, weiss bandirt, Blume gross und regelmässig . . . . .	—	8
19. <b>Archiduco Giovanni</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) Blume sehr gross, vollkommen imbriquirt, die äusseren Blumenblätter dunkel- scharlach, mit weissen Streifen, der innere Theil der Blume brillant rosa und weiss bandirt. . . . .	—	8
20. <b>Armida nova</b> ( <i>Borg.</i> ) Aeussere Blumenblätter weiss, die in- neren lebhaft rosa belegt, alle leicht carmin gestreift. Voll- kommene Imbrication . . . . .	—	8
22. <b>Attila Cavalli</b> ( <i>Italien</i> ). . . . .	15	—
21. <b>Auguste Delfosse</b> ( <i>Defresne</i> ). Ranunkelform von vollkom- mener Symmetrie, feurig aurorarosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenblätter . . . . .	12	6
3. <b>Avvocato Saleri</b> ( <i>Madoni</i> ). Blume sehr gross, mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa carmin, imbriquirter Bau; Mitte der Blume rein weiss, die äusseren Petalen weiss gestreift	10	6
4. <b>Avvocato Santini</b> ( <i>Italien</i> ). Imbriquirt, kirschroth mit orange Reflex und weiss bandirt . . . . .	12	6
35. <b>Babylonica</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
34. <b>Baronne d'Udekem</b> ( <i>Makoy</i> ). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streifen . . . . .	—	6
41. <b>Beauty of Hornsey</b> ( <i>Engl.</i> ) Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift . . . . .	12	6
28. <b>Belardi vera</b> ( <i>Belard</i> ) . . . . .	—	6
29. <b>Bella Bresciana</b> ( <i>Lecchi</i> ). Weiss und lebhaft rosa gefleckt, gross; Blume von vollkommener Imbrication . . . . .	—	6
33. <b>Bella d'Ardiglione</b> , Blume mit starken, wachsähnlichen Blät- tern, pyramidal imbriquirt, die äusseren Blumenblätter hellkirsch- roth, die anderen bis ins Centrum rosig lila . . . . .	15	8
31. <b>Bella della Scoglietto</b> ( <i>Rosazza</i> ). Rosa und weiss gestreift, sehr schön und vollkommen imbriquirt . . . . .	—	8
32. <b>Bella d'Etruria</b> . Sehr grosse imbriquirte Blume, lebhaft rosig carmin und rein weiss gestreift . . . . .	12	6
25. <b>Bella di Firenze</b> ( <i>Franchetti</i> ). Geadertes Rosa, durchaus mit weissem Saum . . . . .	10	6
23. <b>Bella di Pergo</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
27. <b>Bella di Pisa</b> . Imbriquirter Bau, rosa mit weissen Flecken und Strichen . . . . .	10	6
413. <b>Bella Romana</b> . Regelmässig gebaute Blume mit grossen runden Petalen, Grundfarbe durch lebhaft carmoisinrothe Panachirung ge- ziert . . . . .	20	12
26. <b>Belle Jeannette</b> . Grosse, gut imbriquirte Blume, fleischfarben rosa, weiss gefleckt und gestreift . . . . .	—	6
40. <b>Belliformis nivea</b> . Weiss, Blumenblätter ganz rund, höchst regelmässig imbriquirt . . . . .	—	6
38. <b>Bianca Geraldini</b> ( <i>Geraldini</i> ). Besonders grosse Blume von schönstem Bau, mit breiten runden Blumenblättern, weiss . . . . .	15	8
36. <b>Bice Rosazza</b> ( <i>Rosazza</i> ). Sehr gefüllte Blumen von vollkomme- ner Imbrication, rein weiss, carmin gefleckt . . . . .	10	6



	I.	II.
	Gr.	Gr.
407. <b>Bicolor de la reine.</b> Grund weiss mit rosa Anflug und dunkel-rosa Nervatur. Herrliche Varietät der <i>Camellia de la reine</i> ( <i>J. Varenbergh</i> ) . . . . .	12	6
43. <b>Bijou di Firenze.</b> Die äusseren Blumenblätter lebhaft roth, die mittleren rosa mit rein weissen Streifen; vollkommene Imbrication . . . . .	15	8
417. <b>Bonomiana</b> ( <i>Sangalli</i> ). Regelmässig imbriquirte Blume mit grossen runden Petalen. Grundfarbe rein weiss mit scharfgezeichneten ponceaurothen Bandstreifen . . . . .	—	10
42. <b>Bradamante</b> ( <i>Brozzone</i> ) . . . . .	15	8
44. <b>Brozzoni nova</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .	—	15
326. <b>Buff.</b> Rahmweiss, gute Blume . . . . .	12	6
36. <b>Byroni</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	10
63. <b>Camilla Galli.</b> Sehr grosse, gut gefüllte, vollkommen imbriquirte Blume. Die Blumen sind oft zur Hälfte roth. zur andern Hälfte weiss . . . . .	—	6
57. <b>Camilla Herbert</b> ( <i>Brozzone</i> ). Blume gross, imbriquirt, weiss, Mitte strohgelb . . . . .	—	6
59. <b>Camillo Brozzone</b> ( <i>Broz.</i> ). Schöne imbriquirte Blume, die äusseren Blumenblätter kirschroth, die mittleren weiss . . . . .	12	6
55. <b>Candida Borghese nova</b> . . . . .	—	6
52. <b>Candidissima.</b> Imbriquirt, rein weiss . . . . .	10	6
51. <b>Candor</b> ( <i>Herbert</i> ). Vollkommene, regelmässigste Imbrication, von schönstem Weiss, dann und wann mit zartem rosa Anflug . . . . .	12	6
48. <b>Capellano Giovanni.</b> Lebhaft roth mit dunkleren Adern, sehr grosse Blume von imbriquirtem Bau . . . . .	12	6
49. <b>Caprice de la Reine.</b> Grosse, prächtige, becherförmige Blume, rosa mit weissem Rande . . . . .	—	6
50. <b>Carbonara.</b> Glühend dunkelroth, volle, runde Pomponform, wie <i>C. Lowii</i> . . . . .	12	6
65. <b>Cardinal Antonelli.</b> Lebhaft rosa, sehr grosse Blume, imbriquirt. Prächtig! . . . . .	—	8
72. <b>Carlotta Grisi</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .	15	8
73. <b>Carlotta Meucci.</b> Imbriquirter Bau, feurig roth . . . . .	15	10
71. <b>Carlotta Nencini.</b> Hellrosa, dichtgefüllte Blume ersten Ranges . . . . .	12	8
54. <b>Carlotta Pelosi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	8
56. <b>Carolina Franzini</b> ( <i>Miellez</i> ). Lebhaft korallenroth, zuweilen weiss gefleckt. Gut imbriquirt . . . . .	20	10
64. <b>Carolina Masso.</b> Blume gross, vollkommen imbriquirt, zartrosa, Mitte dunkler mit gelblichen Streifen . . . . .	15	10
45. <b>Caroline de Montel.</b> Grosse ranunkelförmige Blume, atlasrosa, weiss bandirt, Mitte weiss gestreift . . . . .	—	6
46. <b>Carswelliana.</b> Hellcarmin mit weislichen Streifen . . . . .	15	8
53. <b>Castagnola.</b> Imbriquirt, durchsichtig rosa und breit weiss bandirt . . . . .	10	6
58. <b>Catharina Longhi.</b> Dunkelcarmin, grosse, gutgebaute Blume . . . . .	12	8
60. <b>Celestina Pankratjeff</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	20	10
66. <b>Centifolia alba.</b> Grosse Blume, Rosenform . . . . .	—	6
67. <b>Centifolia rosea.</b> Zart rosa, Rosenform von schönem Bau . . . . .	12	6
61. <b>Cesare Franchetti</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	8
68. <b>Cimarosa</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .	15	8
70. <b>Circe</b> . . . . .	—	6
74. <b>Clementina Magnani.</b> Hellrosa mit weissem Saum, roth gestreift und gut imbriquirt . . . . .	15	8
95. <b>Clio</b> ( <i>Icon. des Cam.</i> ). Carminrosa, vollkommen imbriquirt, sehr grosse Blume . . . . .	—	8
98. <b>Coelestina vera.</b> Blassrosa, von gutem Bau . . . . .	12	6
101. <b>Colombo.</b> Schön blassrosa, gut imbriquirt . . . . .	15	8
96. <b>Colomba alba.</b> Rein weiss, gut gebaut ( <i>Weisse Taube</i> ) . . . . .	—	8

	I. Gr.	II. Gr.
100. <b>Colonello Quintini</b> ( <i>Italien</i> ). Brillant rosa, mit dunkler Nervatur, in der Mitte blasser, Blume von regelmässigstem Bau. . . . .	—	8
94. <b>Commensa</b> (= <i>Reine des fleurs</i> ). Symmetrisch imbrquirter Bau, zinnoberroth, zuweilen weiss bespritzt . . . . .	15	8
103. <b>Composita alba</b> . Prächtig rein weiss, eine der schönsten . . . . .	15	6
80. <b>Comte Boutourlin</b> ( <i>Luzatti</i> ). Brillant carmin, von gutem Bau . . . . .	12	6
77. <b>Comte de Gomer</b> ( <i>Lecchi</i> ). Dichter, imbrquirter Bau, zart rosa mit carmoisin gestreift . . . . .	12	8
404. <b>Comte de Toll</b> ( <i>A. V.</i> ). Zart fleischfarben rosa, mit einem weissen Mittelstreifen auf jedem Petalum, Blume von regelmässigstem, imbrquirten Bau . . . . .	20	12
76. <b>Conte Alessandro Komar</b> . Grosse, sternförmig imbrquirte Blume, lebhaft rosa mit zinnoberrosa Reflex und feinen weissen Streifen . . . . .	15	8
78. <b>Conte Maggi</b> . Schöne Belaubung. Dunkelrosa, zuweilen weiss bandirt. Die in der Mitte erhabene Blume ist sehr gut imbrquirt . . . . .	—	8
79. <b>Contessa Antonietta del Castelbianca</b> ( <i>Icon. des Cam.</i> ). Schön rosa, weiss gestreift . . . . .	15	8
81. <b>Contessa Clelia Malegari</b> , vide Mattutina.		
84. <b>Contessa de Maglian</b> . Lebhaft roth, im Centrum heller, gut imbrquirt . . . . .	—	8
82. <b>Contessa Lavinia Maggi</b> ( <i>Conte O. Maggi</i> ). Grosse Blume, Grund rein weiss, kirschroth gestreift und gebändert. Sehr guter Bau . . . . .	—	10
86. <b>Contessa Marietta</b> ( <i>Ugo Foscolo</i> ). Brillant rosa, gut imbrquirt . . . . .	12	6
85. <b>Contessa Mariana</b> . Reinstes zartrosa, Petalen consistent und imbrquirt . . . . .	12	6
83. <b>Contessa Massiani</b> . Weiss, rosa gefleckt und gestrichelt, Grosse, gut imbrquirte Blume . . . . .	—	6
87. <b>Contessa Natalia di Medici-Spada</b> . Lebhaft rosa, mit weiss gestrichelt, gut imbrquirt . . . . .	15	8
88. <b>Contessa Ottolini</b> ( <i>Franchetti</i> ). Lebhaft rosa, weiss gestreift, sehr gut imbrquirt . . . . .	15	8
90. <b>Contessa Paolina Guicciardina</b> . Grosse, gut imbrquirte Blume, Blumenblätter weiss, zart incarnat rosa angehaucht. . . . .	—	10
296. <b>Contessa Paolina Maggi</b> ( <i>Conte O. Maggi</i> ). Musterimbrication, durchsichtig wachsweiss, bringt zuweilen auch rosa Blumen . . . . .	12	6
426. <b>Contessa Pasolini</b> ( <i>Antonelli</i> ). Von eigenthümlichem röthlich-rosa Colorit, nach dem Saume zu fast weiss. Nicht ganz regelmässig imbrquirt. Neu! . . . . .	—	10
92. <b>Contessa Rampi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	8
91. <b>Contessa Ricci</b> . Der äussere Theil der weissgestreiften Blume purpurroth, der mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollkommene Imbrication . . . . .	—	10
93. <b>Contessa Woronzoff</b> . Blutrosa, dunkler geadert und alle Petalen mit weissem Rande, gut imbrquirt . . . . .	15	8
102. <b>Contiana</b> ( <i>Burnier</i> ). Leuchtend ponceau, von guter Form . . . . .	15	8
106. <b>Coronata miniata</b> . Leuchtend hellroth, grosse starkgef. Blume . . . . .		
105. <b>Corradino</b> ( <i>Luzatti</i> ). Blume ersten Ranges. Rosa, lachsrosa geadert, vorzüglich imbrquirt. Das Centrum der Blume ist schachbrettartig rosa mit weissen Streifen . . . . .	25	15
89. <b>Countess of Orkney</b> ( <i>Nicholson</i> ). Schöne Centifolienform, veränderlich, theils atlasrosa, theils weiss mit blassrosa, theils blassfarben mit dunkleren Streifen . . . . .	15	8
108. <b>Cup of Beauty</b> ( <i>Fortune</i> ). Ranunkelförmig, imbrquirt, milchweiss, rosa gefleckt . . . . .	—	8
109. <b>Davide Boschi</b> . Sehr grosse, vollkommen imbrquirte Blume, frisch hellrosa, im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig! . . . . .	—	8

	I.	II.
110. <b>Daviesi</b> ( <i>Davies &amp; Co.</i> ) Brillant granatroth, Blumenblätter von sehr fester Textur . . . . .	Gr. 12	Gr. 6
113. <b>Decus Italicum</b> ( <i>Sacco</i> ). Imbriquirter Bau, grosse, prächtige weisse Blume . . . . .	15	8
114. <b>De Notaris</b> . Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt, regelmässiger Bau	12	6
112. <b>Del Vecchio</b> ( <i>Danovarro</i> ). Centrum und äussere Blumenblätter lebhaft rosa, die dazwischen liegenden blossrosa, gut imbriquirt . .	15	8
427. <b>Dionisia Poniatowsky</b> ( <i>Conte Boutourlin</i> ). Von vollendet imbriquirtem Bau, gross, weiss, mit einem leichten Anhauch von zart rosa, zuweilen mit einigen carminrothen Streifen. Neu! . . .	—	20
116. <b>Docteur Boissduval</b> ( <i>Mielles</i> ). Rosa mit violetem Anflug, von schöner regelmässiger Form und sehr grossblumig. . . . .	—	8
117. <b>Don Bernardo Lecchi</b> . Rosa mit lila Anflug und rein weissen Streifen. Vollkommen imbriquirte Blume . . . . .	15	10
121. <b>Don Giovanni Batista Borghese</b> ( <i>Giard. Borghese</i> ). Fleischfarben rosa mit lila Anhauch und weissen Streifen. Regelmässige Imbrication . . . . .	15	8
120. <b>Donna Anna Maria Borghese</b> ( <i>G. Borgh.</i> ). Vollkommene Imbrication, gross, becherförmig, perlweiss, scharlachcarmin gestreift und punktiert . . . . .	15	8
118. <b>Donna Francesca Salviati</b> ( <i>Giardino Salviati</i> ) . . . . .	15	8
119. <b>Donna Isabella Salviati</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	8
123. <b>Doria Tursi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	8
126. <b>Dryade</b> (= verstümmelt Dryde und Iride). Guter Bau, rosa mit lebhafter Nervatur . . . . .	15	8
130. <b>Duca di Sassonia</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ) . . . . .	12	8
131. <b>Duca di Serbelloni</b> . Rosa mit lila Nüancen. Mitte weiss . .	15	8
132. <b>Duca Salviati</b> . Hellponceauroth mit purpurnen Adern, mitunter weiss gefleckt . . . . .	—	15
128. <b>Duchesse de Berry</b> . Zartes reines Weiss, Blume von edelster imbriquirter Ranunkelform . . . . .	15	8
409. <b>Duchesse de Nassau</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Grosse schöne imbriquirte Blume, zart blossrosa und leichtblühend . . . . .	30	12
129. <b>Duchesse d'Orleans</b> . Form einer Ranunkel, Petalen schön rund, gut imbriquirt. Weiss fleischfarbig, unregelm. carm. gesprenk. .	15	8
133. <b>Dupont de l'Eure</b> . Guter Bau, fleischfarben, carmin getigert	12	6
127. <b>Dutchess of Buccleugh</b> . Blume sehr gross, imbriquirt, rosa carmin gestreift . . . . .	15	8
135. <b>Eden</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	8
136. <b>Edita</b> . Weiss mit gelb liniert oder geadert, mittelgross, gut gebaut	—	8
62. <b>Elisa Centurioni</b> . Weiss, rosa gefleckt, regelmässig imbriquirt	15	8
137. <b>Elisa Frumenti</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	—	8
138. <b>Elvira di Mendoza</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
139. <b>Emilia Campione</b> . Carminlackfarben, mit ponceau Tinten und Adern, jedes Blumenblatt mit einem breiten weissen Mittelstreifen. Blume gross und imbriquirt . . . . .	15	10
141. <b>Emilia Gavazzi</b> . Zart rosigweiss mit carmin gestreift und gefleckt; gut imbriquirt . . . . .	—	6
142. <b>Emilio Bono</b> . Rosa, jedes Blumenblatt weiss bandirt u. marmorirt	15	8
140. <b>Emperor of Russia</b> ( <i>Engl.</i> ). Roth mit hellen Tinten, grosse imbriquirte Blume . . . . .	15	8
143. <b>Enrichetto Appiani</b> . Lebhaft roth, geadert u. gut imbriquirt	15	8
145. <b>Ernesto Rosazza</b> ( <i>Buridin</i> ). Zart rosa, nach aussen blässer, imbriquirt und leicht blühend . . . . .	—	10
146. <b>Ernesto Visconti</b> . Sehr grosse becherförmig und regelmässig gebaute Blume, brillant roth, weiss marmorirt . . . . .	15	8
147. <b>Eugenietta Bolognini</b> . Zart rosa, gut imbriquirt . . . . .	15	8



	I. Gr.	II. Gr.
150. <b>Fanny Bolis</b> ( <i>Madoni</i> ). Vollkommene Ranunkelform, mit vielen runden Blumenblättern, fleischfarbenweiss, blutroth gestreift und gefleckt . . . . .	—	8
411. <b>Fanny Sanchioli</b> ( <i>Illustr.</i> ). Schön gebaute, grosse Blume, rein weiss mit rosigem transparenten Schimmer, nach dem Centrum zu mit schwefelgelbem Anfluge . . . . .	25	—
149. <b>Fanny Tuccari</b> (= <i>Cosmopolitana</i> ). Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, brillant rothweiss marmorirt . . . . .	12	6
152. <b>Festiva</b> ( <i>Delgrande</i> ). Völlig imbriquirter Bau, mit starken Petalen, hellkirschroth mit weissem Saum . . . . .	20	10
153. <b>Fiametta Bianchi</b> . Weinroth mit weissen Streifen, gut imbriquirte Form . . . . .	12	6
154. <b>Formosa</b> ( <i>Chandl.</i> ). Päonienform, stark gefüllt, schön ponceauroth . . . . .	12	6
155. <b>Fortuna</b> ( <i>Herbert</i> ). Grosse gut imbriquirte Blume, weiss mit rosa Bandstreifen . . . . .	—	15
158. <b>Fra Arnoldo da Brescia</b> ( <i>B. Lechi</i> ). Schön zartrosa, mit weissen Streifen und Flecken . . . . .	15	8
159. <b>Francesco Guicciardini</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
157. <b>Francesco Sforza</b> . Dunkelrosa, mitunter weiss gestreift. Centrum heller. Gut imbriquirt . . . . .	15	10
161. <b>Fulgens plenissima</b> ( <i>Icon. de Cam.</i> ). Dunkelrothe, stark gefüllte Blume. Gut zum Treiben . . . . .	12	6
162. <b>Galanthe Nuovo</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
163. <b>Gasparo Stampa</b> . Schön rosa, reinweiss regelmässig gestreift, vollkommene Imbrication . . . . .	12	8
172. <b>Général Bosquet</b> . . . . .	12	6
168. <b>Général Cavaignac</b> . Starkgefüllte imbriquirte Blume, leuchtend rosa, mit weissen Streifen oder Flecken . . . . .	15	8
167. <b>Général Dufour</b> . Lebhaft rosa, alle Blumenblätter mit breiten weissen Streifen, Centrum violettrosa; gut imbriquirt . . . . .	15	8
166. <b>Général Lafayette</b> ( <i>Boll.</i> ). Musterimbrication, atlassosa. weiss gebändert, mitunter weiss, rosa gestreift und gesprenkelt . . . . .	—	8
170. <b>Général Mengaldo</b> . Blume ausserordentlich gross, von gutem imbriquirten Bau, roth mit grossen weissen Flecken . . . . .	—	12
171. <b>Général Monte Vecchio</b> . Gut imbriquirt, zartestes rosa mit einem weissen Mittelstreifen . . . . .	—	15
173. <b>Général Pepe</b> . Dunkelroth mit weissen Streifen, Blume gross und gut imbriquirt . . . . .	12	6
169. <b>Général Simpson</b> . Gut imbriquirte Blume, rosa mit breiten weissen Streifen . . . . .	15	8
165. <b>General Washington</b> ( <i>Boll.</i> ). Weiss, strohgelb und rosa gestreift, gut imbriquirt . . . . .	15	8
177. <b>Giardino Antonelli</b> . Sehr grosse gutgebaute Blume, fleischfarben mit carmin leicht gebändert . . . . .	15	8
176. <b>Giardino d'Italia</b> . Hellrosa mit breiten weissen Bandstreifen . . . . .	—	8
175. <b>Giardino Franchetti</b> . Varietät von C. Targioni; sehr grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern, rein weiss gefleckt und breit carmin gestreift . . . . .	—	6
174. <b>Giardino Mozzi</b> . . . . .	15	8
423. <b>Giardino Schmitz</b> ( <i>Schm.</i> ). Von regelmässigem Bau, zart rosa, in der Mitte und an den Rändern lebhaft gefärbt. Neu! . . . . .	30	15
178. <b>Giardino Petraja</b> . Gut gebaute grosse Blume, dunkelrosa mit weissen Linien . . . . .	15	8
180. <b>Gioachimo Rossini</b> . Sehr grosse gut gebaute Blume, lackfarbig rosa, glänzend weiss gefleckt und gestreift . . . . .	15	8
179. <b>Giovanni Nencini</b> ( <i>Miell.</i> ). Zart rosa, mit wenig weissen Streifen, gut imbriquirte grosse Blume . . . . .	—	12

	I.	II.
187. <b>Giuseppe Biasi.</b> Blume gross, carmin, weiss gefleckt und vollkommen imbriquirt . . . . .	Gr. 20	Gr. 10
181. <b>Gloria del Verbano</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). Iconograph des Camellias. Ponceau mit weissen Streifen, sehr reich blühend . . .	15	8
182. <b>Gloria di Milano</b> ( <i>Chiesa</i> ). Leuchtend rosa, Centrum dunkler; gut imbriquirt . . . . .	12	6
183. <b>Grandis</b> ( <i>Hugh Low &amp; Co.</i> ). Brillant roth, weiss panach. Gut imbriq. . . . .	12	6
184. <b>Gravazzi</b> . . . . .	15	8
185. <b>Gran Luigi del Fiesco</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	—	10
186. <b>Guillaume Tell</b> ( <i>Boll.</i> ). Atlasrosa, jedes Blumenblatt mit einem rein weissen Mittelstreifen. Gut imbriquirt . . . . .	12	6
188. <b>Guthriana</b> ( <i>Low.</i> ). Gut imbriquirt, blassrosa mit lila Reflexen . . . . .	12	8
191. <b>Humboldti</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	6
189. <b>Harlequin</b> ( <i>Borghi</i> ). Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde . . . . .	12	6
190. <b>Helvetia</b> . Sehr grosse, musterhaft imbr. Blume. Durchsichtig rosa . . . . .	—	6
192. <b>Jaune de Fortune</b> . . . . .	15	8
414. <b>Japonica fol. albo var.</b> . . . . .	—	20
193. <b>Jardin d'hiver</b> ( <i>Boll.</i> ). Lebhaft rosa, vollkommen imbriquirt und ausserordentlich reichblühend . . . . .	—	6
195. <b>Jean Nencini</b> . . . . .	—	8
194. <b>Jeffersonii</b> ( <i>Gunnell</i> ). Prächtiger, imbriquirter Bau, leuchtend roth mit feinen weissen Linien . . . . .	10	6
196. <b>Jenny Lind</b> ( <i>W. Mackenzie</i> ). Bis ins Centrum völlig imbriquirt, weiss, rosa gefleckt und gestreift. Blumenblätter breit und leicht ausgerandet . . . . .	—	10
199. <b>Il Beduino</b> ( <i>Burdin</i> ) . . . . .	20	10
197. <b>Il Cygno</b> ( <i>Casoretti</i> ). Reinweiss, Petalen rund, gut gebaut. Blume in Ranunkelform . . . . .	10	6
201. <b>Il 22 Marzo</b> . Hellrosa, oft mit einem weissen Streifen auf jedem Blumenblatt. Gut imbriquirt . . . . .	—	8
203. <b>Imbricata</b> . Form der alba plena, carminroth . . . . .	12	6
202. <b>Imbricata rosea</b> . Von vorzüglichem Bau in Rosa . . . . .	12	8
204. <b>Imperator</b> ( <i>Delgrande</i> ). Riesige Blume, paeonienf., ponceauroth . . . . .	—	12
205. <b>Incomparable</b> ( <i>Miell.</i> ). Rosa, jedes Blumenblatt weiss eingefasst, von vorzüglichem Bau . . . . .	—	8
206. <b>Insubria</b> ( <i>Italien</i> ). Blume von gutem Bau, Grundfarbe weiss, mit rothen und rosa Streifen, reichblühend . . . . .	10	6
208. <b>Isabella di Bardi</b> . Sehr grosse, gut gebaute Blume, Centrum rosa mit weissen Streifen, nach dem Rande zu dunkelcarmin . . . . .	15	8
428. <b>Isabella Orsini</b> ( <i>Franchetti</i> ). Frischrosa, im Centrum röthlich, von gutem Bau, mit sehr grossen breiten Petalen. Neu! . . . . .	—	20
207. <b>Isabella Zerbini</b> ( <i>Burdin</i> ). Cochenillerosa mit weissem Saum; gut imbriquirt . . . . .	12	6
212. <b>Italiana vera</b> . Gross, imbriq., lebhaft rosa, nach d. Centr. weiss . . . . .	12	6
209. <b>Jubilée</b> ( <i>Low.</i> ). Blume erster Grösse, mit breiten imbriquirt-liegenden Petalen, weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss . . . . .	12	6
210. <b>Jupiter</b> ( <i>Smith</i> ). Fleischfarben, von regelmässigem Bau . . . . .	12	6
211. <b>Justiniana</b> . Leuchtend roth; imbriquirt . . . . .	15	8
223. <b>La Cornarina</b> ( <i>Miellez</i> ) . . . . .	15	8
218. <b>La Constitutione</b> . Lebhaft rosa, weiss gefleckt und liniirt, gut imbriquirt . . . . .	—	8
220. <b>Lady Bethaven</b> ( <i>Dickson</i> ). Sehr grosse, lebhaft carminrothe Blume, von vorzüglichem Bau, reichblühend . . . . .	15	8
198. <b>La Modèle</b> ( <i>Miellez</i> ) . . . . .	15	8
226. <b>Lampugnani</b> . . . . .	—	8
214. <b>La Pace</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	—	10
213. <b>La Speranza</b> . Carminroth mit weissen Punkten, gut imbriquirt . . . . .	16	8

		I. Gr.	II. Gr.
224.	<b>L'avenire.</b> Sternförmig imbriquirt, rosa mit hellem Saum . . .	15	8
216.	<b>La Vestale</b> ( <i>Santorelli</i> ). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, vom reinsten blendenden Weiss . . . . .	15	8
217.	<b>La Vestale</b> ( <i>Delgrande</i> ) Grosse, rein weisse Blume von schöner Imbrication . . . . .	15	8
215.	<b>La Vestale</b> ( <i>Pepine</i> ). Rein weiss. Herrlich! . . . . .	15	8
228.	<b>Lemichezii</b> ( <i>Miell.</i> ). Vollkommen imbriquirte Blume, lebh. roth	12	8
232.	<b>Leopold I.</b> ( <i>Versch.</i> ). Blume I. Grösse, lebhaft rosa, mit scharlach Schein, ohne Flecken in roth übergehend, mit bläulichem Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu. Vollkommen imbriquirt	15	8
229.	<b>Leopoldo Malesky.</b> Gut imbriquirt, hellrosa, sehr gefüllt, leicht aufblühend . . . . .	15	8
227.	<b>Letitia Cavalli</b> (= <i>Contessa Cavalli</i> ). Schön geformte, grosse, gewölbte Blume, rein weiss mit lebhaft rosa Streifen . . . . .	—	10
230.	<b>Linda Rosazza</b> ( <i>Ros.</i> ). Rein weiss, schön imbriquirt, in sehr grosser Blume . . . . .	15	8
231.	<b>Livia Boromea</b> ( <i>Icon. de Camell.</i> ). Brillant rosa mit weisser Panachirung und Nervatur, grosse Blume mit schöner Imbrication	—	8
233.	<b>Lombordo.</b> Leuchtend rosa mit dunkleren Tinten, Mitte fast weiss und gestreift, Blume gross und gut gebaut. . . . .	—	15
235.	<b>Louis Lesbois</b> ( <i>Miellez</i> ) . . . . .	—	10
234.	<b>Lowii</b> ( <i>V. Low.</i> ). Leuchtend roth, in Ranunkelform . . . . .	15	8
238.	<b>Lucrezia Gazzarini.</b> Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, lebhaft rosa, weiss gestreift . . . . .	15	8
236.	<b>Lucullus</b> ( <i>Herbert</i> ). Ponceauroth mit rein weiss marmorirt, zuweilen auch ganz roth, imbriquirter Bau . . . . .	12	6
237.	<b>Luigi Lodi</b> . . . . .	15	8
265.	<b>Maculata perfecta.</b> Klein, imbriquirt, bald rosa mit weissen Bändern, bald roth mit weissen Bandstrichen . . . . .	15	10
242.	<b>Mad. Corsi.</b> Carminrosa, weiss gestreift, imbriquirte Blume .	15	8
250.	<b>Madame de Rambuteau</b> ( <i>Burdin</i> ). Sehr grosse, völlig imbriquirte Blume, rein weiss . . . . .	15	8
244.	<b>Madame de Strekaloff.</b> Zartes atlasrosa, leicht gelblich weiss gestreift . . . . .	—	6
243.	<b>Madame Damage</b> ( <i>Miellez</i> ). Sehr grosse, schalenförmige, prächtige Blume, leuchtend rosa mit carmin Schattirung. Einer Centifolienrose ähnlich . . . . .	12	6
247.	<b>Madame Fatters.</b> Ponceauroth, weiss gesprenkelt; ähnlich wie Donkelaari, aber gut imbriquirt . . . . .	—	8
249.	<b>Madame Lebois</b> ( <i>Miellez</i> ). Lebhaft roth, gut geformte Blume ersten Ranges . . . . .	10	6
240.	<b>Madame Miellez</b> ( <i>Miellez</i> ). Centrum der Blume carmin, Rand rosa, und die dazwischen liegenden Petalen weiss. Die Blumenblätter sind klein, stern- und spiralförmig geordnet . . . . .	12	6
245.	<b>Madame Pepin</b> ( <i>Miellez</i> ). Rand und innerstes Centrum kirschroth, die dazwischen liegenden Blumenblätter fleischfarbigrosa und weiss umsäumt . . . . .	15	8
248.	<b>Madame Soly</b> . . . . .	15	8
279.	<b>Maddalena</b> ( <i>Lechi</i> ). Imbrication I. Ranges. Die äusseren u. inneren Blumenblätter sind dunkelcarmin, die dazwischen liegenden rosa, atlasweiss verwaschen. Die ganze Blume weiss gestreift	12	6
256.	<b>Malvina.</b> Elfenbeinweiss, carmin gestreift u. sehr gut imbriquirt	—	8
257.	<b>Maometto.</b> Blume von schöner Form, dunkelponceau, sehr gefüllt und reichblühend . . . . .	—	—
258.	<b>Marchesa Doria Dolci Aqua.</b> Grosse, regelmässig imbriquirte Blume, schön fleischfarben mit rothen Streifen . . . . .	12	6
259.	<b>Marchesa Garbarini</b> ( <i>Iconograph. des Camell.</i> ) . . . . .	—	8



	I.	II.
	Gr.	Gr.
263. <b>Marchesa Natta</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). Rosa mit schwärzlichen Gr. Reflexen im Centrum, die äusseren Blumenblätter gestreift, grosse imbriquirte prachtvolle Blume . . . . .	15	8
260. <b>Marchioness of Exeter</b> ( <i>Priault</i> ). Ausnehmend gross, dunkelrosa; imbriquirt . . . . .	15	8
239. <b>Maréchal Pellissier</b> . Blume gross, vollkommen imbriquirt, rosa mit carmin Schein und weissem Saum . . . . .	12	6
262. <b>Marguttina</b> ( <i>Delgrande</i> ). Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, dunkelkirschroth, zuweilen Blumen bringend von hell-lila Colorit mit dunkelkirschrothem Saum . . . . .	15	8
251. <b>Marie Louise</b> . . . . .	12	6
253. <b>Marie Massini</b> . Hellkirschroth in rosa übergehend, oft weiss gestrichelt, gut imbriquirt . . . . .	—	8
254. <b>Marie Morren</b> ( <i>Haquin</i> ). Imbriquirt, lebhaft carmin, oft mit weissen Flecken . . . . .	—	8
252. <b>Marie Nicolai</b> . . . . .	12	6
255. <b>Maria Theresia</b> ( <i>Conte Maggi</i> ). Regelmässige, imbriquirte, dicht gefüllte Blume, weiss mit carmin gespritzt . . . . .	10	—
266. <b>Mathotiana</b> . Gross, feurig dunkelroth und von ziemlich regelmässigem Bau . . . . .	12	6
267. <b>Mathotiana alba</b> ( <i>Miellez</i> ). Reinstes Weiss, vollständige Imbrication bis ins Centrum . . . . .	—	6
81. <b>Mattutina</b> = <b>Contessa Melegari</b> ( <i>Luzatti</i> ). Weiss oder rosa mit weiss gebändert. Schön imbriquirte Blume in Centifolienform . . . . .	12	6
268. <b>Mazarelli</b> (= de Medici). Musterhaft imbriquirter Bau; lebhaft ponceau mit weissen Streifen . . . . .	12	6
269. <b>Mexicana nova</b> ( <i>C. Borghi</i> ). Blume gross, in Ranunkelform, zinnoberroth, weiss bandirt im Centrum . . . . .	12	6
272. <b>Micans</b> . Carminrosa, gut imbriquirt. Blume I. Ranges . . . . .	12	6
273. <b>Michel Angelo</b> ( <i>Icon. de Cam.</i> ) . . . . .	15	8
274. <b>Miniata</b> ( <i>Low</i> ). Herrliche Camellie, von guter Form. Mennigrosa, sehr reichblühend . . . . .	12	6
271. <b>Mistress Cope</b> . Weiss, von gutem Bau, mit rosa Streifen, stark gefüllt und reichblühend . . . . .	12	6
268. <b>Mistress Dombrain</b> ( <i>J. van Eckhaute</i> ). Vollendet imbriquirter Bau, im schönem zartrosa Colorit. Neu! . . . . .	—	20
397. <b>Mrs. Abby Wilder</b> = <b>Wilderii</b> . Zart rosa, imbriquirter Bau . . . . .	12	6
421. <b>Myrtifolia fol. var.</b> . . . . .	—	30
276. <b>Monstrosa alba</b> . . . . .	12	6
275. <b>Monteroni vera</b> . Rahmweiss, carmin gestrichelt, gut imbriquirt . . . . .	12	6
270. <b>Myrtifolia elegans</b> . . . . .	12	6
280. <b>Napoleon III.</b> ( <i>Jos. Baumann</i> ). Schön imbriquirt, rosa mit dunklerer Nervatur und weissem Saum, oft weiss marmorirt . . . . .	12	6
281. <b>Nazionale</b> . Gut imbriquirt, blendend hellroth, mit einem breiten weissen Mittelstreifen auf jedem Blumenblatte . . . . .	12	6
282. <b>Néron</b> . Lebh. kirschroth, weiss geadert u. v. gutem Bau. Prachtvoll! . . . . .	15	8
285. <b>Nicolai Pagano</b> ( <i>Brozzone</i> ). Carminroth mit weissen Streifen; Blume von schönem imbriquirten Bau . . . . .	15	8
283. <b>Ninfa del Bosco</b> ( <i>Delgrande</i> ). Dichtgefüllte imbriquirte Blume, rein weiss mit carmin gespritzt . . . . .	15	6
412. <b>Ninfa del Tebro</b> ( <i>Delgrande</i> ). Grosse imbriquirte Blume mit runden Petalen, leuchtend kirschroth mit einem breiten Mittelstreifen auf jedem Blumenblatt . . . . .	—	20
284. <b>Ninfa Egeria</b> ( <i>Delgrande</i> ). Blume sehr gross, bis zur innersten Mitte imbriquirt. Rein weiss . . . . .	15	8
826. <b>Niobe</b> ( <i>Santarelli</i> ). Sehr grosse Blume von gutem imbriquirten Bau, leuchtend rosa ohne Flecken . . . . .	—	15

	I.	Gr.	II.
287. <b>Nitida</b> ( <i>Chandler</i> ). Ponceauroth mit hellem Anflug, dicht gefüllt	10	6	
288. <b>Oculis Veneris</b> , Stark gefüllt, lebhaft rosa mit weissen Linien	12	6	
69. <b>Olivetana</b> ( <i>Marquis Spinola</i> ) = <b>Chichizola</b> . Gross imbriquirt, hellcarmin, Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig . . .	20	10	
291. <b>Optima</b> ( <i>Low</i> ). Lebhaft rosa mit carmin Streifen, grosse imbriquirte Blume . . .	15	8	
290. <b>Ortensia Luzzatti</b> ( <i>Ch. Luzzatti</i> ). Bau einer grossen Centifolienrose, prächtig rosa, Blumenblätter rund und sehr breit . .	20	10	
293. <b>Palazzo Borghese</b> , Sehr grosse, vollständig imbriquirte, becherförmige Blume, brillant rosa, dunkler schattirt und mit fleischfarbenem Centrum . . .	15	8	
295. <b>Patersoni</b> ( <i>R. Buist</i> ). Ponceau, dicht gefüllte Blume, Päonienbau	12	6	
297. <b>Pearl</b> ( <i>Rolisson</i> ). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt im Centrum . . .	12	8	
299. <b>Pecchiolana</b> . . .	15	8	
300. <b>Perfecta</b> ( <i>Palmer</i> ) = <b>Perfection</b> . Dunkelcarmin, weiss gebändert, imbriquirt . . .	12	6	
304. <b>Pietro Cappioni</b> . . .	—	15	
302. <b>Pietro Corsini</b> . Imbriquirt, dunkelrosa . . .	15	8	
306. <b>Pio nono</b> . Rosig weiss, Petalen rund und imbriquirt . . .	15	18	
307. <b>Pisani</b> . . .	15	10	
308. <b>Planipetala</b> . Grosse schöngebaute Blume, meist mit gelblichem Anflug . . .	—	20	
305. <b>Pozzi</b> ( <i>Brozzone</i> ). Ausserordentlich gross, tadellos imbriquirt, carminrosa, weiss gestreift . . .	15	8	
322. <b>Praegnans</b> . . .	20	15	
402. <b>Pralide nuovo</b> . . .	—	15	
321. <b>Prince Albert</b> . Blumenblätter von enormer Grösse, weiss, lebhaft carmin gestreift . . .	12	6	
309. <b>Prince de Rohan</b> . Leuchtend hellkirschroth, gut imbriquirter Bau . . .	12	6	
317. <b>Princesse Charlotte</b> . Weiss, das Centrum oft rosa mit rahmweiss; kleinblumig, aber von gutem Bau . . .	12	6	
310. <b>Principe Borghese</b> . Regelmässig imbriquirte Blume, rosa, mit blassrosa Tinten und weissen Streifen . . .	15	8	
312. <b>Principessa Adela</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ). Blume von regelmässigstem, imbriquirtem Bau. Lebhaft reinrosa . . .	—	10	
314. <b>Principessa Agnesa</b> ( <i>Giard. Borgh.</i> ) . . .	20	10	
316. <b>Principessa Aldobrandini</b> ( <i>Franchetti</i> ). <i>Icon. des Camell.</i> ). Colorit zwischen Giardino Franchetti und Mad. Strekaloff, Blume sehr gross und von gutem Bau . . .	15	10	
319. <b>Principessa Baciocchi</b> ( <i>J. Boffi</i> ). Kirschroth mit weissen Bändern, imbriquirt . . .	15	8	
320. <b>Principessa Maria Pia</b> . Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken . . .	12	6	
315. <b>Principessa Rospigliosi</b> . Herz und Rand der Blume rosa, die dazwischenliegenden Blumenblätter reinweiss; gut geformte Blume . . .	—	10	
313. <b>Principessa Teresa Borghese</b> . Sehr grosse paeonienförmige Blume, die äusseren Petalen weiss mit rosa und carmin Streifen, die des Centrums gelb gestreift . . .	15	8	
311. <b>Principessa Vidoni</b> . Sehr grosse und gut gebaute Blume, kirschroth mit weiss gestreift, Centrum fast weiss . . .	12	6	
318. <b>Princessin v. Preussen</b> ( <i>A Topf.</i> ) = <b>Virgine di Colle Beato</b> ( <i>v. Houtte</i> ). Spiralförmiger Bau, reinweiss . . .	—	8	
324. <b>Professore Rossi di Parma</b> . Amaranthroth mit breiten weissen Streifen . . .	—	8	

	I. Gr.	II. Gr.
323. <b>Professore Zenetti</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	—
325. <b>Pulasky</b> ( <i>Boll</i> ). Rosa, regelmässig gebaute Blume. Musterform	15	8
415. <b>Punicea</b> ( <i>Hend.</i> ). Regelmässig imbriquirte grosse Blume mit runden Petalen, brillant carminroth, schön dunkel belaubt . . .	15	8
416. <b>Quercifolia</b> . . . . .	—	15
335. <b>Re d'Italia</b> . Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbriquirter Bau	12	8
328. <b>Regina del Giganti</b> . Sehr grosse Blume, leuchtend roth und von gutem Bau . . . . .	12	6
333. <b>Regina del Lago</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	—
330. <b>Regularis imbricata</b> ( <i>Belg.</i> ). Leuchtend kirschroth, nach der Mitte weiss gestreift, von schöner Imbrication . . . . .	15	8
400. <b>Reine des Beautés</b> (= <i>Queen of the Beauties</i> ). Sehr zart blassrosa, gut gebaute grosse und stark gefüllte Blume, Varietät von der C. Mrs. Abby Wilder . . . . .	15	8
332. <b>Reine des Belges</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Imbriquirt, rosa mit weissem Saum . . . . .	15	8
331. <b>Reine des Vièrges</b> ( <i>Roll</i> ). Zartrosa, grossblumig, Ranunkelform . . . . .	12	6
334. <b>Reine Louise</b> ( <i>E. Defresne</i> ). Lebhaft carmin, die mittleren Petalen fleischfarben; gut imbriquirt . . . . .	10	5
329. <b>Reticulata</b> . . . . .	—	5
401. <b>Reticulata flore pleno</b> ( <i>Fortune</i> ). Jedermann kennt die alte C. reticulata mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen, leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll. . . . .	—	20
337. <b>Riccardo Cobden</b> ( <i>Luzzatti</i> ). Sehr grosse, gutgeformte Blume, prächtig rosenroth . . . . .	—	10
338. <b>Richardsoni</b> . . . . .	—	5
344. <b>Roi Léopold</b> ( <i>E. Defresne</i> ). Rosa mit weiss gespritzt. . . . .	10	—
429. <b>Roma Risorta</b> ( <i>Del Grande</i> ). Blume sehr gross, von prächtigem Centifolienbau mit sehr breiten Petalen, leuchtend rosa, carmoisin gestreift und gestrichelt. Eine der schönsten neuen Camellien. Neu! . . . . .	—	20
339. <b>Rosea spectabilis</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	6
340. <b>Rosa delicatissima</b> (= <i>Laura Bondi</i> ). Die äusseren Blumenblätter lebhaft rosa, die des Centrums heller und weiss gestreift . . . . .	—	8
341. <b>Rosa di Maggio</b> . Sehr grosse Blume, becherförmig imbriquirt. Farbe und Form einer Centifolienrose . . . . .	12	6
346. <b>Rubens</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Dunkelrosa mit rein weissen Streifen, imbriquirt . . . . .	10	6
347. <b>Rubini</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6
350. <b>Saccoi</b> ( <i>Sacco</i> ). Gut imbriquirt, manchmal einfach rosa, manchmal mit weissen Flecken . . . . .	12	6
148. <b>Saccoi nova</b> ( <i>Sacco</i> ). Rosa mit violetem Anflug, prächtiger Färbung, in vollkommen imbriquirter Form . . . . .	—	8
348. <b>Salicifolia alba</b> . Rein weiss . . . . .	10	5
420. <b>Sasanqua fol. albo var.</b> . . . . .	30	15
349. <b>Samoiloff</b> . Blutroth, braun geädert, mit weissen Mittelstreifen . . . . .	—	6
353. <b>Scipione l'Africano</b> . Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violett nuancirt, mit weissen Linien . . . . .	15	8
352. <b>Sebastopol</b> ( <i>Piattoli</i> ). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, blassrosa . . . . .	15	—
351. <b>Servii</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	15	8
354. <b>Soffia Zizzurini</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	6



	I.	II.
	Gr.	Gr.
418. <b>Souvenir d'Emil Defresne</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	20	10
355. <b>Sorisso d'Amore</b> . Grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern und weissen Streifen, Centrum blasslilarosa . . . . .	20	10
358. <b>Stella d'Italia</b> . Lilarosa mit weissen Wimpern, regelmässig imbriquirt . . . . .	15	10
356. <b>Stella polare</b> ( <i>Santarelli</i> ) = <b>Etoile polaire</b> ( <i>Hend.</i> ) Blume von schöner imbriquirter Form, leuchtend carmin, jedes Petalum mit einem weissen Mittelstreifen . . . . .	15	8
357. <b>Storyi</b> ( <i>Story</i> ) = <b>Storzii</b> . Aeussere Petalen brillant rosa, fast weiss in der Mitte, imbriquirter Bau . . . . .	15	8
360. <b>Sublime Porte</b> . Dunkelroth, durchschimmernd weiss geadert, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume . . . . .	12	8
361. <b>Targioni</b> . Rein weiss, kirschroth gestreift und gut imbriquirt . . . . .	15	—
362. „ <b>rosea</b> . Varietät der vorigen. Lebhaft rosa mit weissen Streifen . . . . .	15	8
366. <b>Tebaldo Brusati</b> . Tief dunkelroth, sehr grosse Blume in vollkommenem regelmässig imbriquirtem Bau . . . . .	15	8
363. <b>Teutonia</b> ( <i>Grüneberg</i> ). Blume weiss oder roth, zuweilen halb weiss, halb roth, gut imbriquirt . . . . .	12	6
365. <b>Teutonia albo roseo cincta</b> = <b>T. versicolor</b> = <b>T. amabilis</b> . Rosa mit weissen Rändern . . . . .	12	6
368. <b>Theodoro Lecchi</b> . Hellkirschroth, gut gebaute, sehr grosse Blume . . . . .	15	8
367. <b>Thisbe</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) Leuchtend hellroth mit weissen Bandedetten, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume . . . . .	15	8
378. <b>Trebbiensis</b> ( <i>Conte Calciati Borgh.</i> ). Grosse imbriquirte Blume, kirschroth und heller panachirt . . . . .	15	8
376. <b>Tricolor de Mathot</b> . . . . .	12	6
375. <b>Tricolor imbricata flore pleno</b> ( <i>Ch. Schmitz, Florenz. Hend.</i> ) Eine der prächtigsten neuen Sorten, Hybride von der alten <i>C. tricolor</i> , in regelmässiger Rosenform. Blume gross, weiss und carmoisinroth panachirt . . . . .	20	10
369. <b>Triomphe de Liège</b> . Regelmässig imbriquirt, grosse Blume, rosa mit lila oder bläulichem Schimmer . . . . .	15	8
371. <b>Triomphe de Wondelghem</b> ( <i>de Loose</i> ). Gross, dunkelrosa und schön imbriquirt. (Erhielt einen ersten Preis in Gent.) . . . . .	15	8
370. <b>Triumph von Mainz</b> . Zartrosa, dunkler geadert und von gutem Bau . . . . .	15	8
379. <b>Ubertiana</b> ( <i>Italien</i> ). Dunkelkirschroth, nach dem Rande zu violett-bläulich, Centrum weiss gestreift, von gutem Bau . . . . .	15	8
380. <b>Unica</b> ( <i>Herbert</i> ). Aeusserst zart, rein weiss, gut imbriquirt, noch selten, Päonienbau . . . . .	20	—
382. <b>Valle Vareda</b> = <b>Valtevedra</b> ( <i>Rossi</i> ). Sehr gross, gut imbriquirt, lebhaft rosa, oft weiss gefleckt . . . . .	15	8
383. <b>Van Dyck</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Regelmässig imbriquirt, rosa mit weiss marmorirt und gestreift . . . . .	10	6
381. <b>Vandini</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	6
384. <b>Variegata nova</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ). Blume gross, vollkommen imbriquirt, hortensiaroht, lila schattirt mit bläulichem Schimmer, oft blassrosa gestreift . . . . .	15	8
385. <b>Venezia la Bella</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	15	8
389. <b>Venusta</b> . . . . .	12	6
387. <b>Verschaffeltiana</b> . . . . .	15	8
388. <b>Vessillo di Flora</b> . . . . .	12	6
422. <b>Vicomte de Nieulant</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	25	15
390. <b>Vincenzo Salvagnoli</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	15	8
395. <b>Vittoria del Feltre</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	—

	I.	II.
	Gr.	Gr.
396. <b>Voleuse.</b> Kleine, gutgebaute ranunkelförmige Blume, hellroth, Mitte dunkler, leichtblühend . . . . .	—	6
397. <b>Wilderi</b> , vide Mrs. Abby Wilder.		
399. <b>Zavonia</b> . . . . .	15	8

Von vorstehendem *Elite-Sortiment* liefern wir nach unserer Wahl: *Nous fournissons à notre choix de la collection précédente:*

I.		II.	
24 Sorten (variétés) für 9 Thlr. und für 4 $\frac{1}{2}$ Thlr.			
50 „ „ „ 20 „ „ „ 10 „			
100 „ „ „ 45 „ „ „ 22 „			

100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik für 35 Thaler.

Solche Aufträge aus vorstehendem *Elite-Sortiment*, die nur auf Pflanzen mit **Blüthenknospen** gerichtet wären, müssten wir höflichst ablehnen, was wir hier ausdrücklich bemerken.

**Camellia alba plena**, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen, à 10—20 Gr.

Ausserdem sind von *C. alba plena*, sowie von einigen anderen Sorten, Kronenbäume vorrätig, worüber wir die Preise auf Verlangen mittheilen.

## RHODODENDRON

für das Kalthaus.

Ogleich ein grosser Theil der nachstehenden Rhododendron, wenn sie gegen starken Frost geschützt werden, auch bei uns im Freien aushalten — was namentlich in Betreff vieler Himalaya-Species schon erwiesen ist; — so wird doch wegen des häufigen Temperaturwechsels unseres Klimas, und wenn die Cultur derselben im freien Lande durch locale Verhältnisse nicht begünstigt ist, ihre Cultur in einem Kalthause jederzeit sichere Resultate liefern.

Ueber die verschiedenartige, häufig grandiose Belaubung und das mannichfaltige, grösstentheils prachtvolle Colorit der Blumendolden dieser herrlichen Gewächse noch empfehlende Worte zu sagen, halten wir um so mehr für überflüssig, als dieselben bereits in fast allen Gartenzeitschriften des In- und Auslandes des Oefteren besprochen worden sind.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf einjährige, die der II. Linie auf zwei- und mehrjährige Pflanzen.

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
135. <b>Acutilobum</b> ( <i>arb.</i> ). Grosse Dolden, lebhaft carminrosa . . . . .	—	10	—	15
136. <b>Album pictum</b> ( <i>arb.</i> ). Zwergart mit weissen Blumen, welche schwarz punktirt sind . . . . .	—	8	—	15
137. <b>Alstroemerioides</b> . Atlasrosa, alle Petalen getigert . . . . .	—	8	—	15
138. <b>Arboreum</b> Broughtonii . . . . .	—	8	—	—
139. „ ferrugineum . . . . .	—	—	—	12
141. „ Louis Philipp ( <i>Bertin</i> ) . . . . .	—	8	—	12
228. „ splendens. Brillant rosacarmin . . . . .	—	8	—	15
145. <b>Catawbiense</b> Gazelle . . . . .	—	8	—	15
146. „ Onslowenianum . . . . .	—	8	—	—
147. <b>Caucasicum</b> album egregium . . . . .	—	10	—	20
149. <b>Clethraefolium</b> . . . . .	—	8	—	15
151. Colonel Rougemont ( <i>A. van Geert</i> ) . . . . .	—	8	—	15
153. <b>Grandis</b> ( <i>A. von G.</i> ) Roth, dunkler getigert . . . . .	—	8	—	15

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
156. <b>Madame Piccouline</b> ( <i>Versch.</i> ). Rein weiss, schön schwarz getigert . . . . .	—	8	—	12
334. <b>Muhamed</b> ( <i>Liebig</i> ). Leuchtend carmoisin mit dunkelblauem Schimmer. Ersten Ranges. Neu! . . . . .	1	—	—	—

### Gelbblühende Rhododendron.

Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica.

168. <b>Aureum</b> . . . . .	—	8	—	12
169.    " <b>superbum</b> . . . . .	—	10	—	15
170.    " <b>triumphans</b> . . . . .	—	12	—	—
171. <b>Burlingtonii</b> . . . . .	—	10	—	15
172. <b>Cupreum grandiflorum</b> . . . . .	—	10	—	15
173. <b>Fine buff variety</b> . . . . .	—	—	—	15
174. <b>Flavum elegans</b> . . . . .	—	12	—	15
175.    " <b>grandiflorum</b> ( <i>Versch.</i> ) . . . . .	—	—	—	15
295. <b>Fortunei</b> ( <i>Glendinning</i> ). Aus China eingeführt. Neu! . . . . .	—	20	—	—
177. <b>High clare yellow</b> . . . . .	—	—	—	15
224. <b>Javanicum</b> ( <i>Bl.</i> ). Blumen orangegelb . . . . .	1	15	—	—
178. <b>Lowii</b> . Weisslich gelb, stark gefüllt . . . . .	—	10	—	15
179. <b>Luteum longiflorum</b> . . . . .	—	—	—	15
180. <b>Retusum</b> ( <i>Benn.</i> ). Orangescharlach, in Büscheln blühend . . . . .	—	—	—	15
181. <b>Smiths Perfection</b> . . . . .	—	8	—	12

### Rhododendron vom Himalaya.

#### a) Von Sikkim.

Grösstentheils von Hooker fil. beschrieben.

183. <b>Aeruginosum</b> ( <i>Hook fil.</i> ). Blumen prächtig scharlachroth . . . . .	—	15	—	25
185. <b>Alpinum</b> . . . . .	—	10	—	20
186. <b>Anthapogon</b> . . . . .	—	20	—	—
187. <b>Argenteum</b> . Eine der grossartigsten Species; Rückseite der Blätter silberweiss . . . . .	—	—	—	25
189. <b>Bainseanum</b> . . . . .	—	20	1	—
192. <b>Calyculatum</b> . Lebhaft roth . . . . .	—	—	2	—
191. <b>Campbellii</b> . Schöne Species, Blumen scharlachroth . . . . .	—	15	—	25
190. <b>Campylocarpum niveum</b> . Herrliche Species . . . . .	—	25	1	10
194. <b>Ciliatum</b> . Hübsche Art, mit kleinen gewimperten Blättern. Blume zart rosig weiss. . . . .	—	15	—	—
195.    " <b>roseo album</b> . . . . .	—	15	—	—
252. <b>Comet</b> ( <i>Liebig</i> ). Product einer Kreuzung des Rh. <i>formosum</i> mit Rh. <i>Edgeworthii</i> . Neu! . . . . .	1	—	—	—
227. <b>Cordatum</b> . . . . .	—	12	—	20
246.    " <b>ferrugineum</b> . . . . .	—	10	—	—
299. <b>Crispiflorum</b> . Blumen zart rosa, mit gekräuselter Rande. Ausserordentlich leichtblühend. . . . .	—	10	—	20
196. <b>Dalhouseanum</b> . Leichtblühende Species mit ausserordentlich grossen weissen Blumen von lieblichem Geruch und schöner Belaubung . . . . .	1	15	—	25
197. <b>Edgeworthii</b> . Blumen weiss mit rosa Anflug. . . . .	—	12	—	15
198. <b>Falconerii</b> . { Gehören zu den grandiosesten Arten. Die Blät-	—	—	2	—
199.    " <b>superb</b> . { ter sind sehr gross, gepresst, lederartig, unten mit zimmetbraunem Filz bedeckt. Blumen und Dolden sehr gross, weiss, nach innen goldgelb, mit rosa Saum. . . . .	—	—	2	—
230. <b>Fortunei</b> ( <i>Veitch</i> ). Neu! . . . . .	—	20	1	—
200. <b>Fulgens</b> . Mit leuchtend carmoisinrothen Blumen . . . . .	—	20	—	—



		I.		II.	
		Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
305.	<i>Griffithii</i> (V.). Neu! . . . . .	—	—	2	—
203.	<i>Lanceifolium</i> . Blätter lang, schmal und spitz . . . . .	—	20	1	—
204.	<i>Maddenii</i> . Blumen gross und weiss; Species mit schöner Belaubung . . . . .	—	20	2	—
311.	<i>Metternichii</i> (Sieb. et Z.). Blume prächtig rosenroth, glockenförmig . . . . .	1	—	—	—
205.	<i>Niveum</i> . Die am höchsten vorkommende Art mit hübscher hellbrauner Belaubung . . . . .	—	20	1	—
206.	<i>Ochrosom</i> (Rolls). Prächtig glänzende Blätter, die untere Seite mit dichtem hellbraunem Filz . . . . .	—	10	—	—
207.	<i>Pilosum</i> . Dem Rhod. Edgeworthii ähnlich, die jungen Triebe sind aber von verschiedenem Colorit . . . . .	—	25	1	10
248.	<i>Rufum</i> . . . . .	—	15	—	—
208.	<i>Sesterianum</i> (Rinz). Hybride zwischen Rhododendron formosum und Edgeworthii . . . . .	—	20	—	—
210.	<i>Thompsonii</i> . Blumen ausserordentlich gross, von höchst brillanter dunkelscharlachrother Färbung . . . . .	—	20	—	—
211.	<i>Virgatum</i> . Buschige Zwergart mit netten rosafarbenen Blumen. Sämlinge (12 Stück 3 Thlr., 25 Stück 5 Thlr.) . . . . .	—	10	—	—
213.	<i>Wightii</i> . Prachtvolle Species mit schöner Belaubung und grossen strohgelben Blumen, Fahne chamois . . . . .	—	15	—	20
332.	<i>Zuave</i> (L.). Hybride von Rh. Edgeworthii, Blumen weiss, glockenförmig, stark duftend und reichblühend. Neu! . . . .	2	—	—	—

{ b) Von Assam und Bootan;

214.	<i>Boothii</i> Nutt. Mit niedlichen gelben Blumen, Blätter mittelgross und dicht weiss behaart . . . . .	—	20	1	—
215.	<i>Calophyllum</i> (Bootan). Blumen gross, weiss mit rosenrothem Reflex, äusserst wohlriechend und leichtblühend . . . . .	—	15	—	—
216.	<i>Camelliaeflorum</i> Nutt. Blumen weiss, mittelgross, einer einfachen Camellie gleichend und leichtblühend . . . . .	—	10	—	15
218.	<i>Jenkinsii</i> Nutt. Kleinblättrig, untere Seite der Blätter silbergrau . . . . .	1	—	—	—
253.	<i>Nuttallii</i> Baob. Eigenthümlich schöne Belaubung, die jungen Blätter rosenroth; Blumen weiss und von ausserordentlicher Grösse (12 Stück 5 Thlr., 25 Stück 9 Thlr.) . . . . .	—	15	1	—
220.	<i>Windsorii</i> Nutt. . . . .	—	—	1	10

Andere Species.

222.	<i>Cinnamomum</i> (arbor. cinnam. Wall.) . . . . .	—	15	1	—
223.	<i>Formosum</i> Wall. = Gibsonii . . . . .	—	15	1	—
285.	» var. <i>grandiflorum</i> . . . . .	—	15	—	—
282.	» var. <i>roseum grandiflorum</i> . . . . .	—	15	—	—
224.	<i>Javanicum</i> . Blumen orangegeb . . . . .	1	15	—	—
180.	<i>Retusum</i> Benn. ( <i>Vireya retusa</i> Blume.) Kleinblättrige Species von Java. Blumen röhrenförmig und vom schönsten Orangegeb . . . . .	—	—	—	15

Rhododendron für das freie Land vide pag. 66.

## CONIFERAE.

### Zapfenbäume, Nadelhölzer.

In Bezug auf die Eintheilung, Nomenclatur und Synonymik, richten wir uns nach Endlicher's Synopsis Coniferarum und haben zugleich Carrière's Traité des Conifères, sowie das neue, sehr zu empfehlende Werk von



**Cryptomeria.**

	Thlr.Gr.
araucaroides Hort. 1½—2 Fuss hoch	— 25
elegans Veitch. 1—1¼ Fuss hoch	1 —
japonica Don. 12 Fuss hohe schöne Exemplare, in Kübeln	6 —
„ 1½—2½ Fuss hoch	— 15
„ vera. Junge Veredlungen	2 —
Lobbii Hort. (C. japonica viridis Hort.) 10 Fuss hohe Exemplare	8 —
„ 3 Fuss hoch	1 —
nana Fort. (C. japonica pygmaea Hort.) ¼—½ Fuss hoch	— 20
retinisporoides. Junge Veredlungen	1 10
variegata Hort. 2 Fuss hoch	1 —
„ Junge Veredlungen	— 10

**Cupressus.**

* Corneyana Hort. (C. gracilis Hort.) 1 Fuss hoch	— 15
* excelsa Scott. (C. Skinnerii Hort.) 1½—2 Fuss hoch	Guatemala. 15 a — 20
* fastigiata DC. (C. sempervirens C. pyramidalis Hort.) 13—17 Fuss hoch, in Kübeln.	Süd-Europa. 15 —
„ 1½ Fuss hoch	— 10
* funebris Endl. 11 Fuss hohe schöne Pyramiden	16 —
„ 6 Fuss hoch	6 —
„ 1½ Fuss hoch	— 15
„ vera Fort. 1½ Fuss hoch	China. — 25
„ 3—4 Fuss hoch	3 15
glauca pendula. 1 Fuss hoch	— 12
* Goveniana Gord. 1—1½ Fuss hoch	— 20
* Knightiana Hort. (C. elegans Hort.) 2—4 Fuss hoch	20 Gr. a 1 10
„ 1—1½ Fuss hoch	— 10
Lawsoniana Murr. 3—4 Fuss hoch, 1½ Fuss Durchmesser. Die schönste Cypressse für das freie Land. Völlig hart.	Californien. 3 —
„ 2—2½ Fuss hoch, 1½ Fuss Durchm., in T.	1 10
„ argentea glaucescens. 1 Fuss hoch	2 —
„ compacta. Zwergart. 9—12 Zoll hoch, 4—5 Zoll Durchm.	1 —
„ fol. aureo varieg. Standish. ¾—1 Fuss hoch	1 10
„ var. erecta (stricta) Hort. 2—3 Fuss hoch	2 a 3 —
„ glaucescens Sieb. Neu! Junge Veredlungen	2 —
Lindleyi Klotzsch. variegata Hort. (C. Lindleyi spiculis albis Geitner.). Junge Veredlungen	— 20
* lusitanica Mill. Junge Veredlungen	Goa. Portugal — 10
† Mac Nablana Murr. (C. glandul. Hook) 2—3 Fuss hoch	Californien 20 Gr. a 1 —
* macrocarpa Hartw. (C. Lambertiana Hort. C. Reinwardti Hort.) 4 Fuss hoch	2 —
thyoides u. C. thyoides variegata, vide Chamacyparissphaeroidea.	
* torulosa (C. nepalensis Loud.) 4—5 Fuss hoch	Bootan. Nepal 2 10
„ 2—3	— 25
„ majestica Hort. (C. majestica Knight). 2½—3 Fuss hoch	2 —
Uhedana. 3 Fuss hoch	— 25
* Whitleyana Hort. (C. australis Hort.) 2¼ Fuss hoch	Himalaya 1 —

**Fitz-Roya.**

patagonica Hook fil. 6—7 Zoll hoch	— 25
------------------------------------	------

**Frenela Mirbel.**

† australis Mirb., junge Pflanzen	— 20
† ericoides Hort. 1 Fuss hoch	— 8
† glauca Mirb., 1 Fuss hoch	Neu-Holland — 12
macrostachya. 1¼—¾ Fuss hoch	— 12
† rhomboidea Endl. ½—¾ Fuss hoch	Neu-Holland — 12
triquetra Spach. (F. Ventenatii Mirb.). Junge Veredlungen	Neu-Holland — 20

**Glyptostrob.**

* heterophyllus Endl. (Taxodium mucronatum Hort.) 5 Fuss hohe Pflanzen	China 3 10
† pendulus Endl. (Taxodium distichum sinense Loud.) T. sinense pendulus Forbes. (T. dist. nutans Loud.) 2 Fuss hoch	China. Japan 1 10

**Juniperus Wachholder.**

* Bermudiana L. 12 Fuss hoch, in Kübeln	Bermuda-Inseln 12 —
caesia Carr. (I. fragrans Hort. angl.) ¾—1 Fuss hoch	Nördl. Europa — 20
* chinensis L. (I. nepalensis Hort.) ¾—1½ Fuss hoch	China — 15
* communis L. var. suecica. 4—5 Fuss hoch, in Körben	Europa 1 15
„ L. var. chrysoleuca Hort. gall. 1—2 Fuss hoch	1 —
„ var. hibernica Lodd. (I. pyramidalis Hort.) 3 F. hoch u. 8 Z. Durchm., in Körb.	1 20
„ 2—2½ Fuss hoch, in Töpfen	— 20
„ compressa. Zwergart. Junge Veredlungen	— 20
drupacea Labill. (Arceuthos drupacea Ant. et Kotschy.) 1½—2 Fuss hoch.	Syrien — 20
excelsa Bieb. b. nana Endl. Syn. (I. religiosa Royle) 1½—2 F. hoch, in Töpfen.	Himalaya 1 —
gigantea Roezl. Junge Veredlungen	Mexico — 12
† glauca Hort. Cels. (non. I. glauca Willd.) 1—1½ Fuss hoch	— 20
japonica Carr. (I. procumbens Sieb.) 1—1½ Fuss hoch	Japan — 20
nana Willd. (I. comm. nana Baumg.) ½—1 Fuss hoch	— 20
oblonga Biebrst. (I. interrupta Wendl.) ¾ Fuss hoch	Caucasus — 20
occidentalis Hook. (I. excelsa Lewis.) Junge Pflanzen	Westl. Nordamerika — 10
oxycedrus var. echinoformis Hort. ¾—1 Fuss hohe Veredlungen	Syrien. Bosporus — 20



**Juniperus Wachholder.**

	Thlr.	Gr.
phoenicea L. 1½–2 Fuss hoch . . . . . Südeuropa	15	Gr. a 1 —
prostrata Pers. Der kriechende Wachholder. 1 Fuss hoch 6 Zoll Durchmesser, im L. Am Huronsee, Missouri	—	15
pseudo-sabina Fisch. ¼–½ Fuss hoch . . . . . Altai	—	12
rigida Sieb. et Z. (non. I. oblonga pend. Hort.) ¾–1 Fuss hoch . . . . . Japan. China	15	a — 20
sabina L. s. vulgaris. 2 Fuss hoch . . . . .	—	15
„ albo var. 2½ Fuss hoch und 1½ Fuss Durchmesser . . . . .	—	25
„ cresspessifolia. 1½–2 Fuss hoch. . . . .	1	10
sabinoides (I. tamariscifolia Spach.) 3–4 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in Körben . . . . .	2	15
sphaerica Lindl. (I. Fortunei v. H.) 1½–2 Fuss hoch . . . . . Nord-China	15	Gr. a — 25
squamata Don. (I. dumosa Hort.) 2 Fuss hoch . . . . . Nepal	1	— 20
tripartita. ¾ Fuss hoch . . . . .	—	20
virginiana L. 2–3 Fuss hoch, 1¼–1½ Fuss Durchmesser, in Körben . . . . .	—	25
„ var. cinerascens. 2–2½ Fuss hoch . . . . .	1	15
„ dumosa (I. Schottii Hort.) 5–8 Zoll hoch . . . . .	—	20
„ fol. arg. var. Junge Veredlungen . . . . .	—	20
„ pendula (I. viridis pend.) 2½ Fuss hoch . . . . .	2	—
„ pyramidalis. 3 Fuss hoch . . . . .	1	—

**Libocedrus Endl.**

† chilensis Endl. ¼–1 Fuss hoch . . . . .	1	10
† chilensis viridis Hort. 3–4 Fuss hoch, 1½ Fuss Durchmesser . . . . .	4	—
* Doniana Endl. (Thuja Doniana Hook.) 2½ Fuss hohe gedrunen gebaute Pyramide . . . . .	25	—
* tetragona Endl. . . . .	—	15

**Taxodium Rich. Die Sumpfpresse.**

distichum Rich. 5–6 F. hohe schöne Pyramiden. Aus dem Lande. Virginien. Louisiana	—	25
„ nanum Carr. 2 Fuss hoch . . . . .	—	25
mexicanum Carr. (T. pinnatum Hort.) 9½–10 Fuss hoch, in K. . . . .	6	—

**Thuja Lin. Der abendländische Lebensbaum. Sibirien. Nordamerika.**

plicata Don. 1–1½ Fuss hoch . . . . .	—	12
„ Warreana Hort. 3–5 Fuss hoch und 2–3 Fuss Durchmesser, in Körben . . . . .	3	a 4 —
occidentalis L. 9–10 Fuss hoch, in Kübeln . . . . .	3	—

**Varietäten von Thuja occidentalis:**

aureo variegata. ½–¾ Fuss hoch . . . . .	—	15
canadensis nana Hort. (Th. occid. deusa Gord ?) 1½–2 Fuss hoch . . . . .	—	15
cristata Hort. 1 Fuss hoch . . . . .	—	15
elegantissima Hort. angl. (non Th. aurea Roll.) ¾–½ Fuss hoch . . . . .	—	15
Lawsoniana Broul. Neu! Junge Veredlungen . . . . .	1	15
macrocarpa. 3–6 Fuss hoch, in Töpfen . . . . .	25	Gr. a 1 10
nana. 1½ Fuss hoch . . . . .	—	26
triangularis Hort. van Houtte. 6–8 Zoll hoch . . . . .	—	20
Vervaeana Hort. v. Geert. ½ Fuss hoch . . . . .	—	10
† gigantea Nutt. (Libocedrus decurrens Torr., Thuja Craigiana Jeffer.) 5–6 Fuss hohe, buschige pyramidale Pflanze, in K. . . . . Westl. Nordamerika.	5	a 6 —
japonica. 1–1½ Fuss hoch . . . . .	—	1 5
† Menziesii Dougl. (Thuja Lobli Hort.) 2–2½ Fuss hoch . . . . . Nordwestl. Californien	1	10
pygmaea Veitch., vide Chamaecyparis obtusa pygmaea Gord. . . . .	—	—
sp. Nord-West-Canada vide pag. 6. Junge Veredlungen . . . . .	2	—

**Thujopsis Sieb. et Zucc.**

borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis Spach. . . . .	—	—
† dolabrata Sieb. et Zucc., ½–1 Fuss hoch . . . . .	2	—
† „ fol. varieg. Fort. ¾–1 Fuss hoch . . . . .	4	—
* laetevirens Lindl. Zweijährige Stecklingspflanzen . . . . .	1	20
* Standishii Gord. ½–¾ Fuss hoch . . . . .	4	—

**Widdringtonia.**

* cupressoides Endl. 1½–1½ Fuss hoch . . . . .	1	—
juniperoides Endl. (Frenela capensis Hort.) 1 Fuss hoch . . . . .	—	10

**b. Sequoieae.****Arthrotaxis Don.**

* Cupressoides. Junge Stecklingspflanzen . . . . . Tasmanien	1	15
* imbricata „ . . . . .	1	15
* Gunneana Hort. Junge Veredlungen . . . . .	1	20
* Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. ½ Fuss hohe Samenpflanzen. . . . . Insel Nipon	3	10

**Sequoia Endl.**

gigantea Endl. (Wellingtonia gigantea Lindl., Sequoia Wellingtonia Seem.) 4–5 Fuss hoch, 2–3 Fuss Durchmesser, in K. . . . . Ober-Californien	8	a 10 —
„ 2–2½ Fuss hoch, 1½ Fuss Durchmesser, in T. . . . .	2	15
„ fol. aur. var. Junge Zweigveredlungen . . . . .	4	—
„ glauca Hort. 2–3 Fuss hoch, 2½ Fuss Durchmesser, in T. . . . .	6	a 8 —
Lawsonia. Junge Veredlungen. ½–1 Fuss hoch . . . . .	3	—

**Wellingtonia gigantea Lindl., vide Sequoia gigantea Endl.****II. ABIETINEAE.****Abies. Weiss- oder Silbertanne, Tanne.**

amabilis Forbes. 1 Fuss hoch . . . . . Westl. Nordamerika	3	—
† bracteata Hook. et Arn. 2½ Fuss hoch, 2½ Fuss breit . . . . . Californien	20	—

	Thlr.Gr.
<i>cephalonica</i> Loud. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. . . . .	Cephalonien — 15
„ <i>parnassica</i> (A. Apollinis <i>Link</i> ) $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen. . . . .	Griechenland — 15
„ <i>arcadica</i> (Ab. Reginae <i>Amalia</i> und A. <i>peloponnesica</i> <i>Hort.</i> ) $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	Arcadien — 15
<i>cilicica</i> <i>Ant. et Kotschy</i> . $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K. . . . .	Klein-Asien 1 —
<i>firma</i> <i>Sieb. et Zucc.</i> (Pinus <i>bifida</i> <i>Antoine</i> ) $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	6 a 7 —
<i>Fraserii</i> , <i>Lindl.</i> 1— $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanze . . . . .	Carolina. Pennsylvanien 1 —
„ var. <i>Hudsonica</i> , 4 Fuss hoch, $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . .	15 —
<i>grandis</i> <i>Lindl.</i> 2 Fuss hoch, 1 Fuss Durchmesser . . . . .	Nördl. Californien 3 —
„ 2 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . .	6 —
<i>Kaempferii</i> <i>Lindl.</i> , vide <i>Pseudo-Larix Kaempferii</i>	
† <i>lasiocarpa</i> <i>Lindl.</i> (Picea <i>Lowiana</i> <i>Gord.</i> , Picea <i>grandis</i> <i>Lobb.</i> ) Eine der schönsten neu eingeführten Silbertannen. $3\frac{1}{2}$ Fuss hohe schöne Exmpl. . . . .	Westl. Nordamerika 16 —
<i>nobilis</i> <i>Lindl.</i> 5 Fuss hoch, 3 Fuss breit. Prachtexemplare in K. . . . .	Columbiafluss 50 —
„ 2—3 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K. . . . .	12 —
<i>Nordmanniana</i> <i>Link.</i> 5—6 Fuss hoch, 5 Fuss Durchm.; Prachtexemplare in K. . . . .	Kaukasus 50 —
<i>pectinata</i> <i>DC.</i> (Ab. <i>excelsa</i> <i>Link.</i> , Picea <i>pectinata</i> <i>Loud.</i> ) . . . . .	Mittelenropa — 3
„ var. <i>pyramidalis</i> <i>Hort. Sénécalze</i> . Junge Veredlungen . . . . .	— 15
<i>Pichta</i> <i>Forb.</i> (Ab. <i>sibirica</i> <i>Ledeb.</i> , Picea <i>Pichta</i> <i>Loud.</i> ) $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	Sibirien — 10
† <i>Pinsapo</i> <i>Boiss.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K. . . . .	Granada 5 —
„ $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ Fuss Durchm., in K. . . . .	3 a 4 —
„ <i>pendula</i> . $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . .	1 10
van <i>Couvers</i> Island. $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch. Junge Veredlungen . . . . .	1 —
<i>Webbiana</i> <i>Lindl.</i> (Ab. <i>spectabilis</i> <i>Spach.</i> ) 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	Himalaya 7 a 8 —
<b>Cedrus</b> <i>Link.</i> Ceder.	
† <i>atlantica</i> <i>Manetti</i> . (C. <i>argentea</i> <i>Hort.</i> ) 5—6 Fuss hoch . . . . .	Atlas 2 15
† <i>Deodara</i> <i>Loud.</i> Himalaya-Ceder. 4— $4\frac{1}{2}$ Fuss Höhe, 3— $3\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser. . . . .	
„ Prachtexemplare, in K. . . . .	3 —
„ <i>crassifolia</i> <i>Hort.</i> 3— $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K. . . . .	2 15
„ <i>robusta</i> <i>Hort.</i> (C. <i>Deod. gigantea</i> ) $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch . . . . .	2 15
† <i>Libani</i> <i>Barrel.</i> Die Libanon-Ceder, 5—6 Fuss hoch, in T. . . . .	2 15
<b>Larix</b> <i>Link.</i> (Pinus <i>Larix</i> L. Lärchenbaum, Lärche.)	
<i>japonica</i> <i>Carr.</i> (= <i>L. leptolepis</i> <i>Gord.</i> ) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. . . . .	2 —
<i>Kaempferii</i> <i>Lindl.</i> , vide <i>Pseudo-Larix Kaempferii</i> <i>Gord.</i>	
<i>microcarpa</i> <i>Poir.</i> (Lar. <i>americ. rubra</i> <i>Loud.</i> , Pinus <i>Larix rubra</i> <i>Marsh. Arb.</i> ) 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	Nordamerika 8 —
<i>pyramidalis</i> <i>Salisb.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K. . . . .	1 —
<b>Picea</b> , Pechtanne, Schwarztanne, Rothanne, Fichte.	
<i>acicularis</i> . 2jährige Sämlinge . . . . .	25 —
<i>ajanensis</i> <i>Fisch.</i> var. <i>japonica</i> . 4—6 Zoll hoch . . . . .	25 —
<i>Alcocquiana</i> <i>Lindl.</i> Sechsjährige Samenpflanzen . . . . .	Insel Nipon 12 —
„ Dreijährige . . . . .	4 —
<i>excelsa</i> <i>Link.</i> (Abies <i>excelsa</i> <i>Loud.</i> ) . . . . .	Europa — 3
„ <i>clanbrasiliana</i> <i>Loud.</i> (Abies <i>clanbrasiliana</i> <i>Hort.</i> ) Einen niedrigen compacten Busch bildend. 2 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K. . . . .	6 —
„ <i>cylindrica</i> <i>Braul.</i> Junge Veredlungen . . . . .	2 —
„ <i>dimosa</i> <i>Braul.</i> Junge Veredlungen . . . . .	2 —
„ <i>elegans</i> . 2 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, im L. . . . .	3 —
„ <i>tenuifolia</i> <i>Braul.</i> Junge Veredlungen . . . . .	2 —
„ <i>inverta</i> <i>R. Smith.</i> Zweige herabhängend. $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen, in K. . . . .	4 —
„ <i>monstrosa</i> <i>Loud.</i> 2 Fuss hoch, $\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser, im L. . . . .	1 15
„ <i>nana</i> . Erreicht nur eine Höhe von 3—4 Fuss. $2\frac{1}{2}$ F. hoch u. $2\frac{1}{2}$ F. Durchm., in K. . . . .	10 —
„ <i>pendula</i> <i>Loud.</i> 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K. . . . .	1 20
„ <i>pygmaea</i> <i>Loud.</i> Wird kaum 2 Fuss hoch. Junge Veredlungen . . . . .	1 —
„ <i>pyramidata</i> (Abies <i>excelsa pyramidalis</i> <i>Hort.</i> ) $2\frac{1}{2}$ —3 F. hoch, 2— $2\frac{1}{2}$ F. Durchm., in K. . . . .	3 —
<i>Khutrow</i> <i>Carr.</i> (Pinus <i>Khutrow</i> <i>Royle</i> , Abies <i>Khutrow</i> <i>Loud.</i> , Abies <i>Smithiana</i> <i>Forb.</i> , Picea <i>Morinda</i> <i>Link.</i> , Pinus <i>polita</i> ? <i>Sieb.</i> ) Die Himalaya-Fichte. 1 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K. . . . .	Himalaya. Japan. 1 10
<i>Menziesii</i> <i>Carr.</i> (Abies <i>Menziesii</i> <i>Loud.</i> ) $3\frac{3}{4}$ Fuss hoch, 2 Fuss breit . . . . .	4 —
<i>nigra</i> <i>Link.</i> (Abies <i>Mariana</i> <i>Mill.</i> ) 3 Fuss hoch, 2 Fuss Durchm., im L. . . . .	2 —
„ var. <i>Mariana alba</i> <i>Hort.</i> $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . .	— 25
„ <i>nana</i> . 5—6 Zoll hoch . . . . .	3 —
<i>orientalis</i> <i>Link.</i> 3— $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K. . . . .	2 —
„ 3— $3\frac{1}{2}$ „ „ im freien Lande . . . . .	1 15
„ <i>glauca</i> <i>Braul.</i> Junge Veredlungen . . . . .	2 —
<b>Pinus</b> L. Kiefer, Föhre.	
<i>austriaca</i> <i>Tratt.</i> . . . . .	Oesterreich. Ungarn. — 10
„ 3—4 Fuss hoch und ebenso breit, in K. . . . .	— 25
<i>Cembra</i> L. Die Alpenkiefer. 4— $4\frac{1}{2}$ F. Höhe u. 2— $2\frac{1}{2}$ F. breit, in K. . . . .	Alpen, Karpathen. 2 —
„ 3— $\frac{3}{2}$ „ „ $1\frac{1}{2}$ —2 „ . . . . .	1 10
„ <i>sibirica</i> <i>Loud.</i> (P. <i>mandschurica</i> <i>Hort.</i> ) $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ F. hoch. . . . .	Oestl. Sibirien. 3 —
† <i>koraiensis</i> <i>Sieb. et Zucc.</i> 6 Zoll hoch . . . . .	Korea. — 25
* <i>leptophylla</i> <i>Schied. et D.</i> (P. <i>dependens</i> <i>Roosli</i> .) 2 Fuss hoch . . . . .	2 —
„ 3 Fuss hoch . . . . .	3 —
* <i>lophosperma</i> <i>Lindl.</i> Nadeln lang u. breit. 1— $1\frac{1}{2}$ F. hohe Samenpfl. . . . .	Nieder-Californien. 2 —





		Thlr. Gr.
* excelsa R. Br.	10½ F. hohe u. 6 F. breite Prachtexemplare.	Insel Norfolk. 80 —
	5—6 " " 6 " " "	40 —
	4¾—5 " " 4—4½ F. br. " " "	35 —
	2—3 " " 3 F. breite " " "	24 —
	Stecklingspflanzen, gut bewurzelt . . . . .	3 a 4 —
"	fol. var. . . . .	— —
	glauca. 5½ Fuss hohe Prachtpflanzen . . . . .	60 —
* glauca,	steht zwischen A. Cunninghamii u. A. excelsa. ¾ Fuss hoch	4 —
† imbricata Pav.	4—5 Fuss hohe, 4—5 Fuss breite Prachtexemplare	Chili. 24 —
	3 " " 2½ " " "	12 —
	2—2½ " " u. gleichem Durchmesser " " "	4 —
	multiceps . . . . .	— —
Rulei Müller.	¾ Fuss hohe schöne Samenpflanzen.	Neu-Calcedonien. 15 —
<b>Dammara Rumph.</b>		
* australis Lamb.	Einjährige Veredlungen . . . . .	Neu-Seeland. — 25
	4 Fuss hoch u. 3 Fuss breit . . . . .	10 —
* hypoleuca.	Neu! . . . . .	2 —
* macrophylla Lindl.	(D. lanceolata Hort.) . . . . .	Charlotten-Inseln. 1 10
	4 Fuss hoch u. 3 Fuss breit . . . . .	10 —
* Moorei Lindl.	Junge Veredlungen . . . . .	Neu-Calcedonien. 1 10
* obtusa Lindl.	(D. Brownii Hort.) Junge Veredlungen . . . . .	Nene Hebriden. 1 10
	12 Fuss hoch u. 5 Fuss breit . . . . .	50 —

### III. PODOCARPEAE.

**Dacrydium** *Soland.*

* cupressiforme <i>Corr.</i>	Neu-Seeland	1
* cupressinum <i>Soland.</i> Junge Stecklingspflanzen	Neu-Seeland	— 15
* elatum <i>Well.</i> 3 Fuss hoch	Ostindien	8
2 Fuss hoch		4
* Franklinii <i>Hook. fl.</i> 2 Fuss hoch	Tasmania	5
<b>Podocarpus</b> <i>Hérit.</i>		
* Nageia latifolia <i>Gord.</i> ( <i>Podocarpus zamiaefol. Hort. belg., Podocarpus latifolia Wall.</i> )		4
1 Fuss hoch		2
* andina <i>Poepp.</i> ( <i>P. spicata</i> ) 2½ Fuss hoch	Südl. Chili	— 25
chinensis <i>Wall.</i> ( <i>P. Makl Sieb. et Zucc.</i> ) Junge Stecklingspflanzen	China, Japan	6
* elongata <i>Hér.</i> ( <i>P. mucronata Hort.</i> ) 7½ Fuss hoch	Cap	2
5 Fuss hoch		3
* Koraiana <i>Sieb.</i> ( <i>Taxus japonica Lodd.</i> ) 6 Fuss hoch	Japan	1
2½ Fuss hoch		1
* laeta <i>Hoibr.</i> 4½ Fuss hoch	Oestl. Neuhoiland	1
3 Fuss hoch		— 20
* nubigena <i>Lindl.</i> ( <i>Saxe-Gothaea gracilis Hort.</i> ) 2jährige Stecklingspflanzen	Chili	3
* nerifolia <i>R. Br.</i> ( <i>B. macrophylla Wall.</i> ) 4—6 Fuss hoch	Nepal	2
3 Fuss hoch		1
1 Fuss hoch		
* nucifera, vide <i>Torreya nucifera.</i>		
* Purdieana <i>Hook.</i> ( <i>P. jamaicensis Hort.</i> ) 1—2 Fuss hoch	Jamaica.	1
* salicifolia <i>Klotzsch. et Karst.</i> ( <i>P. Purdieana Hort. non Hook.</i> ) 2—3 Fuss hoch.	Columbien	10
Thunbergii <i>Hook.</i> luteo variegatis. 1 Fuss hoch		4
* Totara <i>Don.</i> 8 Fuss hoch	Neu-Seeland	— 20
2—3 Fuss hoch		— 10
1—1½ Fuss hoch		
zamiaeifolius, vide <i>Nageia latifolia.</i>		
<b>Saxe-Gothaea</b> <i>conspicua.</i> 2—3 Fuss hohe Pflanzen.	Patagonien	1
gracilis, vide <i>Podocarpus nubigena.</i>		

#### IV. TAXINEAE.

**Cephalotaxus** Sieb. et Zucc.

* <i>drupacea</i> Sieb. et Zucc. (Cephalot. Fortunei foemina Hort., Taxus japonica Hook.)	Japan 3 à	4 —
4 Fuss hoch		
* <i>Fortunei</i> Hook. (C. Fortunei masc. Hort.) 2½ F. hohe schöne Pflanzen	China	1 10
foemina Hort., vide Cephalot. drupacea.		
<b>Phyllocladus</b> L. C. Richard.		
* <i>asplenifolia</i> Hook. (Phyll. rhomboidalis L. C. Rich.) 5 Fuss hoch		4 —
* <i>trichomanoides</i> Don. 3 Fuss hoch	Neu-Seeland	1 10
var. <i>viridis</i> Hort. 5 Fuss hoch		3 —
<b>Prumnopitys</b> elegans Phil. Kirschenfruchtige Elbe. ¾ Fuss hoch.	Chili, Prov. Valdivia	2 —
<b>Salisburia</b> Smith.		
<i>adiantifolia</i> Smith. (Ginko biloba L.) 1—1½ Fuss hoch	China, Japan	— 10
" fol. aureo varieg. ½—1 Fuss hoch		— 20
" incisa lacinolata Hort. Zweijährige Veredlungen. 1—1½ Fuss hoch		— 20
" var. <i>macrophylla</i> Reynier	1—2	— 20

**Taxus Turn.**

Thlr.Gr.

† adpressa Knight. (T. parvifolia Wenderth., Cephalotaxus tardiva Sieb. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Japan	— 10
baccata L. $3\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch, 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss breit	Europa	1 10
„ fructu luteo. 2—3 Fuss hoch		— 20
„ aureo variegata. 3—4 Fuss hoch		— 25
„ var. erecta (pyramidalis Hort.) $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss, in K.		— 25
„ var. Nidpathensis. 1—2 Fuss hoch. Pflanzen in T.		1 —
„ var. Dovastonii (T. pendula Hort., T. horizontalis Hort.) 5 Fuss hoch		1 20
„ 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch		— 25
„ ericoides (T. ericoides Hort.) Zwergtaxus. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch		— 15
„ pyramidalis Hort. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K.		1 —
hibernica Hook. (T. baccata fastigiata Loud., T. fastigiata Lindl. et Gord.) $3\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch. Schöne Pyramiden im freien Lande	Irland	1 15
„ $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch. Schöne Pyramiden		1 —
„ fol. argenteo var. $1\frac{1}{4}$ —2 Fuss hoch		— 20
„ „ albo marginatis (T. elegantissima Hort. Angl.) $1\frac{1}{2}$ F. hoch, in K. Sehr schön!		2 —

**Torreya Arnth.**

grandis Fort. 1 Fuss hohe schöne Pflanzen	Nördl. China	1 —
* myristica Hook. fl. Muskatnuss-Eibe	Californien	4 —
nucifera Sieb. et Zucc.	Nipon	2 15

Aus vorstehenden reichhaltigen Collectionen liefern wir nach unserer Auswahl:

25 distincte Arten für	7 Thlr.
50 „ „ „	13 „
100 „ „ „	22 „

**b. Coniferen,**

in Sämlingen, jungen Veredlungen und Stecklingspflanzen, mit genauer Angabe ihres Alters oder ihrer Stärke.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Conifères. Plantes de graines, de boutures et de greffes à la désignation exacte de leur âge, ou de leur force.

Cultivés en pots.

(Fuss signifie pied, Zoll signifie pouce.)

	Anzahl. Nombre.			
	1	12	25	50
Thlr. Gr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.
<b>Abies</b> vide auch <i>Picea</i> und <i>Tsuga</i>				
„ Apollinis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5		
„ bracteata. Junge Veredlungen. Selten!	8			
„ cephalonica, $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
„ cilicica, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
„ firma, (A. bifida Ant.) $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	6			
„ 1	7			
„ Fraserii, $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	1	6	12	
„ grandis, 4—6 Zoll hoch	1			
„ lasiocarpa, (Lowii) $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Sämlinge	3			
„ 1—2 Fuss hoch	4			
„ nobilis, $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Sämlinge	1			
„ Nordmanniana, 1jährige Sämlinge	— 5	2	$3\frac{1}{2}$	6
„ $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Sämlinge	— 15			
„ pectinata var. pyramidalis, junge Veredlungen	— 15			
„ „ Reginae Amalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
„ Pichta, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 10			
„ Pinsapo, 1— $1\frac{1}{4}$ „	— 25	6	12	24
„ 100 Stück 40 Thlr.				
„ var. pendula, 2jährige Veredlungen. Neu!	1 10			
„ Herbstveredlungen	— 20			
„ Webbiana, $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen	3 —			
„ Herbstveredlungen	— 15			
<b>Araucaria brasiliensis</b> , 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 20	6	11	20
„ 100 Stück	36			
„ 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	1	10		
„ var. gracilis, 1 Fuss hoch	6			
„ Cookii, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	4			
„ 3 Fuss hohe Samenpflanzen	12			
„ Cunninghamii, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen	5			
„ excelsa, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen	3 a	5		

		Anzahl. Nombre.			
		1	12	25	50
		Thlr. Gr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.
<b>Araucaria</b>	glauca, steht zwischen A. Cunninghamsi u. A. excelsa, $\frac{3}{4}$ F. hoch	4	—	—	—
"	imbricata, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe gesunde Samenpflanzen	—15	5 $\frac{1}{2}$	10	18
"	Rulei, $\frac{3}{4}$ Fuss hohe u. 10 Zoll breite Samenpfl., mehrjährig cultivirt	15	—	—	—
<b>Athrotaxis</b>	cupressoides, junge Stecklingspflanzen	1 15	—	—	—
"	Gunneana, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 20	—	—	—
"	imbricata, junge Stecklingspflanzen	1 15	—	—	—
<b>Biota</b>	aurea, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—12	4 $\frac{1}{2}$	9	18
"	falcata, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—20	6	12	—
"	filiformis, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—12	—	—	—
"	Fortunei glauca, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch. Neu!	—25	8	—	—
"	gracilis. Junge Veredlungen	—10	—	—	—
"	Meldensis, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	—15	3 $\frac{1}{2}$	6	—
"	$\frac{1}{2}$ —1 " " " "	—6	2	—	—
"	monstrosa. Junge Veredlungen	—10	—	—	—
"	orientalis compacta, 2 Fuss hohe Samenpflanzen	—10	3	—	—
"	fol. arg. varieg. $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	1	—	—	—
"	fol. aureo var. $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen	—12	—	—	—
"	var. glauca, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—25	8	—	—
"	pygmaea (R. Smith), 1 Fuss hohe Veredlungen	—20	—	—	—
"	(Veitch.), junge Veredlungen	1	—	—	—
"	recurva nana. Neu! $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—25	8	—	—
"	Wallichii, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—25	—	—	—
"	Junge Veredlungen	—8	—	—	—
"	Zuccarini, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—15	—	—	—
"	$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—20	—	—	—
<b>Callitris</b>	quadrivalvis, $\frac{2}{3}$ Fuss hoch	—20	—	—	—
<b>Cedrus</b>	atlantica, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—15	—	—	—
"	Libani, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	15	—	—	—
<b>Cephalotaxus</b>	Fortunei, 1—2 Fuss hoch	—20	7	—	—
"	$\frac{1}{2}$ —1 " " " "	—15	—	—	—
"	drupacea, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—12	4	8	—
<b>Chamaecyparis</b>	nutkaensis, 2—3 Fuss hoch	1 10	—	—	—
"	fol. alb. var. Junge Veredlungen	—20	—	—	—
"	glauca, 2—3 Fuss hoch	2	—	—	—
"	$\frac{3}{4}$ " " " "	—25	—	—	—
"	obtusa, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	—20	6	—	—
"	2jährige Stecklingspflanzen	—12	—	—	—
"	pisifera, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—25	8	—	—
"	$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ " " " "	—10	3	6	—
"	aurea, 4 Zoll hoch	—20	—	—	—
"	Junge Veredlungen	—10	—	—	—
"	sphaeroidea, 1 Fuss hoch	—15	5	10	—
"	varieg., $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—12	4	—	—
"	var. glauca, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—25	—	—	—
"	Junge Veredlungen	—10	—	—	—
<b>Cryptomeria</b>	japonica var. Lobbi, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—8	3	5	10
"	var. nana, junge Veredlungen	—10	—	—	—
"	fol. varieg., $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—20	—	—	—
"	Junge Veredlungen	—10	—	—	—
"	araucaroides, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Veredlungen	—25	—	—	—
"	elegans. Neu! 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hoch	1	—	—	—
"	Junge Stecklingspflanzen oder Veredlungen	—15	—	—	—
<b>Cupressus</b>	Correyana (C. gracilis) 1 Fuss hoch	—15	—	—	—
"	fastigiata, 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—10	—	—	—
"	funeris vera, 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—15	—	—	—
"	glauca pendula (Goa-Ceder), 1 Fuss hoch	—12	4	—	—
"	Goveniana, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—20	—	—	—
"	Knightiana, 3—4 Fuss hoch	—20	—	—	—
"	1—1 $\frac{1}{2}$ " " " "	—10	—	—	—
"	Lawsoniana, 2 Fuss hohe Samenpflanzen, Freiland	—15	5	10	18
"	100 Stück 30 Thlr.	—	—	—	—
"	2—2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	1 10	12	20	—
"	1—1 $\frac{1}{2}$ " " " " im Lande	—10	3	6	—
"	argenteo glaucescens. Junge Pflanzen	1	—	—	—
"	fol. aureo var., junge Veredlungen. Neu!	—15	—	—	—
"	var. compacta, 2jährige Stecklingspflanzen	—8	3	—	—
"	var. erecta, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—25	8	16	—
"	$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen	—8	5	10	18
"	lusitanica, 1 Fuss hoch	—10	—	—	—
"	Mac Nabiana, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—8	—	—	—
"	torrulosa, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen	—12	—	—	—
"	majestica, 1 Fuss hoch	—20	—	—	—



		Anzahl. Nombre.			
		1	12	25	50
		Thlr.	Gr.	Thlr.	Thlr.
<b>Cupressus</b>	<b>Uhdeana</b> , 3 Fuss hohe Pflanzen	—	25		
	Whitleyana, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	10	3	
<b>Dacrydium</b>	<b>cupressinum</b> , Junge Stecklingspflanzen	—	15		
	elatum, Stecklingspflanzen	—	1		
	Franklinii, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	15	5	
<b>Dammara</b>	<b>hypoleuca</b> , junge Veredlungen. Neu!	—	2		
	macrophylla ( <i>lanceolata</i> ), junge Veredlungen	—	10		
	Moorei, junge Veredlungen	—	10		
	obtusa ( <i>Brownii</i> ), junge Veredlungen	—	10		
<b>Frenela</b>	<b>ericoides</b> , 1 Fuss hoch	—	8	3	12
	glauca, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	12	4	12
	macrostachya, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	12		
	rhomboidea, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ „	—	12		
<b>Juniperus</b>	<b>caesia</b> , junge Veredlungen. Neu!	—	10		
	chinensis, $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	15		
	chrysoleuca, 1—2 Fuss hoch Neu!	—	1		
	„ Junge Veredlungen	—	10		
	cinerascens, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch. Neu!	—	15		
	drupacea, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	—	20		
	„ Junge Veredlungen	—	8		
	echinoformis, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—	20		
	excelsa ( <i>occident.</i> ), 2jährige Pflanzen	—	10		
	„ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	gigantea, junge Veredlungen	—	12		
	glauca, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	hibernica compressa, 3—4 Zoll hoch. Neu!	—	20		
	japonica, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	nana, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	—	20		
	oblonga, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	20		
	phoenicea, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	15		
	Pseudo-sabina, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	12		
	pyramidalis, Junge Veredlungen	—	8		
	rigida, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	20		
	Sabina fol. albo var., $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	10		
	sabinoides, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	sphaerica, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	15		
	„ Junge Veredlungen oder Stecklingspflanzen	—	10		
	squammata, 2 Fuss hoch	—	1		
	virginiana fol. varieg., junge Veredlungen	—	20		
	„ pendula, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	10		
<b>Larix</b>	<b>Kaempferi</b> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	4		
	microcarpa, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	—	8	3	6 11
	pyramidalis, Neu! $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	1		
<b>Libocedrus</b>	<b>chilensis</b> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—	10		
<b>Picea</b>	<b>Alcoquiana</b> , 3jährige Samenpflanzen	—	4		
	excelsa elegans, Junge Veredlungen	—	20		
	„ pendula, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	„ pygmaea, junge Veredlungen	—	1		
	excelsa pyramidata, $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20		
	Menziesii, 2 Fuss hoch	—	1		
	nigra, 2 Fuss hoch	—	20	7	
	nigra nana, Junge Veredlungen	—	1		
	orientalis, 3—4 Fuss hoch, im Lande	—	15	12	24 48
<b>Pinus</b>	<b>Banksiana</b> , Neu! $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	2		
	Buonapartei ( <i>P. Veitchii</i> ), 2 Fuss hoch	—	15		
	Bungeana, $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	2		
	canariensis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen	—	10	3	6 12
	Cembra sibirica, $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	3		
	Coulteri, 8 Zoll hoch	—	1		
	Devoniana, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	10		
	„ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	2		
	densiflora, 2jährige Samenpflanzen. Neu!	—	2		
	„ $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	5		
	excelsa, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen, buschig	—	15	5	10 20
	filifolia, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	3		
	Hartwegi, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	—	3		
	Inops, $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	25		
	insignis, 2—3 Fuss hohe Samenpflanzen	—	1	10	
	Jeffreyi, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	—	1		
	Korraiensis, $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	25		
	lophosperma, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	2		
	Loudoniana, 2 Fuss hohe Samenpflanzen	—	2		

	Anzahl. Nombre.			
	1	12	25	50
	Thlr. Gr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.
<b>Pinus macrophylla</b> , $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	2	—	—	—
„ <b>maritima</b> ( <i>P. Brutia</i> ), $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	—	—	—
„ <b>muricata</b> , 5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 25	—	—	—
„ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 20	—	—	—
„ <b>Massoniana</b> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	— 15	4	8	15
„ <b>Montezumae</b> ( <i>P. Endlicherii tongifolia</i> ), 2 Fuss hoch	3	—	—	—
„ <b>parvifolia</b> , 2jährige Samenpflanzen	— 15	—	—	—
„ <b>Peuce</b> , 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3	6	10
„ <b>ponderosa</b> ( <i>P. Beardsleyi</i> ), 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 10	—	—	—
„ $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	— 20	6	—	—
„ <b>Pseudo-Strobus</b> ( <i>P. Rafaeliana</i> ), 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 10	—	—	—
„ <b>radiata</b> , 2—3 Fuss hoch	— 15	4	8	15
„ <b>Strobus nana</b> tabulaeformis, 4—8 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20	—	—	—
„ <b>tuberculata</b> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5	9	—
„ <b>uncinata rostrata</b> , 1— $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch	— 20	—	—	—
<b>Phyllocladus trichomanoides</b> , junge Stecklingspflanzen	— 12	—	—	—
„ $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	1	—	—	—
„ var. <b>viridis</b> , 1jährige Pflanzen	1	—	—	—
<b>Podocarpus andina</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	1	—	—	—
„ <b>elongata</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 15	—	—	—
„ <b>Korraiana</b> , 1 Fuss hoch	— 20	7	12	—
„ 2jährige Stecklingspflanzen	— 8	2	4	8
„ <b>laeta</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 10	—	—	—
„ <b>neriifolia</b> , 1jährige Stecklingspflanzen	— 10	3	—	—
„ <b>nubigena</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 20	—	—	—
„ <b>Purdieana</b> , 2 Fuss hoch	1 10	—	—	—
„ Junge Stecklingspflanzen	— 20	—	—	—
„ <b>salicifolia</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 15	5	—	—
„ <b>Totara</b> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 10	—	—	—
„ $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 8	—	—	—
<b>Prumnopitys elegans</b> , Neu! $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	2	—	—	—
„ 2jährige Stecklingspflanzen	1	10	—	—
<b>Retinispora leptoclada</b> , junge Stecklingspflanzen	— 10	—	—	—
„ <b>squarrosa</b> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	— 10	3	6	—
„ <b>viridis</b> , $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	—	—	—
<b>Salisburia adiantifol.</b> fol. var., $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 20	7	—	—
„ <b>incisa</b> var. <b>laciniata</b> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	—	—	—
„ <b>macrophylla</b> , 1—2 Fuss hoch	— 20	—	—	—
<b>Saxo-Gothaea conspicua</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 8	2 $\frac{1}{2}$	5	—
„ 2—3 Fuss hoch	1 15	—	—	—
<b>Sciadopitys verticillata</b> , Stecklingspflanzen	2	—	—	—
„ $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	3 10	—	—	—
<b>Sequoia Lawsoni.</b> Junge Veredlungen	1 10	—	—	—
<b>Taxus baccata</b> fol. <b>aureo</b> var., $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	— 8	2 $\frac{1}{2}$	4	—
„ „ $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	6	12	—
„ <b>erecta</b> , 1 Fuss hoch	— 10	3 $\frac{1}{2}$	—	—
„ $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	— 15	—	—	—
„ <b>Dovastonii</b> , 2jährige Pflanzen	— 6	2	—	—
„ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15	—	—	—
„ <b>ericoides</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 15	—	—	—
„ <b>hibernica</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 8	3	6	10
<b>Thuja canadensis nana</b> , $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	— 15	5	—	—
„ $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 10	—	—	—
„ <b>cristata</b> , Junge Veredlungen	— 10	—	—	—
„ <b>elegantissima</b> , $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15	5	—	—
„ <b>gigantea</b> , $1\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 20	6	—	—
„ $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 10	—	—	—
„ $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 10	3	6	—
„ <b>macrocarpa</b> , 1—2 Fuss hoch	— 10	3 $\frac{1}{2}$	—	—
„ <b>Menziesii</b> ( <i>Lobbi</i> ), $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	6	12	—
„ <b>triangularis</b> , 1 Fuss hoch	1	—	—	—
„ Junge Veredlungen	— 20	—	—	—
„ <b>Vervaeana</b> , $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 10	—	—	—
„ Junge Veredlungen	— 8	—	—	—
<b>Thujopsis dolabrata</b> , $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2	—	—	—
„ 1jährige Stecklingspflanzen	— 25	—	—	—
„ fol. <b>arg.</b> var., 2jähr. Stecklingspflanzen	1 10	—	—	—
„ $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	4	—	—	—
„ <b>laetevirens</b> , Stecklingspflanzen	1 20	—	—	—
„ <b>Standishii</b> , 1jährige Stecklingspflanzen	1 20	—	—	—
<b>Torreya grandis</b> , 1 Fuss hoch, gesunde u. kräftige Pflanzen	1	10	20	35
„ <b>myristica</b> , Junge Veredlungen	2	—	—	—
„ <b>nucifera</b> , Junge Veredlungen	1 10	—	—	—

	Anzahl. Nombre.			
	1	12	25	50
<i>Tsuga canadensis</i> , 2—3 Fuss hoch, in K. . . . .	Thlr. Gr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.
„ „ 1½—2 Fuss hoch, im L. . . . .	— 25			
„ Douglasii, 1—1½ Fuss hohe Pflanzen . . . . .	— 12	4	8	15
„ Hookeriana, ¼ Fuss hoch . . . . .	— 8	3	6	
„ Mertensi, 1 Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	1 10			
„ Williamsonii vera, ¼—½ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	— 15	4	8	16
„ „ 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	1 —	10		
<i>Wellingtonia gigantea</i> , ½ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	— 10	4	8	16
„ „ 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . .	1 15	14		
<i>Widdringtonia cupressoides</i> , ½—¾ Fuss hoch . . . . .	— 10	3½	6	
„ juniperoides, 1 Fuss hoch . . . . .	— 10			

## I. BUNTLÄTTRIGE PFLANZEN.

Plantes panachées ou ornées. — Variegated and coloured leaved plantes.

### I. Für's Kalthaus (de serre froide).

Diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.

*Les espèces précédées d'un † sont de pleine terre.*

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Acorus japonicus</i> fol. var. . . . .	— 5	† <i>Buxus arborescens</i> fol. var. . . . .	— 8
<i>Agapanthus umbellatus</i> fol. var. . . . .	— 10	<i>Camellia japonica</i> fol. albo var. . . . .	— 20
<i>Agathea coelestis</i> fol. var. . . . .	— 5	„ myrthifol. luteo var. . . . .	1 —
<i>Agave</i> , americ. aur. marg. 25 Gr. à 40 —		„ Sasanqua fol. var. . . . .	1 15
„ „ striatis 20 Gr. à 40 —		<i>Centaurea candidissima</i> vera . . . . .	— 12
„ in med. aur. pict. 10 à 50 —		„ gymnocarpa . . . . .	— 10
„ longifolia picta 5 à 50 —		† <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> fol. . . . .	
† <i>Alnus glutinosa</i> var. aureis . . . . .	1 20	albo var. . . . .	20 Gr. à 1 10
<i>Althernanthera amoena</i> . . . . .	— 3	† „ obtusa aurea . . . . .	20 Gr. à 2 15
„ spatulata . . . . .	— 3	„ pisifera argentea . . . . .	1 —
„ versicolor. . . . .	— 3	„ „ aurea . . . . .	10 Gr. à 1 10
<i>Alyssum dentatum</i> fol. arg. marg. . . . .	— 8	† „ sphaeroidea var. . . . .	12 Gr. à 7 —
<i>Amaranthus tricolor</i> . . . . .	— 3	<i>Chrysanthemum nanum</i> aur. var. . . . .	— 8
<i>Arabis lucida</i> fol. var. . . . .	— 10	„ Sensation fol. albo varieg. . . . .	— 8
† <i>Arundo Donax</i> fol. var. . . . .	— 15	<i>Cinreraria maritima</i> . . . . .	— 5
(12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.)		(12 Stück 1½ Thlr.)	
† <i>Arundo mauritanica</i> versicolor . . . . .	— 20	§ <i>Cissus heterophyllus</i> fol. var. . . . .	— 10
(6 Stück 3 Thlr.)		§ „ Thunbergi fol. pictis . . . . .	— 6
<i>Astelia Banksi</i> rubro-venio . . . . .	— 12	§ „ „ sanguineis. Neu. . . . .	1 —
† <i>Aubrietia purpurea</i> fol. var. . . . .	— 20	<i>Clethra arborea</i> fol. var. . . . .	— 10
<i>Aucuba japonica</i> bicolor . . . . .	— 15	<i>Cleyera japonica</i> fol. arg. et ru- . . . . .	
„ fol. var. . . . .	— 6	bro var. . . . .	2 15
„ in medio variegata. . . . .	— 2	<i>Cobaea scandens</i> fol. var. . . . .	— 12
„ latimaculata . . . . .	— 10	<i>Cryptomeria japonica</i> fol. var. . . . .	
„ limbata . . . . .	— 3	10 Gr. à 1 —	
„ longifolia aureo-macu- . . . . .		<i>Cupressus Lawsoniana</i> fol. aureis . . . . .	
lata . . . . .	4 —	var. . . . .	15 Gr. à 1 10
„ maculata masc. . . . .	— 2	§ <i>Dactylis glomerata</i> fol. var. . . . .	— 5
„ picta foemina . . . . .	— 1	<i>Deeringia Amherstiae</i> fol. var. . . . .	— 5
<i>Azalea indica</i> Eulalia van Geert, . . . . .		† <i>Deutzia gracilis</i> fol. var. . . . .	— 6
à feuilles panachées . . . . .	— 8	<i>Drimia lanceaefolia</i> . . . . .	1 15
„ indica fol. aur. var. . . . .	— 10	„ marmorata . . . . .	2 —
<i>Bambusa Fortunei</i> fol. niveo vitt. . . . .	— 5	<i>Elaeagnus reflexus</i> var. . . . .	— 15
† <i>Biota orient.</i> fol. arg. var. 12 Gr. à 1 —		„ „ fol. argent. marg. . . . .	1 10
† „ „ „ aur. var. 8 Gr. à — 25		„ „ „ aureis. „ . . . .	1 10
<i>Bletia hyacinthina</i> fol. albo striat. 12 —		<i>Eurya latifolia</i> fol. var. . . . .	1 —



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Evonymus japonic.</b> fol. albo marg. — 10		† <b>Lonicera quercifolia</b> fol. var. — 6	
» <b>japonicus</b> argent. var. . . . — 6		<b>Metrosideros florida</b> fol. var. . — 15	
» » aureis marg. . . . — 10		<b>Myrtus communis</b> fol. var. . . . — 6	
» » » var. . . . — 10		<b>Ophiopogon Jaburan</b> fol. aur. var. — 20	
» » fol. tricoloribus — 10		» spicatum fol. albo striatis . 3 —	
» <b>ovalis</b> fol. in med. aur. pictis — 15		<b>Orontium japonicum</b> fol. var. . — 20	
» <b>radicans</b> fol. argent. marg. — 6		<b>Osmanthus ilicifol.</b> fol. arg. marg. — 8	
» » » roseis » — 8		» fol. aureis marginatis — 8	
» » » pictis . . . . — 10		† <b>Pachysandra termin.</b> fol. alb. var. — 10	
<b>Fagara piperita</b> fol. var. . . . — 20		<b>Pelargonium</b> , vide die buntblät-	
<b>Fragaria vesca</b> fol. var. . . . — 8		terigen Species.	
† <b>Fritillaria imperialis</b> aur. var. . — 15		<b>Pittosporum Tobirae</b> fol. var. . — 10	
<b>Fuchsia aucubaefolia</b> . . . . — 8		<b>Polygonum filiforme</b> fol. arg. var. — 15	
Cloth of Gold . . . . . — 8		<b>Reineckia carnea</b> fol. var. . . . — 6	
corymbiflora fol. var. . . . . — 10		<b>Rhodea japonica macrophylla</b> luteo maculata. Neu! . . . . 1 25	
globosa fol. var. . . . . — 8		» » » albo marg. 1 $\frac{1}{3}$ 5 —	
gracilis fol. rubris marg. . . . — 6		<b>Rhododendron</b> pont. aucubaefol. — 10	
Meteor . . . . . — 6		» ponticum fol. albo var. — 10	
Pillar of Gold. . . . . — 8		» » » aureo » — 8	
<b>Gazania splendens</b> fol. var. . . — 8		<b>Salvia tricolor</b> à feuilles panachées — 5	
§ <b>Hedera rhombea</b> fol. argent. var. — 6		<b>Saxifraga tricolor</b> . . . . . — 8	
† <b>Hemerocallis Kwanse</b> fl. pl. fol. alb. varieg. . . . . 1 10		<b>Sedum carneum</b> fol. var. . . . — 3	
<b>Hydrangea japon.</b> fol. argent. var. — 6		<b>Sieboldii</b> in medio aureo picta — 8	
» fol. elegans macul. . — 15		<b>Sempervivum californicum</b> . . . — 6	
† <b>Ilex aquifolia ferox</b> argent. marg. — 12		<b>Senecio Farfug.</b> (Farfug. grande) — 8	
† » » » aur. marg. . — 10		† <b>Sequoia gigantea</b> fol. aur. var. 4 —	
† » » in medio aur. picta . — 10		<b>Serissa foetida</b> fol. albo marg. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . — 4	
† » » argenteo marg. . . — 12		<b>Sisyrinchium ixioides</b> . . . . — 8	
† » » cupreis pictis . . . — 10		» » var. versicolor — 15	
† » » » elegans argentis marginatis — 10		<b>Smilax maculata</b> . . . . . — 10	
† » » » aureis marginatis — 10		<b>Solanum jasminoides</b> fol. var. . — 10	
† » myrthifolia argenteo marg. — 15		† <b>Taxus baccata</b> aur. var. 5 Gr. à — 25	
<b>Iris foetida</b> fol. var. . . . . — 10		† » hibernica albo marg. . 2 —	
<b>luncus conglom.</b> fol. lut. vittat. — 10		<b>Thujopsis dolabrata</b> fol. var. . 1 10	
† <b>Juniperus virgin.</b> fol. arg. var. — 20		<b>Vaccinium Idaea</b> fol. tricoloribus — 20	
<b>Kerria japonica</b> fol. var. . . . — 4		<b>Veronica Hendersoni</b> fol. var. — 8	
<b>Laurus Tinus</b> fol. var. . . . . — 15		» hirsuta fol. var. . . . . — 5	
<b>Ligularia</b> fol. albo marginatis . — 10		<b>Viburnum punctatum</b> . . . . . — 8	
<b>Ligustrum glabrum</b> fol. aureo var. — 6		† <b>Vinea major</b> fol. aur. marg. . — 5	
nepalense fol. aureo var. . . . — 15		» » reticulata . . . . . — 5	
† <b>Lilium candidum</b> albo marg. . 1 —		§ <b>Vitis Thunbergi</b> fol. pictis. . . — 6	
† » longiflorum Liukiu fol. var. 1 10		» » » sanguineis 1 —	
† <b>Lonicera brachypoda</b> fol. aur. reticulat. (12 Stück 1. 15) — 5		<b>Yucca</b> , vide Rubr. Liliaceae.	

## II. Für's Warmhaus (de serre chaude).

<b>Abutilon striatum</b> fol. var. . . . — 10	<b>Anthurium magnificum</b> . . 2 à 10 —
<b>Acalypha colorata</b> Spreng. . . — 8	regale . . . . . 6 —
<b>Achyranthes aureo-reticulata</b> . — 6	<b>Amaryllis reticulata</b> . . . . . — 20
Verschaffeltii . . . . . — 5	<b>Aphelandra Leopoldii</b> . . . . — 8
<b>Adelaster albo-venosus</b> . . . . — 10	Liboniana . . . . . — 10
<b>Aglaonema comutata</b> . . . . . — 25	Porteana . . . . . — 6
<b>Alocasia</b> , vide besond. Rubrik.	<b>Anecocheilus</b> , vide besond. Rubrik.
<b>Anthurium leuconeuron</b> . . 2 à 3 —	<b>Astrocaryon niveum</b> (Chichon) 20 —

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

<b>Aralia Sieboldii</b> fol. var. . . . .	3 à 5 —	<b>negrescens</b> . . . . .	2 —
"    aureo variegata . . . . .	5 —	<b>nobilis</b> . . . . .	— 12
<b>Areca rubra</b> . . . . .	3 à 8 —	<b>Porteana versicolor</b> . . . . .	1 15
<b>Aspidistra angustifolia</b> fol. var. . . . .	— 20	<b>punctata</b> . . . . .	1 —
punctata . . . . .	— 15	<b>terminalis rosea</b> . . . . .	— 10
<b>Bertolonia guttata</b> . . . . .	3 15	"    "    var. latifol. pend. . . . .	— 15
marmorata . . . . .	— 12	"    var. stricta . . . . .	— 25
pubescens . . . . .	1 15	<b>siamensis</b> . . . . .	— 10
<b>Begonien</b> , vide besondere Rubrik		<b>Cooperii</b> . . . . .	— 25
§ <b>Bignonia argyraea</b> violascens. . . . .	1 —	§ <b>Echites argyraea</b> . . . . .	— 10
<b>Boehmeria argentea</b> . . . . .	— 12	§    nutans . . . . .	— 8
<b>Bromelia Ananas</b> fol. aur. marg. 10 à 15 —		§    melaleuca . . . . .	— 8
bracteata fol. var. . . . .	5 à 7 —	<b>Elettaria Diepenhorstii</b> . . . . .	1 10
<b>Caladium</b> , vide besond. Rubrik		<b>Eranthemum rubro-venium</b> . . . . .	— 6
<b>Calathea</b> vide Scitamineen.		sanguinolentum . . . . .	— 6
<b>Campylobotris argyroneura</b> . . . . .	— 15	<b>Etaeria javanica</b> . . . . .	6 —
Ghiesbreghtii . . . . .	— 15	<b>Ficus Cooperi</b> . . . . .	— 10
pyrophylla . . . . .	— 10	leuconeuron . . . . .	1 15
regalis . . . . .	— 20	Suringari . . . . .	2 —
<b>Chamaeranthemum Beyrichi</b> . . . . .	— 8	<b>Franciscea confertiflora</b> fol. var. . . . .	— 25
marmoratum . . . . .	— 8	<b>Geissomeria marmorea</b> . . . . .	— 8
§ <b>Cissus amazonica</b> . . . . .	— 15	<b>Graptophyllum comorense</b> . . . . .	1 —
§    discolor . . . . .	— 6	versicolor . . . . .	— 10
§    porphyrophyllus . . . . .	— 12	<b>Gymnogramme davallioides</b> . . . . .	— 10
<b>Climocandra obovata</b> . . . . .	— 15	gracilis . . . . .	— 10
<b>Coleus Gibsoni</b> . . . . .	— 8	Lauchiana . . . . .	— 10
Verschaffeltii . . . . .	— 6	L'Hermièri . . . . .	— 10
<b>Colocasias</b> antiq. fol. petiol. viol. . . . .	1 —	Martensi . . . . .	— 15
macrorrhizon fol. var. 15 Gr. à . . . . .	1 —	Meyeriana . . . . .	— 15
<b>Cordylina indivisa vera</b> . . . . .	5 à 15 —	Wettenhalliana . . . . .	15 Gr. à 1 —
<b>Cossignea borbonica</b> . . . . .	6 à 30 —	<b>Heliconia</b> , vide Scitamineae.	
<b>Costus zebrinus</b> . . . . .	— 12	<b>Hibiscus Cooperi</b> . . . . .	— 8
<b>Croton elegans</b> . . . . .	1 —	§ <b>Hoya picta</b> . . . . .	— 10
pictum superbum . . . . .	1 20	§    variegata . . . . .	— 12
<b>Cyanophyllum magnific.</b> 15 Gr. à . . . . .	3 —	<b>Hyophorbe amaricaulis</b> . . . . .	4 à 7 —
speciosum . . . . .	15 Gr. à 1 —	indica . . . . .	8 à 30 —
<b>Cyperus alternifolius</b> fol. var. . . . .	— 20	Verschaffeltii . . . . .	50 —
<b>Cypripedium</b> , vide Rubr. Orchid.		<b>Latania rubra</b> . . . . .	15 à 18 —
<b>Cystorchis variegata</b> . . . . .	2 15	Verschaffeltii . . . . .	12 à 25 —
<b>Desmodium gyrans</b> . . . . .	— 12	<b>Maranta</b> , vide Rubr. Scitamineae.	
<b>Dichorisandra vittata cuprea</b> . . . . .	— 15	<b>Melastoma discolor</b> . . . . .	— 15
<b>Dieffenbachia Seguine Schott.</b>		<b>Miconia pulverulenta</b> . . . . .	— 15
var. caule maculata . . . . .	— 12	<b>Mikania Liervalli</b> . . . . .	— 10
litturata . . . . .	— 15	Verschaffeltii . . . . .	— 10
seguine var. picta . . . . .	— 10	<b>Naegelia</b> , vide Gesneraceae.	
Baraquinii . . . . .	1 à 2 —	<b>Nephelaphyllum cordatum</b> . . . . .	— —
gigantea . . . . .	5 —	pulchrum . . . . .	2 à 4 —
grandis . . . . .	25 Gr. à 2 —	<b>Nyphaea anecochilifolia</b> . . . . .	— 15
Weirii . . . . .	8 —	rubida . . . . .	— 6
<b>Dioscorea anecochilifolia</b> . . . . .	2 —	<b>Pandanus javanicus</b> fol. var. 1 1/2 à . . . . .	3 —
argyraea . . . . .	— 20	<b>Pavetta borbonica</b> . . . . .	6 —
discolor . . . . .	— 15	"    vera . . . . .	8 —
picta . . . . .	— 20	<b>Peperomia acuminata</b> . . . . .	1 —
<b>Dracaena javanica</b> var. macul. . . . .	2 —	argyraea . . . . .	1 20
limbata . . . . .	1 —	marmorata . . . . .	1 20
marginata . . . . .	— 15	<b>Piper maculosum</b> . . . . .	— 20
"    latifolia . . . . .	— 20	<b>Phajus maculatus</b> . . . . .	5 à 8 —

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Phalaenopsis</b> Schilleriana . . . . .	30 à 60 —	<b>Schismatoglottis</b> picta . . . . .	3 —
<b>Pharus</b> vittatus . . . . .	2 à 4 —	variegata . . . . .	— 20
<b>Phoenicophorum</b> Sechellarum . . . . .	10 à 50 —	<b>Scindapsus</b> pictus . . . . .	1 20
<b>Phrynium</b> majesticum . . . . .	2 15	<b>Selaginella</b> Martensi fol. var. . . . .	— 10
"    micans . . . . .	— 10	<b>Smilax</b> zeylanica fol. var. . . . .	— 12
<b>Physurus</b> argenteus . . . . .	1 —	macrophylla albo-maculata . . . . .	— 15
nobilis . . . . .	6 —	<b>Sonerilla</b> margaritacea alba . . . . .	— 10
pictus . . . . .	1 15	"    "    superba . . . . .	— 10
querceticola (12 Stück 6 Thlr.) . . . . .	— 20	<b>Sphaerogyne</b> cinnamomea . 2 à 4 —	— 4
<b>Pinanga</b> maculata . . . . .	40 —	latifolia . . . . .	1, 4, à 8 —
<b>Pogonia</b> discolor . . . . .	8 —	§ <b>Sphaerostemma</b> marmorata . . . . .	3 —
§ <b>Pothos</b> argyraea . . . . .	— 5	<b>Syngonium</b> Wendlandii . . . . .	— 15
<b>Pteris</b> argyraea . . . . .	— 10	<b>Tillandsia</b> bivittata . . . . .	— 20
aspericaulis . . . . .	— 15	zonata fol. bruneis. . . . .	— 10
cretica albo-lineata . . . . .	— 5	splendens (Vriesea splendens) . . . . .	— 25
nemoralis variegata . . . . .	— 10	<b>Tradescantia</b> Zebrina argentea — 5	— 5
<b>Rhapis</b> flabelliformis fol. albo		discolor . . . . .	— 5
variegatis . . . . .	20 à 80 —	<b>Verschaffeltia</b> splendida 18 à 25 —	—

# Wasserpflanzen.

## Plantes aquatiques.

Die mit einem \* bezeichneten Pflanzen verlangen Cultur im Warmhause; die mit † bezeichneten können während des Sommers in Bassins im Freien cultivirt werden, und für den Winter genügt ein Kalthaus zur Aufbewahrung; die übrigen halten auch während des Winters im Freien aus.

Les espèces marquées \* exigent la culture en serre chaude; celles marquées † peuvent être cultivées pendant l'été en plein air; pour les conserver pendant l'hiver suffit une serre tempérée. Les autres espèces sont tout-à-fait rustiques.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Acorus</b> Calamus <i>L.</i> . . . . .	— 5	† <b>Hydrocotyle</b> bonariensis <i>Lam.</i> . . . .	8
† <b>Alisma</b> (Echinodorus) cordi-		†     "    leucophaca . . . . .	6
folium <i>L.</i> . . . . .	— 8	* <b>Hydropeltis</b> purpurea <i>Mchx.</i>	
" lanceolatum <i>Hoffm.</i> . . . .	— 5	= <i>Brassemia peltata Pursh.</i> . . . .	— 20
" parvifolia . . . . .	— 15	<b>Iris</b> Pseud-Acorus <i>L.</i> . . . . .	4
" Plantago <i>L.</i> . . . . .	— 5	* <b>Lasia</b> heterophylla <i>Schott.</i> . . . .	— 15
" ranunculoides <i>L.</i> . . . . .	— 5	† <b>Limnanthemum</b> geminatum	
<b>Anacharis</b> Alsinastrum . . . . .	— 5	<i>Grieseb.</i> . . . . .	— 10
† <b>Anemiopsis</b> californica . . . . .	— 25	†     "    nymphaeoides <i>Link.</i> . . . .	— 10
† <b>Aponogeton</b> distachyum <i>Thunb.</i> . . . .	— 20	† <b>Limnocharis</b> Humboldtii <i>Rich.</i> . . . .	— 8
†     "    monostachyum <i>L.</i> . . . .	— 10	†     "    Plumieri <i>Rich.</i> . . . .	— 20
† <b>Arundo</b> Donax fol. variegatis . . . . .	— 15	† <b>Marsilea</b> aegyptiaca . . . . .	— 8
†     "    mauritanica fol. variegatis . . . . .	— 20	†     "    elata . . . . .	— 8
<b>Butomus</b> umbellatus <i>L.</i> . . . . .	— 5	†     "    Drummondii . . . . .	— 10
<b>Caltha</b> palustris <i>L.</i> . . . . .	— 4	†     "    quadrifolia <i>L.</i> . . . . .	— 8
"    "    flore pleno . . . . .	— 10	†     "    Salvatrix . . . . .	— 10
* <b>Ceratopteris</b> thalictroides . . . . .	— 5	* <b>Mimosa</b> natans <i>Roxb.</i> (M. aquat.) 1 10	— 10
* <b>Cyperus</b> alternifolius <i>L.</i> . . . . .	— 6	* <b>Nelumbium</b> speciosum <i>Willd.</i> . . . .	— 25
*     "    "    foliis variegatis . . . . .	— 20	<b>Nuphar</b> advena <i>Ait.</i> Blätter aus	
†     "    Papyrus <i>L.</i> . . . . .	1 —	dem Wasser stehend . . . . .	— 15
<b>Equisetum</b> limosum <i>L.</i> . . . . .	— 4	"    lutea <i>Smith.</i> . . . . .	— 8
<b>Gratiola</b> officinalis <i>L.</i> . . . . .	— 4	<b>Nymphaea</b> alba <i>L.</i> . . . . .	— 6
<b>Hippuris</b> (Limnopoence <i>Adams.</i> )		†     "    "    biradiata <i>Somm.</i> . . . . .	— 10
vulgaris <i>L.</i> . . . . .	— 5	*     "    atropurpurea . . . . .	— 20
† <b>Houttuynia</b> cordata <i>Thunb.</i> . . . .	— 5	†     "    coerulea <i>Andr.</i> ( <i>N. scuti-</i>	
<b>Hydrocharis</b> morsus ranae <i>L.</i> . . . .	— 3	folia <i>Dec.</i> ) . . . . .	— 10





	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Achyranthes Verschaffeltii</i> . . . —	5	<i>Aspidistra punctata Lindl.</i> . . . —	15
<i>Adamia versicolor Fort.</i> . . . —	6	variegata, vide <i>Plectogyne</i> .	
<i>Adonsonia digitata L.</i> , vide offic. Pflanzen.		<i>Astrapaea Wallichii L.</i> 20 Gr. à	4 —
<i>Adelaster albo-venosus Veitch.</i> —	10	<i>Ataccia cristata Kth.</i> . . . . .	3 —
<i>Adenocalymna longiracemosa Mart.</i> (Bignoniaceae) . . . —	12	<i>Bacobotrys Forst. trichotoma</i> 1 à	3 —
<i>Adhatoda cydoniaefol. N.v.E.</i> —	6	<i>Bambusa gracilis</i> . . . . .	20
<i>Aechmaea</i> , vide Bromeliaceae.		verticillata <i>W.</i> . . . . .	1 —
<i>Aeschynanthus</i> , v. Rubr. Gesneraceae.		<i>Baphia nitida Lodd.</i> . . . . .	20
<i>Azelia grandis Hort.</i> (Erythropheum guinense. <i>Dorc.</i> ) . . —	25	<i>Barringtonia racemosa Bl.</i> (Stravadium insigne <i>Hort.</i> )	1 10
<i>Aglaonema</i> , vide Aroideae.		<i>Beloperome violacea</i> . . . . .	8
<i>Allamanda neriifolia Hook.</i> . . —	8	<i>Bertolonia guttata</i> } vide Neu-	
<i>Alocasia</i> , vide Rubr. Aroideae.		„ maculata } heiten	
<i>Alloplectus Laurentianus de Jonghe</i> . . . . .	6	„ pubescens. } pag. 2 u. 7.	
<i>Amaryllis Alberti flore pleno (Laurentius)</i> , vide Neuheiten pag. 1.		<i>§ Bignonia à fleurs violettes</i> . . —	10
Josephinae <i>Red.</i> ( <i>A. gigantea van Marum</i> . <i>Brunswigia Josephinae Ker.</i> ) Sehr stark 5 à	6 —	§ argyrea violascens, v. pag. 7.	1 —
<i>Procera</i> (Hippeastrum procerrum). Neu! . . . . .	8 —	<i>Bischoffia javanica Blume</i> . . .	2 —
<i>reticulata Herit.</i> (Coburgia striatifolia <i>Herb.</i> ) . . . . .	20	<i>Bleckeria caulocarpa Hassk.</i> . . —	15
<i>rutila Ker.</i> ( <i>A. rutilans Lodd.</i> ) —	25	<i>Blighia sapida Koenig</i> (Cupania Akeesia <i>Camb.</i> ) . . . . .	2 —
<i>robusta Sw.</i> ( <i>A. Tett. Hort.</i> ) 1 à	2 —	<i>Boehmeria argentea Lind.</i> . . . —	12
Gartenvarietäten:		<i>Boscheria Minahassae de V.</i> . . —	20
<i>Britannicus</i> . . . . .	1 10	<i>Botryodendron macrophyllum</i> .	6 —
<i>Cleopatra</i> . . . . .	1 —	<i>§ Bougainvillea glabra</i> . . . . .	15
<i>coccinea</i> . . . . .	1 10	§ splendens . . . . .	12
<i>Generalissimus</i> . . . . .	1 10	<i>Brassalopsis speciosa Dne. et Pl.</i> , vide Araliaceae.	
<i>Le Tasse</i> . . . . .	1 10	<i>Brexia chrysophylla Sweet.</i> . . . —	15
<i>Tyrian Queen</i> . . . . .	20 à 1 —	<i>Brownea coccinea L.</i> . . . . .	2 15
<i>Anthurium</i> , vide Rubr. Aroideae.		grandiceps <i>Jacq.</i> . . . . .	10 —
<i>Aphelandra Leopoldii van H.</i> —	8	racemosa <i>Jacq.</i> . . . . .	10 —
<i>Liboniana</i> . . . . .	10	<i>Caladium</i> , vide Rubr. Aroideae.	
<i>Porteana Morel</i> . . . . .	6	<i>Calathea</i> , vide Rubr. Scitamineae.	
<i>Ardisia crenulata fructu albo</i> —	8	<i>§ Calonyetium sanguineum Ch.</i> —	20
<i>crenulata V. fructu rubro</i> . . . —	8	<i>Campylobotrys Lemaire</i> (Higginsia <i>Hook.</i> ) . . . . .	
<i>crispa</i> ( <i>Sieboldii Hort.</i> ) . . . . .	12	argyronœura . . . . .	15
<i>hymenandra Wall.</i> . . . . .	20	Ghiesbrectii . . . . .	15
<i>pumila Hort.</i> . . . . .	1 10	pyrophylla . . . . .	10
<i>speciosa Bl.</i> . . . . .	10	regalis . . . . .	20
<i>Arisaema</i> , vide Aroideae.		smaragdina . . . . .	10
<i>§ Aristolochia gigantea Mart.</i> . . —	10	<i>Canna indica</i> , vide pag. 70.	
§ grandiflora <i>Sw.</i> . . . . .	1 —	<i>Carolinea princeps L.</i> . . . . .	1 —
§ ornithocephala <i>Hook</i> . . . . .	25	<i>Cecropia palmata Willd.</i> . . . .	1 10
§ saccata <i>Wall</i> . . . . .	12	<i>Centradenia grandiflora Schl.</i> . . —	10
§ Twaithesii . . . . .	15	<i>§ Ceropegia L. Gardnerii</i> . . . .	20
<i>Artocarpus incisa L. fil.</i> . . . . .	—	<i>Chamaeranthemum Beyrichii</i> . . —	8
integrifolia <i>L. fil.</i> . . . . .	2 —	marmoratum . . . . .	8
rigida <i>Bl.</i> . . . . .	1 —	<i>Chamberlaynea spectabilis</i> . . . —	10
<i>Aspidistra angustifolia fol. var.</i> —	20	<i>§ Cissus amazonica</i> , vide pag. 7	15
		§ discolor <i>Bl.</i> . . . . .	6
		§ Palembangensis . . . . .	8
		§ porphyrophyllus <i>Hort.</i> . . . .	12
		<i>Clavija lancifolia Desf.</i> (Theophrasta lancifol.) 20 Gr. à	10 —
		latifolia <i>C. Koch.</i> (Theophrast. latifolia <i>Willd.</i> ) . . . . .	4 à 12 —

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

<b>Clavija macrophylla</b> <i>Miq.</i> (Theophrasta macroph. <i>Lk.</i> ) . . . 15 —	<b>*Cyperus alternifolius</b> <i>L.</i> . . . — 8
ornata <i>D. Dorn.</i> (Theophrasta longifolia <i>Jacq.</i> ) . . . 10 —	*alternifolius <i>L.</i> fol. albo var. — 20
§ <b>Clerodendron Balfouri</b> , v. p. 7. — 15	<b>*Papyrus</b> <i>L.</i> (Papyrus antiquorum <i>Willd.</i> ) . . . 1 —
fragrans flore pleno — 10	<b>Dasyllirion</b> , vide <i>Asphodeleae</i> .
<i>Kaempferii Fisch.</i> (Clerod. squamatum <i>Vahl.</i> ) . . . — 15	<b>Datura Knightii</b> <i>Hort.</i> fl. pleno — 15
§ <i>Thompsonianum Hort. Angl.</i> — 10	<b>Desmodium gyrans</b> <i>L.</i> . . . — 12
<b>Climocandra obovata</b> . . . — 15	*racemosum grandiflorum . . . 1 —
<b>*Clivia Lindl.</b> (Imantophyllum).	velutinum <i>DC.</i> . . . — 10
*cyrthanthiflorum <i>Lindl.</i> . 1 à 6 —	<b>Dibrachion peltatum</b> <i>Rgl.</i> ( = <i>Mappa fastuosa</i> ) . . . 1 15
*Gardenii <i>Hook.</i> 1½, 2, 5 à 20 —	<b>Dichorisandra leucocephala</b> . . — 15
*miniata <i>Backh.</i> . . . 2, 5 à 12 —	vittata cuprea <i>Hort.</i> . . . — 15
*nobilis <i>Lindl.</i> . . . — 25	ovata <i>Mart.</i> . . . — 10
<b>Clusia Brogniartiana</b> . . . 1 10	<b>Dieffenbachia</b> , vide <i>R. Aroideae</i> .
flava <i>L.</i> . . . 1 —	<b>Dillenia speciosa</b> <i>Thunb.</i> . 1 à 3 —
superba . . . 1 10	<b>Dionaea muscipula</b> <i>L.</i> . . . 1 —
<b>Coccoloba excoriata</b> <i>L.</i> . . . 1 10	§ <b>Dioscorea argyraea</b> . . . — 20
gigas . . . 2 —	§ anecochilifolia . . . 2 —
macrophylla <i>Hook.</i> . . . 2 à 5 —	§ discolor . . . — 15
majestica <i>Hort. Belg.</i> (C. peltata <i>Schott.</i> ) . . . 3 à 6 —	§ picta . . . — 20
§ <i>nymphaefolia</i> . . . — 25	<b>Dipladenia nobilis</b> <i>Ch. Morren.</i> , vide <i>Neuheiten</i> pag. 3.
pubescens <i>L.</i> . . . 2, 4, 8 à 10 —	<b>*Drimia lancifolia</b> <i>Gawl.</i> . . . 1 15
<b>Colea Commersoni</b> <i>Dne.</i> , 3 à 10 à 20 —	marmorea. . . . . 2 —
floribunda <i>Pl. et L.</i> , 1½, 2, 3 à 12 —	§ <b>Echites argyraea</b> <i>Lindl.</i> . . . — 10
<b>Coleus Gibsoni</b> , vide <i>Neuheiten</i> pag. 3.	§ melaleuca <i>Hort.</i> . . . — 8
<i>Verschaffeltii</i> . . . — 6	§ nutans <i>Sims.</i> ( <i>Haemadiction venosum</i> <i>Lindl.</i> ) . . . — 8
§ <b>Combretum Afzelii</b> <i>Don.</i> ( <i>Hiraea Houletii Hort.</i> ) . . . — 15	§ urophylla <i>Hort.</i> . . . — 8
adenophyllum <i>Mart.</i> . . . — 10	<b>Elaeodendron glaucum</b> <i>Pers.</i> . . — 10
<b>Cossignea borbonica</b> <i>Dne.</i> , 4 à 30 —	<b>Eranthemum Cooperi</b> . . . — 6
<b>Costus Malortianus</b> <i>Hort.</i> . . . — 6	rubro-venium . . . — 6
violaceus . . . — 6	sanguinolentum <i>Hooker</i> . . . — 6
zebrinus <i>Hort. Herrenh.</i> . . . — 12	<b>Eriocnema marmorata</b> <i>Naud.</i> ( <i>Bertolonia marmorata</i> <i>N.</i> ) — 12
<b>Cresecentia Cujute</b> <i>L.</i> . . . — 15	<b>Erytrotelon brasiliensis</b> <i>Nees et Mart.</i> ( <i>Bonplandia Erytrotelon</i> <i>Spreng.</i> <i>Galipea petrandia</i> <i>St. Hil.</i> ) . . 2 à 8 —
macrophylla <i>Seem.</i> ( <i>Ferdinandusa superba Hort.</i> ) . . 1 à 3 —	<b>Eucharis amazonica</b> <i>Lind.</i> ( <i>E. grandiflora</i> <i>Veitch.</i> ) . . . — 10
regalis <i>Pl. et L.</i> . . . 5 à 10 —	<b>Fagraea auriculata</b> <i>Jack.</i> . 2 à 6 —
<b>Crinum amabile</b> <i>Don.</i> { Sehr . 3 —	imperialis <i>Bl.</i> . . . 8 —
giganteum <i>Andr.</i> { stark . 3 —	obovata <i>Mall.</i> . . . 20 Gr. à 2 —
<b>Croton cascarilla</b> <i>L.</i> . . . — 20	Tahitiensis <i>Van Houtte.</i> . 2 à 6 —
elegans <i>Veitch.</i> . . . 15 Gr. à 1 —	<b>Ficus Afzelii</b> <i>Hort. Berol. nec.</i> <i>C. Don.</i> ( <i>Urostigma eriobotryoides</i> <i>Miq.</i> ) . . . — 15
pictum . . . — 12	amazonica ( <i>Urostigma amazonica Hort.</i> ) . . . — 15
pictum superbum . . . 1 20	auriculata . . . — 15
<b>Cupania Pindaiba</b> <i>Hort. Lind.</i> undulata <i>L.</i> . . . 2 à 4 —	§ barbata <i>Wall.</i> . . . — 6
<b>Cureuligo recurvata</b> <i>Dr.</i> . 8 à — 20	<i>Chauvièri</i> vide <i>Neuheiten</i> pag. 3.
<b>Cureuma cordata</b> <i>Wall.</i> } vide	<i>Cooperii</i> ( <i>V.</i> ) . . . — 10
macrophylla . . . } Scita-	elastica <i>Roxb.</i> ( <i>Urostigma elasticum</i> <i>Niq.</i> ) . . . — 15
Roesceana <i>Wall.</i> . . . } mi-	
rubricaulis <i>Lind.</i> . . . } neae.	
<b>Cyanophyllum assamicum</b> <i>L.</i> . 1 —	
magnificum <i>Lind.</i> . 15 Gr. à 3 —	
speciosum <i>Lind.</i> . 15 Gr. à 1 —	



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Ficus</b> Grellei . . . . .	1 20	<b>Hebeclinium</b> atrorubens (J. V.) . . . . .	8
Leopoldii Lindl. . . . .	2 à 3 —	macrophyllum Dne. . . . .	8
leuconeura . . . . .	1 15	<b>Heritiera</b> littoralis Ait. . . . .	4 —
nicobarensis Hort. Utraj. . . . .	— 15	<b>Heteropteris</b> Laurentii Rgl. . . . .	1 15
nymphaefolia L. (Urostigma		<b>Hexacentris</b> lutea Hort. . . . .	— 10
nymphaefolium Miq.) . . . . .	— 12	<b>Mysorensis</b> . . . . .	— 12
panduraefolia Hort. Par. . . . .	— 20	<b>Hibiscus</b> Cooperi . . . . .	— 8
(Urostigma gardeniaefolia) . . . . .	— 20	roseo sinensis L. flore rubro pl. . . . .	— 8
pellucida Hort. . . . .	— 15	» » flore luteo pleno . . . . .	— 15
Porteana . . . . .	1 15	<b>Higginsia</b> , vid. Campylobotris. . . . .	
quercifolia Blum. . . . .	— 8	<b>Hippeastrum</b> Heusserianum . . . . .	1 10
religiosa L. (Urostigma reli-		procerum, blaublühende Ama-	
giosa Gaspar.) . . . . .	— 10	ryllis, neu! . . . . .	8 —
spec. Java ähnlich dem F.		<b>Hippomane</b> spinosa L. (Sapium	
quercifolia Blum. . . . .	— 15	ilicifolium Willd.) . . . . .	2 1/2 à 4 —
spec. Mirador kleinblättrig . . . . .	— 10	<b>Horsfieldia</b> aculeata Bl. . . . .	2 —
§ stipulata Thunb. . . . .	— 5	<b>Hoya</b> bella Hook. . . . .	— 6
Suringari vide Neuheiten pag. 3.		§ coriacea, smaragdgrün, mit	
* <b>Franciseea</b> Pohl. (Brunfelsia		gelber Blume . . . . .	— 12
Bent.) acuminata P. 10 Gr. à . . . . .	2 —	§ fraterna Bl. . . . .	— 15
* confertiflora Pohl. . . . .	— 12	§ maxima vide Neuheiten pag. 3.	
* confertiflora Pohl fol. var. . . . .	— 25	§ mollis . . . . .	— 6
* macrophylla Cham. et Schidl.		§ Motoskoyi . . . . .	— 20
(F. eximia Schdw.) . . . . .	— 10	§ orbicularis . . . . .	— 20
* floribunda de Jonghe . . . . .	1 —	§ picta Sieb. . . . .	— 10
* hydrangeaeformis Pohl . . . . .	— 15	§ rotundifolia . . . . .	— 8
* latifolia Pohl . . . . .	— 15	§ variegata de Vr. . . . .	— 12
Lindeniana vide pag. 9 . . . . .	1 15	<b>Imantophyllum</b> , vide Clivia. . . . .	
* macrantha Scheidw. 10 Gr. à . . . . .	1 —	* <b>Impatiens</b> Jerdoniae Whit. . . . .	— 8
* uniflora Pohl (F. Hoppeana		<b>Inga</b> ferruginea . . . . .	— 15
Hook.) . . . . .	— 8	rhoifolia Willd. (J. super-	
<b>Galipea</b> macrophylla St. Hil. 5 à . . . . .	10 —	biens Lemaire.) . . . . .	— 20
odoratissima Lindl. . . . .	2 à 10 —	<b>Isotypus</b> onoseroides H. B. K.	
ovata Hort. Petrop. . . . .	1 à 10 —	(Cataleuca rubic. Hort.) . . . . .	— 20
<b>Gardenia</b> citriodora Hook. . . . .	— 15	<b>Ixora</b> acuminata Roxb. . . . .	— 10
florida L. . . . .	— 10	amboynensis . . . . .	2 —
Fortunei Lindl. . . . .	— 10	aurantiaca . . . . .	— 25
Maruba, neu! . . . . .	1 15	coccinea L. var. major (Ban-	
Plantii . . . . .	— 10	dhucca Roxb.) . . . . .	15 Gr. à 2 —
spec. Shanghai . . . . .	— 12	javanica Dec. . . . .	1 —
Stanleyana . . . . .	— 12	micrantha Heyn. (I. brachyata	
<b>Geissomeria</b> marmorea . . . . .	— 8	Roxb.) . . . . .	1 —
<b>Gigelia</b> pinnata Hort. Amst. . . . .	1 15	obovata . . . . .	— 15
<b>Goethea</b> cauliflora N. v. E. . . . .	— 12	<b>Jaccaranda</b> mimosaefolia Don. . . . .	1 15
<b>Gomphia</b> decorans Lemaire . . . . .	— 20	<b>Jacquemontia</b> violacea . . . . .	— 15
Theophrasta, vide Wolken-		<b>Jacquinia</b> smaragdina Pl. . . . .	— 15
steinia Theophrasta Rgl. . . . .		<b>Jambosa</b> magnifica, vide pag. 9.	
<b>Gordonia</b> grandis . . . . .	— 20	§ <b>Jasminum</b> didymum . . . . .	— 20
<b>Graptophyllum</b> comorense vide		§ Sambac Ait. flore pleno . . . . .	— 10
Neuheiten pag. 3. . . . .		<b>Jonesia</b> Asoca Roxb. . . . .	3 —
versicolor . . . . .	— 10	§ scandens Roxb. . . . .	1 —
<b>Grias</b> cauliflora L. Selten! . . . . .	10 —	<b>Kaempferia</b> Galanga L., vide	
<b>Griffinia</b> hyacinthina Herb. . . . .	— 15	Scitamineae. . . . .	
<b>Guarea</b> trichilioides L. . . . .	2 —	<b>Libonia</b> floribunda . . . . .	— 5
<b>Gustavia</b> pterocarpa Poit. (G.		<b>Lindenia</b> nivalis . . . . .	— 25
Leopoldii Hort.) . . . . .	1 à 4 —	<b>Lomatophyllum</b> borbonicum Willd.	
<b>Gymnostachium</b> zeylanicum . . . . .	— 10	2 à 5 —	

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Ludolfia macrophylla</b> . . . . .	20	<b>\$ Passiflora Sheperdii Hort.</b> . . . . .	6
<b>Malpighia coccifera L.</b> . . . . .	10	<b>\$ tinifolia Juss.</b> . . . . .	10
<b>Manettia micans</b> , vide pag. 9 . . . . .	20	<b>Paulinea quassiaefolia Hort.</b>	
<b>Mappa fastuosa</b> , vide <i>Dibrachyon</i>		<i>Jonghe</i> . . . . .	5 —
<i>peltatum</i> .		<b>Pavetta borbonica vera Hort.</b>	
<b>Maranta</b> , vide <i>Scitamineae</i> .		( <i>Pyrostr. polymorph. A. Rich.</i> )	8 —
<b>Medinilla farinosa</b> . . . . .	10	<i>borbonica</i> . . . . .	6 —
<i>magnifica Lindl.</i> . . . . .	20	<i>incarnata alba</i> , vide <i>Neuh.</i> pag. 4.	
<b>\$ Meladinus villosus Hort. Amst.</b>		<i>indica L.</i> . . . . .	10
<i>Schöne Asclepiadee</i> . . . . .	12	<i>Oxleyana</i> vide <i>Neuheiten</i> pag. 4.	
<b>Melastoma brachyodon</b> . . . . .	15	<b>Peperomia acuminata R. P.</b> . . . . .	25
<i>discolor</i> . . . . .	15	<i>argyrea</i> , vide <i>Neuheiten</i> pag. 4.	
<b>\$ Methonica Plantii Hort.</b> . . . . .	20	<i>magnoliaefol. Dietr.</i> ( <i>Piper</i>	
<b>* Metrodorea atropurp. Fsch.</b> . . . . .	1 —	<i>magnoliaefol. Jacq.</i> ) . . . . .	10
<i>stipularis</i> . . . . .	1 à 3 —	<i>marmorata</i> , v. <i>Neuheit.</i> p. 4.	
<b>Metternichia principis Mik.</b> . . . . .	12	<b>Phyllartrion Comorense Boj.</b> . . . . .	15
<b>* Meyenia erecta Benth.</b> . . . . .	8	<b>Pilea Lindl. serpyllifolia</b> . . . . .	6
<i>erecta Benth. var. alba</i> . . . . .	15	<b>Pilocarpus pinnatif. Lem.</b> 15 G. à . . . . .	1 —
<i>Vogelii</i> vide pag. 9. . . . .	20	<b>Piper bicolor</b> , v. <i>Neuheiten</i> p. 4.	
<b>Miconia pulverulenta</b> vide pag. 9. . . . .	15	<i>maculosum</i> , vide pag. 4 . . . . .	20
<b>Mikania Liervalii</b> . . . . .	10	<b>Pisonia longirostris</b> , v. N. pg. 4.	
<i>Verschaffeltii</i> . . . . .	10	<b>Plectogyne variegata</b> . . . . .	12
<b>Mimosa pudica L.</b> . . . . .	5	<b>\$ Plocostemma lasiantha Hook.</b> . . . . .	1 15
<b>* Monochaetum sericeum flori-</b>		<b>Plumieria principis Rohanii</b>	
<i>bundum</i> . . . . .	15	<i>Hort. Jonghe</i> . . . . .	20 à 50 —
<b>* Montanoa mollissima Hort.</b>		<b>Pogostemon Patchouli Pelet.</b> . . . . .	6
( <i>Sinclair. discol. Hook.</i> )		<b>Poinsettia pulcherrima Grah.</b> . . . . .	10
<b>* Mutisia decurrens Cav.</b> . . . . .	3 —	<b>Psychotria leucocephala A.</b>	
<b>Myrsine melastomoid. Hort.</b> 2 à . . . . .	6 —	<i>Brogn.</i> . . . . .	2, 5 à 10 —
<i>organensis Spr.</i> . . . . .	2 15	<i>magnoliaefolia H. B. K.</i> . . . . .	4 à 8 —
<b>Napoleona imperialis Beauv.</b> . . . . .	2 —	<b>PterospERMUM acerifol. Willd.</b> . . . . .	1 15
<i>spec. Guyana</i> , Blätter lancet-		<b>Putzeysia rosea Pl. et L.</b> 1½ à . . . . .	10 —
<i>förmig, lang und glänzend.</i> . . . . .	3 —	<b>Rhopala R., Br., Pohl.</b> ( <i>Rupala</i>	
<b>\$ Nepenthes destillator. L.</b> 2 à . . . . .	5 —	<i>Willd., Spr., Dietr.</i> ), vide	
<b>\$ laevis</b> . . . . .	1 15	<i>Proteaceen</i> , pag. 96.	
<b>\$ phyllamphora Willd.</b> . . . . .	4 —	<b>\$ Rhynchosia albo-nitens</b> . . . . .	20
<b>\$ Rafflesiana</b> . . . . .	4 —	<b>* Rhynchospermum jasminoid.</b>	
<b>\$ Norantea guianensis</b> . . . . .	10	<i>Lindl.</i> . . . . .	10
<b>Oldfieldia africana</b> . . . . .	1 —	<b>Rogiera gratissima</b> , vide pag. 10. . . . .	2 10
<b>Oreopanax</b> , vide <i>Rubr. Araliaceae</i> .		<b>Saccopetalum Horsfieldii B.</b> . . . . .	15
<b>* Otacanthus coeruleus Lindl.</b> . . . . .	10	<b>Sapindus Mukorosi</b> . . . . .	1 —
<b>Pandanophyllum humile Teysm.</b> . . . . .	1 15	<b>Saurauja macrophylla Lindl.</b> . . . . .	15
<b>Papyrus antiquorum Willd.,</b>		<i>spectabilis Hook.</i> . . . . .	12
vide <i>Cyperus Papyrus L.</i>		<b>Sauropus Gardnerii Hort.</b> . . . . .	10
<b>Paritium elatum Don.</b> ( <i>Hibiscus</i>		<b>\$ Sclerostylis atalantoid. Wth.</b> . . . . .	15
<i>elatus Swartz</i> ) . . . . .	1 15	<b>Scutellaria Costaricana</b> . . . . .	10
<b>\$ Passiflora Baraquiniana Lem.</b> . . . . .	6	<b>Securidaca tomentosa St. Hil.</b> . . . . .	20
<b>\$ coeruleo-racemosa Sab.</b> . . . . .	8	<b>Seriana sinuata Schum.</b> ( <i>Pauli-</i>	
<b>\$ Decaisneana</b> ( <i>Varietät von P.</i>		<i>nea Seriana L.</i> ) . . . . .	1 10
<i>quadrangularis</i> ) . . . . .	10	<b>Sericographis aurantiaca</b> . . . . .	8
<b>\$ edulis Sims.</b> . . . . .	15	<b>Simarouba grandis</b> . . . . .	5 à 10 —
<b>\$ fulgens</b> . . . . .	15	<b>\$ Smilax zeylanica fol. var.</b> . . . . .	12
<b>\$ helleborifolia Well.</b> vide <i>Neu-</i>		<i>macrophylla albo-maculata</i> . . . . .	15
<i>heiten</i> pag. 4.		<b>Sonerila margaritacea alba</b> . . . . .	10
<b>\$ Imperatrice Eugénie</b> . . . . .	8	<i>superba</i> . . . . .	10
<b>\$ kermesina</b> . . . . .	20	<b>Spathodea campanulata Beauv.</b> . . . . .	2 15
<b>\$ quadrangularis L.</b> ( <i>P. insignis</i> ) . . . . .	12	<i>gigantea Bl.</i> . . . . .	2 15

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

<b>Sphaerogyne cinnamomea</b> , 2 à 4 — vide pag. 10.	<b>Theophrasta Jussieui Lind.</b> (Th. pungens Willd.) 1 1/2 à 15 —
latifolia . . . . . 1, 2, 4 à 8 —	lancifolia (Clavija lancifolia Desf.) . . . . . 1 1/2 à 10 —
§ <b>Sphaerostemma Bl. marmor.</b> <i>Hort. Low.</i> . . . . . 3 —	latifolia Willd. (Clavija lati- folia C. Koch) . . . . . 2, 4 à 12 —
<b>Stadmannia Lam.</b>	longifolia Jacq. (Clavija or- nata D. Don.) . . . . . 20 —
Fraserii . . . . . 2 15	macrophylla Lk. (Clavija ma- crophylla Miq.) . . . . . 15 —
geniculata (Melicocca genicu- lata Spr.) . . . . . 2 à 4 —	pungens Willd., vide Th. Jus- sieui Lind.
Ghiesbrechtii Versch. . . . . 4 —	§ <b>Thunbergia chrysops Hook.</b> . . . . 20 —
Jonghei Lind. . . . . 3 à 5 —	§ coccinea Wall. . . . . 20 —
Pulchella Lind. . . . . 1 à 2 —	§ grandiflora Roxb. . . . . — 20
sorbifolia Lind. . . . . 2 à 3 —	§ laurifolia Lindl. . . . . — 10
§ <b>Stephanotis florib. A. Brogn.</b> — 8	<b>Thyrsacanthus rutilans.</b> . . . . — 10
<b>Stereulia platanifolia L.</b> . . . . 2 —	<b>Tillandsia</b> , vide Bromeliaceae.
<b>Stiftia insignis Fisch.</b> . . . . — 15	<b>Torenia asiatica L.</b> . . . . — 4
<b>Strelitzia alba Hort.</b> . . . . 3 —	asiatica L. var. pulcherr. Hort. — 5
Reginae Ait. . . . . 5 —	<b>Tradescantia discolor.</b> . . . . — 5
<b>Swartzia Flemmingii Radd.</b> . . — 15	zebrina argentea . . . . . — 5
Langsdorfii Radd. . . . . — 20	<b>Triolena scorpioides Hort.</b> . . . — 20
<b>Tabernaemontana L. Camas-</b> <b>sia.</b> Blüht und duftet wie eine	§ <b>Tylophora lutescens Dne.</b> . . . — 10
Gardenia . . . . . — 10	<b>Urostigma Miq.</b> , vide Ficus.
<b>Talauma ovata St. Hil.</b> . . . . 2 —	<b>Vernonia Schreb. latifol. Hort.</b> — 10
<b>Taxonnia van Volxemii</b> . . . . — 10	§ <b>Vesalia odoratissima Lind.</b> . . — 12
<b>Theophrasta glauca Lind.</b> 1 1/2 à 3 —	<b>Wolkensteinia Theophrasta</b> <i>Rgl.</i> (Gomphia Theophrasta) 5 —
imperialis, 1 Fuss hohe schöne Pflanzen . . . . . 5 à 6 —	<b>Xylophylla angustifolia Sw.</b> . . — 25
imperialis Lind. Die grösst- blättrige Species. Stark . . . 50 —	

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach  
unserer Wahl: 25 verschiedene Warmhaus-Pflanzen für 5 Thlr.; 50 für  
12 Thlr.; 100 für 25 Thlr.

## ARALIACEAE.

Die mit einem \* bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit \*\* im temperirten,  
die übrigen im Warmhause cultivirt.

\* Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide; de désigne de telles  
qui peuvent séjourner dans une serre tempérée; les autres sont \*\* serre chaude.

Thlr.Gr.

* <b>Aralia Cookii Hort.</b> . . . . .	4 —
* crassifolia Sol. (Pseudopanax crassifolia C. Koch) . . . . .	2 à 8 —
* crassifolia vera. Selten und sehr schön . . . . .	7 —
* guatemalensis Hort., vide Oreopanax guatemalense.	
* heteromorpha Hort. Sehr schön . . . . .	6 —
* integrifolia (Pseudopanax crassifol. C. Koch. var. integrifol.) . . . . .	2 à 8 —
* leptophylla Hort. . . . .	1 1/3 à 4 —
* lucida Hort. Amster . . . . .	1 —
** papyrifera Hook. (Tetrapanax papyrifera C. Koch.) . . . . .	10 Gr. à 1 —
* quinquefolia Hort. (Pseud. crassifol. C. Koch. var. quinquefol.) . . . . .	1 —
** reticulata Hort. . . . .	15 Gr. à 2 —
* Schefflerii Hort. (Nothopanax arboreum C. Koch.) . . . . .	— 20



	Thlr. Gr.
* <i>Aralia Sieboldii</i> ( <i>Fatsia japonica Dne. et Pl.</i> ) . . . . .	1 à 2 —
* „ fol. albo var. ( <i>Fatsia japonica Dne. et Pl. fol. var.</i> ) . . . . .	3 à 5 —
* „ fol. aur. var., vide Neuheiten pag. 2.	
** <i>Thibautii Hort. Belg.</i> . . . . .	1 —
* trifoliata ( <i>Pseudopanax crassifolia C. Koch. var. trifolia</i> ) . . . . .	— 20
** umbraculifera ( <i>Paratropia</i> ) . . . . .	1 —
** <i>Bacobotrys trichotoma Hort. Lind.</i> . . . . .	1 15
* <i>Botryodendron macrophyllum</i> . . . . .	5 —
<i>Brassaiopsis speciosa Dne. et Pl.</i> ( <i>Gastonia Candollei Hort.</i> ) . . . . .	1 10
* <i>Fatsia japonica Dne. et Pl.</i> , vide <i>Aralia Sieboldii</i> .	
<i>Gastonia palmata Hort.</i> ( <i>Trevesia palmata Vis.</i> ) . . . . .	15 Gr. à 2 —
** <i>Oreopanax dactylifolium Dne. et Pl.</i> . . . . .	3 à 4 à 30 —
** gracile. <i>Dne. et Pl.</i> . . . . .	2 —
** guatemalense <i>Pl. et Lind.</i> ( <i>Aralia guatemalense Hort.</i> ) . . . . .	1 —
** macrophyllum <i>Dne. et Pl.</i> . . . . .	3 à 5 —
** nymphaefolium <i>Dne. et Pl.</i> . . . . .	1 —
** peltatum <i>Dne. et Pl.</i> . . . . .	2 à 3 —
<i>Paratropia parasitica Mig.</i> . . . . .	2 à 4 —
<i>Sciadophyllum farinosum Pl.</i> . . . . .	1½ à 6 —
** pulchrum <i>Hort.</i> ( <i>Tupidanthus Puecklerii C. Koch.</i> ) . . . . .	1 —

12 Arten nach unserer Wahl 6 Thlr.

## AROEDEAE.

Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
<i>Aconitias helleborifolius Schott.</i> ( <i>Arum Jacq. Caladium V.</i> ) . . . . .	— 12
<i>Aglaonema commutata Schott.</i> — 25 simplex <i>Bl.</i> ( <i>Agl. integrifolia</i> <i>Schott.</i> , <i>Dieffenbachia integrifolia Hort.</i> ) . . . . .	— 15
<i>Alocasia argyroneura C. Koch.</i> ( <i>Caladium Schoellerii Chant.</i> ) — 8 cuprea <i>C. Koch.</i> ( <i>Alocasia metallica Hooker</i> , <i>Caladium cupreum</i> ) . . . . .	1.15 à 6 —
edulis fol. var., vide <i>Colocasia macrorrhizon</i> fol. var.	
erythraea <i>C. Koch.</i> ( <i>Caladium Schmitzii Hort.</i> <i>Caladium cordatum Versch.</i> ) . . . . .	— 15
gigantea vide Neuheiten p. 1.	
heteroneura <i>C. Koch.</i> ( <i>marmorata Stange</i> ) . . . . .	— 15
longiloba . . . . .	6 —
Lowii <i>Hook.</i> ( <i>Caladium Lowii Hort. Low.</i> ) . . . . .	3 à 5 —
tigrina . . . . .	6 —
Veitchii ( <i>Caladium Veitchii Hort. Veitch.</i> ) . . . . .	3 —
zebrina <i>Hort.</i> ( <i>A. varieg. C.K. et Bché. β zebr. Hort.</i> ) 2½ à 6 —	
<i>Amorphophallus bulbifer Bl.</i> . . . . .	— 15
nivosus . . . . .	2 —
<i>Anthurium albo-costatum Mig.</i> ( <i>A. crassinervum Schott.</i> ) . . . . .	1 10
Augustinianum <i>C. Koch.</i> 1 à 2 —	
coronarium <i>Hort.</i> . . . . .	— 10
glaucescens <i>Kunth</i> . . . . .	— 15
imperiale <i>Mig.</i> . . . . .	1 à 2 —
Laucheanum <i>C. Koch.</i> . . . . .	4 —
leuconeuron <i>Lemaire.</i> . . . . .	2 à 3 —
Lindigii . . . . .	—
linguae-folium <i>Lind.</i> . . . . .	1 —
magnificum . . . . .	2 à 10 —
Miquelianum <i>C. Koch.</i> . . . . .	1 15
regale, vide Neuheiten pag. 7.	
rubricaulis . . . . .	2 —
Scherzerianum <i>Schott.</i> , v. p. 7. —	
<i>Arisaema serotina</i> . . . . .	— 20
<i>Sieboldii de Vriese</i> . . . . .	— 20
<i>Caladium affine</i> . . . . .	— 15
<i>Argyrites Chant. et Lem.</i> ( <i>Cal. Humboldtii Schott.</i> ) . . . . .	— 8
argyrosipilum <i>Chant. et Lem.</i> . . . . .	— 12
Baraquinii . . . . .	— 10
Belleyi . . . . .	— 20
bicolor <i>Vent.</i> . . . . .	— 8
bicolor splendens <i>Hort.</i> . . . . .	— 8
Brongniartii ( <i>Chant. et Lem.</i> ) . . . . .	— 8
Cannartii <i>Lind.</i> . . . . .	— 12
Chantinii <i>Lem.</i> . . . . .	— 12

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

<b>Caladium</b> cupreum <i>Chant.</i> , vide C. porphyroneuron <i>C. Koch.</i>	
Duc de Nassau <i>A. Versch.</i> . . .	20
Enkeanum <i>Lauche</i> . . . . .	8
esulentum . . . . .	10
Gaertdii <i>C. Koch.</i> ( <i>C. Rogierii</i> , <i>Chant. et Lem.</i> ) . . . . .	10
Haageanum <i>Lauche</i> . . . . .	6
hastatum <i>Lem.</i> . . . .	8
Houlletii <i>Chant. et Lem.</i> . . . .	8
Maffafa, vide Xanthos. Maffafa.	
mirabile . . . . .	15
Neumannii <i>Chant. et Lem.</i> . . .	6
pallidinervium <i>C. Koch.</i> . . . .	8
pictum <i>D. C.</i> . . . . .	8
picturatum <i>C. Koch.</i> . . . . .	8
albi-nervium . . . . .	15
poecile . . . . .	6
porphyroneuron <i>C. Koch.</i> ( <i>Cal.</i> cupreum <i>Chant.</i> ) . . . . .	8
Regale <i>A. V.</i> . . . . .	10
Reichenheimi . . . . .	12
Rogierii <i>Chant. et Lem.</i> , vide C. Gaertdii <i>C. Koch.</i>	
rubro-venium . . . . .	10
Schillerianum <i>Sch.</i> . . . . .	20
Schmitzii viride . . . . .	10
Telemannii <i>A. V.</i> . . . . .	10
trichlorum . . . . .	10
Troubetzkoyi <i>Chant. et Lem.</i> . .	12
Verschaffeltii <i>Chant. et Lem.</i> . .	8
Wallisii ( <i>Schiller</i> ) . . . . .	10
Wightii <i>Hort. Angl.</i> . . . . .	10
12 Sorten <i>Caladium</i> nach un- serer Wahl . . . . .	2
<b>Colocasias</b> antiquorum fol. petiolis violaceis . . . . .	1
euchlora <i>C. Koch et Sell.</i> . . .	10
Fontanesii . . . . .	10
macrorrhizon fol. albo var. ( <i>Alocasia indica</i> fol. var.)	
15 Gr. à . . . . .	1
violacea ( <i>Calad. violaceum</i> , <i>Xan-</i> <i>thosoma violacea Hort.</i> ) . . .	12

<b>Dieffenbachia</b> Baraquinii <i>Hort.</i>	1 à 2
gigantea vide Neuheiten pag. 3.	
grandis <i>Hort.</i> , . . . 25 Gr. à	2
litturata <i>Schott.</i> ( <i>D. var. Hort.</i> )	15
Seguine picta ( <i>D. picta Schott.</i> )	10
Seguine caulemaculata . . . . .	12
Weirii, vide Neuheiten pag. 3.	
<b>Homanolema</b> rubescens. <i>Kth.</i> .	20
<b>Lasia</b> heterophylla. <i>Schott.</i> . . .	15
<b>Monstera</b> Lennea <i>C. Koch</i> ( <i>Phi-</i> lodendron pertus. <i>Kht.</i> ) . . .	15
<b>Philodendron</b> albo vaginatum .	20
bi-pinnatifidum <i>Schott.</i> , vide pag. 9. . . . .	3
crassinervium <i>Lindl.</i> . . . .	15
panduraefolium . . . . .	10
pertusum <i>Kth.</i> , vide <i>Monstera</i> <i>Lennea C. Koch.</i>	
pinnatum, vide <i>Scindapsus</i> mul- tjugus <i>C. Koch.</i> . . . . .	
quercifolium <i>Hort. belg.</i> . . . .	20
tenuifolium . . . . .	25
§ <b>Pothos</b> argyraea . . . . .	5
species Mirador . . . . .	15
<b>Sauromatum</b> guttatum <i>Schott.</i> .	5
<b>Schismatoglottis</b> picta . . . . .	3
variegata <i>Hk.</i> . . . . .	20
<b>Schyzocasia</b> Portei . . . . .	—
<b>Scindapsus</b> multijugus <i>C. Koch.</i> ( <i>Philodendron pinnat. Kth.</i> )	15
pictus, vide Neuheiten pag. 4.	
<b>Spathophyllum</b> cannaefolium. <i>Schott.</i> . . . . .	3
<b>Stedniera</b> colocasioides <i>C. Kch.</i>	10
<b>Syngonium</b> auritum <i>Schott.</i> . .	10
Wendlandii <i>Schott.</i> . . . . .	15
<b>Xanthosoma</b> maculata <i>Blass.</i> .	10
appendicul. <i>Schott.</i> atrovirens. ( <i>Caladium auritum Hort.</i> ) . . .	15
Maffafa . . . . .	10
pilosa <i>C. Koch.</i> . . . . .	15
violacea <i>Hort.</i> . . . . .	10

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl  
12 Arten für 4 Thlr.: 25 Arten für 8 Thlr.  
Au choix de l'établissement: 12 espèces pour 4 Thaler, 25 espèces pour 8 Thlr.

## ASPHODELEAE R. BR.

BEAUCARNEA, CORDYLINE, DASYLIRION, DRACAENA ETC.

Thlr.Gr.

<b>Astelia</b> Banksi <i>R. B.</i> var. albo-lineata . . . . .	15
<b>Beaucarnea</b> ( <i>Pincenecticia Hort.</i> ) glauca. Mehrjähr. Pflanzen . . . . .	2
recurvata <i>Ch. Lem.</i> ( <i>Pincenecticia tuberculata Hort.</i> ) Mehrjährige Pflanzen . . . . .	1½ à 3
Starke Prachtexemplare . . . . .	30 à 40

	Thlr.Gr.
<b>Blandfordia grandiflora</b> <i>R. B.</i> . . . . .	1 à 2 —
<b>Chlorophytum</b> <i>Orchideastrum Lindl.</i> . . . . .	— 10
<i>Sternbergianum Stand.</i> . . . . .	— 5
<b>Cordyline</b> <i>Banksii. Hook. fil.</i> . . . . .	1 à 3 —
<i>cannaefolia R. Br.</i> . . . . .	15 à 1 —
<i>indivisa (Dracaena indivisa, Dracaena superbiens C. Koch)</i>	
3—4 Fuss hohe Pflanzen . . . . .	6 à 10 —
Junge 1—1½ Fuss hohe Pflanzen . . . . .	2 à 3 —
<i>indivisa var. bruneano linearis. Junge Pflanzen</i> . . . . .	2 —
Starke, 3—4 Fuss hohe Pflanzen . . . . .	8 à 12 —
<i>indivisa var. Veitchii. Stark</i> . . . . .	10 —
<i>indivisa vera (Dracaena aureo-lineata)</i> . . . . .	5 à 15 —
<i>stricta vera. Stark</i> . . . . .	5 —
<b>Dasyllirion acrotriche</b> <i>Zucc.</i> . . . . .	5, 12 à 20 —
<i>junceum. Sehr stark</i> . . . . .	40 —
<i>longifolium Zucc.</i> . . . . .	2 —
<i>robustum</i> . . . . .	1 à 2 —
<i>serratifolium Zucc. Stark</i> . . . . .	15 —
" <i>b. glaucum</i> . . . . .	1 à 2 —
" <i>c. gracile</i> . . . . .	1 à 2 —
<b>Doryanthes excelsa</b> <i>R. Br.</i> . . . . .	2 —
<b>Dracaena arborea</b> <i>Lk. (frutescens)</i> . . . . .	— 10
" <i>vera, vide D. Knerkiana.</i>	
<i>australis Endl. (Cordyline australis Hook, Dianella austr. Hort.)</i>	
10 Fuss hohe Prachtexemplare . . . . .	30 —
8 " " Pflanzen . . . . .	20 —
5 " " Pflanzen . . . . .	10 —
1½—2 " " Pflanzen . . . . .	15 Gr. à 1 15
<i>Draco L.</i> . . . . .	10 Gr. à 10 —
" <i>β Boerhavii Ten. Sehr stark und schön</i> . . . . .	25 —
<i>eliptica Desf. (Dr. nigra Hort.)</i> . . . . .	— 12
<i>ensifolia L. (Dianella ensif. Ait.)</i> . . . . .	— 8
<i>erythrorrhachis (Veitch)</i> . . . . .	— —
<i>fragrans Gavl.</i> . . . . .	— 10
<i>grandis Glend. (vide D. term. ros. stricta).</i>	
<i>indivisa Hort., vide Cordyline indivisa.</i>	
<i>javanica Kth. var. maculata (Dr. Sieboldii Hort.)</i> . . . . .	2 —
<i>Knerkiana C. Koch (Dr. arborea vera)</i> . . . . .	1 à 6 —
<i>marginata Lem.</i> . . . . .	— 15
" <i>latifolia Hort. (Dr. Betschleriana Goebb.)</i> . . . . .	— 20
<i>nobilis Hort. (Cordyline nobilis C. Koch)</i> . . . . .	— 12
<i>punctata. Selten</i> . . . . .	1 —
<i>rigidifolia Hort. Par.</i> . . . . .	— 10
<i>rubra Hueg.</i> . . . . .	— 6
<i>siamensis</i> . . . . .	— 10
<i>terminalis (Cordyline terminalis, Dracaena Eschscholtziana)</i> . . . . .	— 6
" <i>ferrea Hort. (Cord. Jacq. Kth. var. purpurea Goebb.)</i> . . . . .	— 10
" <i>rosea Hort. (Cord. Jacquinii Kth. var. rosea)</i> . . . . .	— 10
<i>umbraculifera Jacq.</i> . . . . .	1, 5 à 8 —
<i>Cooperii</i> . . . . .	— 25
<i>limbata</i> . . . . .	1 —
<i>nigrescens</i> . . . . .	2 —
<i>Porteana versicolor</i> . . . . .	Beschreibung . . . 1 15
<i>robusta</i> . . . . .	vide pag. 8. . . . . 2 —
<i>terminalis rosea var. latifolia pendula</i> . . . . .	— 15
" <i>stricta (Drac. grand. Glend.)</i> . . . . .	— 25



**Pincenecticia tuberculata** Hort., vide *Beaucarnea recurvata* Ch. Lem.  
 Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species  
 für 5 Thlr., für 10 Thlr. und für 20 Thlr. je nach dem Werthe oder der  
 Neuheit der Arten.  
 Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour  
 5 Thlr., pour 10 Thlr. et pour 20 Thlr.

## BEGONIA.

### a. Buntblättrige Varietäten.

*A feuilles ornées.*

Thlr.Gr.	Thlr.Gr.
Adolf Widmann ( <i>Scheidecker</i> ).	Helene Uhden ( <i>Dannenb.</i> ).
Argentea ( <i>Schiller</i> ).	Hofgärtner Schwedler.
Argentea.	Imperialis (A. V.) Species . . . — 10
Arthur de Smith.	Lazuli ( <i>Lind.</i> ).
Atricha ( <i>Groenewegen</i> ). Species.	Longipila (A. V.) Species.
Bettina v. Rothschild, vide pag. 7.	Margaritacea.
Constantia ( <i>Laurent.</i> ).	Marginata ( <i>Rolliss.</i> ).
Daedalea (A. V.) Species . . . — 15	Nigro-venia . . . — 10
Duchesse de Brabant.	Nobilis (O. Fstr.)
Fagifolia <i>Fisch.</i> Species. Für	Pearcei, vide Neuheiten pag. 2.
Ampeln . . . — 8	Rex. Echt! . . . — 6
Gasparini.	Smaragdina (A. V.) Species . . — 8
Grandis ( <i>Rolliss.</i> ).	Stigmosa.
Griffithii.	Xanthina Reichenheimii.

Die Sorte, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 5 Gr.  
 12 Sorten 1 Thlr. 20 Gr.

### b. Schön und dankbar blühende Arten.

Thlr.Gr.	Thlr.Gr.
Albo-coccinea <i>Hook.</i> . . . — 10	Fuchsoides. Carminrosa . . . — 6
Coccinata . . . — 8	Heracleifolia ( <i>Schlecht et Ch.</i> )
Comte de Limminghe. Für Am-	Rosa; ricinusähnliche Blätter. . — 12
peln; blassrosa in langen Dol-	Incarnata ( <i>Lk. et Otto</i> ). Rosa . . — 6
den . . . — 10	Lucida ( <i>Haw.</i> ) Prächtig rosa . . — 8
Digswelliana . . . — 10	Praestoniensis. Lebhaft scharlach — 6
Dregei. Rein weiss . . . — 6	

## BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser, denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechslung darin hervor; ihr meistens überraschend schöner Blüthenflor ist um so werthvoller, als er bei vielen Species in den Wintermonaten erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und an Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

Um die Verbreitung dieser interessanten Familie, deren Gattungen und Arten auffallenderweise noch so wenig in den Gärten vertreten sind, möglichst zu begünstigen, haben wir die nachstehenden schönen Species zu äusserst niedrigen Preisen notirt.

Thlr.Gr.	Thlr.Gr.
Aechmea discolor <i>Hook.</i> (Lam- prococcus fulgens <i>Beer</i> ) 10 à — 20	Billbergia amoena <i>Lindl.</i> . . — 10
Ananassa bracteata fol. var. 5 à 7 —	coelestis de Jonghe. (Hoplo- phytum coeleste C. Koch) . — 10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Billbergia</b> <i>Croyiana de Jonghe</i> — 12		<b>Lamprococcus</b> <i>Laurentianus C.</i>	
fasciata <i>Lindl.</i> (B. rhodocya-		<i>Koch Bschrbg.</i> , v. pag. 9. . . . .	1 15
nea <i>Lem.</i> , Hoplophytum		<b>Macrochordium</b> <i>tinctor. Beer</i> . . . . .	3 —
fasciatum <i>Beer</i> ) . . . . .	2 —	<b>Nidularium</b> <i>coriaceum</i> . . . . .	— 15
<i>Liboniana de Jonghe</i> . . . . .	— 10	<i>fulgens Lem.</i> . . . . .	3 —
<i>miniata rosea Hort.</i> . . . . .	— 15	<i>latifolium Hort. Jonghe.</i> . . . .	3 —
<i>Moreliana Brongn.</i> . . . . .	— 20	<i>Scheremetieffii.</i> . . . . .	— 20
<i>quadricolor de Jonghe</i> . . . . .	— 10	<i>splendens.</i> . . . . .	— 20
<i>rubro marginata Lem.</i> . . . . .	— 20	<b>Pitcairnia</b> <i>Altensteinii Lem.</i>	
<i>Skinnerii.</i> . . . . .	1 à 3 —	( <i>Puya Altensteinii Kl.</i> ) . . . . .	— 12
<i>thyrsoidea Mart.</i> . . . . .	— 15	<i>tabulaeformis Hort. Lind.</i> . . . .	— 20
<i>vittata.</i> . . . . .	— 10	<b>Pourretia</b> <i>meridensis</i> . . . . .	— 20
<i>Wiotiana</i> . . . . .	— 10	<i>pungens</i> . . . . .	2 —
<b>Bromelia.</b> <i>Ananas fol. aureo</i>		<i>spec. Mirador</i> . . . . .	1 10
<i>marginatis</i> . . . . .	10 à 15 —	<i>violacea.</i> . . . . .	1 —
<i>bracteata Sw.</i> . . . . .	— 20	<b>Puya</b> <i>Altensteinii Kl.</i> , vide <i>Pit-</i>	
<i>discolor.</i> . . . . .	— 20	<i>cairnia Altensteinii Lem.</i>	
<b>Disteganthus</b> <i>basi-lateralis Lem.</i>	1 10	<i>gigantea</i> . . . . .	3 —
<b>Dykia</b> <i>princeps Lem. Stark</i> . . . .	10 —	<b>Tillandsia</b> <i>bi-vittata Hort. L.</i> . . .	— 20
<i>ramosa. Stark</i> . . . . .	10 —	<i>bulbosa</i> . . . . .	— —
<i>rariflora Schult. Stark</i> . . . . .	10 —	<i>ionantha</i> . . . . .	— —
<b>Eneholirion</b> <i>Jonghei (de Jonghe)</i>	7 —	<i>Schüchii</i> . . . . .	— 10
<b>Guzmania</b> <i>spectabilis Planch.</i>		<i>zonata fol. bruneis (Crypt-</i>	
<i>Sehr stark</i> . . . . .	8 —	<i>anthus zon. Beer fol. brun.)</i> . . . .	— 10
<b>Hechtia</b> <i>Glymiana</i> . . . . .	3 —	<i>zon. fol. viridis (Cryptanthus</i>	
<b>Hoplophytum</b> <i>coeleste C. Koch.</i>		<i>zon. Beer fol. viridis)</i> . . . . .	— 12
<i>vide Billberg coelest de J.</i>		<b>Vriesea</b> <i>brachystachys</i> . . . . .	3 —
<i>fasciatum Beer, vide Billber-</i>		<i>splendens</i> . . . . .	— 25
<i>gia fasciata Lindl.</i>			

Von vorstehendem ausgezeichneten Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl:  
 12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr.; 25 Species für 10 Thlr. und für 20 Thlr.,  
 je nach dem Werthe und der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr.  
 et pour 10 Thlr.; 25 espèces pour 10 Thlr. et pour 20 Thlr.

## FILICES (FARNE).

### Fougères. — Ferns.

Diejenigen, denen ein K vorsteht, werden im Kalthause cultivirt, die, denen ein f vorsteht, sind für's freie Land.

Celles précédées d'un K sont cultiver dans une serre froide, celles précédées d'un f sont tout à fait rustique.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Acrostichum</b> <i>repandum Bl.</i> (= Chrysodum repandum Mett.) . . . . .	Java — 15	<b>Adiantum</b> <i>St. Catharinae Lindl.</i> Brasilien — 15	
<b>Adiantum</b> <i>affine Willd.</i> (= setulosum Sm.)		<i>trapeziforme L.</i> . . . . .	Antillen — 10
<i>Neuseeland</i> — 8		<b>Angiopteris</b> <i>macrophylla de Vr.</i> Sehr	
<i>betulinum Klfs.</i> (= subcordatum Sw.) . . . .	— 20	<i>stark!</i> . . . . .	Ostindien 8 —
<i>f Capillus Veneris L.</i> (= Moritzianum Lk.)		<i>Teysmanni de Vr.</i> . . . . .	Java 6 à 9 —
<i>Südeuropa</i> — 6		<b>K Aspidium</b> <i>Berteroanum Coll.</i>	
<i>cuneatum Langsd. &amp; Fisch.</i> . Brasilien — 8		<i>Juan Fernandez</i> — 10	
<i>curvatum Kauf.</i> . . . . .	Brasilien — 12	<i>K caripense Mett.</i> . . . . .	Brasilien — 20
<i>denticulatum Sw.</i> . . . . .	Antillen — 8	<i>f drepanopterum Mett.</i> . . . . .	? — 10
<i>Féei Veitch.</i> . . . . .	Brasilien 7 —	<i>macrophyllum Sw.</i> . . . . .	Antillen — 10
<i>formosum Br.</i> . . . . .	Neuseeland — 8	<i>species</i> . . . . .	Cuba — 20
<i>lunatum</i> . . . . .	Ostindien — 20	<b>Asplenium</b> <i>alatum Willd.</i> trop. Amerika — 15	
<i>macrophyllum Sw.</i> . . . . .	Antillen — 10	<i>Belangerii Kze.</i> . . . . .	Java 10 Gr. à 1 15
<i>pentadactylon Langsd. &amp; Fisch.</i> Antillen — 10		<i>bulbiferum Forst.</i> . . . . .	Neuholland — 10
<i>scoparium</i> . . . . .	Brasilien — 6	<i>K consimile</i> . . . . .	1 —
		<i>cyrtopterum Kze.</i> . . . . .	Venezuela 1 15

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Asplenium dispersum</i> Kze.	Mauritius — 10	<i>K Lomaria alpina</i> Spreng.	Neuholland — 20
<i>K ebenum</i> Ait.	Nordamerika — 10	<i>K blechnoides</i>	— 10
<i>f filix femina</i> var. <i>Frizelliae</i>	— 10	<i>K fluviatilis</i>	— 20
<i>flabellifolium</i> Cav.	Neuholland — 15	<i>K Patersonii</i> Spreng. (= <i>Blechnum Patersonii</i> Mett.)	Neuholland — 10
<i>K foeniculaceum</i> H. B. K. (= <i>mexicanum</i> Mart. & Gal.)	Mexico — 10	<i>Marattia cinctaeifolia</i> Kaulf.	Brasil. 4 à 6 —
<i>heterodon</i> Kze.	Java — 20	<i>Laucheana</i> Blass.	Mexico 8 —
<i>lucidum</i> Forst.	Neuholland — 10	<i>K Microlepia strigosa</i>	— —
<i>rachirrhizon</i> Radd.	Brasilien 1 20	<i>Myriopteris lentigera</i> Fée (= <i>Cheilanthes lentigera</i> Sw.)	Süd-Amerika — 25
<i>f Asplenium trichomanes</i> L.	Europa — 5	<i>Neottopteris Nidus</i> Sm.	Ostindien 3 —
<i>viviparum</i> P.	Mauritius — 15	<i>Nephrodium molle</i> R. Br. (= <i>Aspid. molle</i> Sw.)	Tropenländer — 20
<i>Blechnum fraxineum</i> Willd.	Columbien — 8	<i>Nipholobus Gardneri</i> Sw. (= <i>Polypod. Gardneri</i> Mett.)	Ceylon — 15
<i>Campyloneuron Phyllitidis</i> Pr. (= <i>Polypod. Phyllitidis</i> L.)	Trop. Amerika — 10	<i>Lingua</i> Spreng. (= <i>sinensis</i> Hort.)	Ostindien — 10
<i>repens</i> Pr. (= <i>Polypod. repens</i> L.)	— 10	<i>K Osmunda javanica</i> Bl.	Java 4 —
<i>K Cibotium glaucescens</i> Kze.	China 15 à 1 —	<i>f regalis</i> L.	Europa — 10
<i>Coniogramma javanica</i> Fée (= <i>Gymnogramma javanica</i> )	Java 1 —	<i>f cristata</i>	— 20
<i>Cyrtomium falcatum</i> Pr. (12 Stück 2 Thlr., 25 Stück 3 Thlr. 20 Gr.)	Japan — 6	<i>K Pellaea cordata</i> Sm.	Trop. Amerika — 10
<i>Dictyoxylum panamense</i> Hook.	Panama — 20	<i>Phegopteris divergens</i> Fée.	Ostindien — 15
<i>Diplazium polypodioides</i> Bl.	Java — 10	<i>macroptera</i> Fée	Brasilien — 15
<i>Doryopteris pedata</i> Sm. (= <i>Pteris palmata</i> Willd.)	Südamerika — 10	<i>Phlebodium aureum</i> Br. (= <i>Polypod. aur. L.</i> )	Trop. Amerika — 10
<i>Drynaria coronans</i> Sw. (= <i>Polypod. heracleum</i> Kze.)	Ostindien — 15	<i>Phymatodes longipes</i> Sm. (= <i>Polypod. terminale</i> Spreng.)	Malaïen-Archipel — 15
<i>musaeifolia</i> Sw. (= <i>Polyp. musaeifolium</i> Bl.)	Malaïen-Archipel — 20	<i>pustulata</i> Pr. (= <i>Polypod. pustulatum</i> Pr.)	Neuseeland — 10
<i>Elaphoglossum callaeifolium</i> Sm. (= <i>Acrostichum brevipes</i> Kze.)	Java — 10	<i>Platyceium alciorne</i> Gaud.	Ostindien — 15
<i>viscosum</i> Th. Moore (= <i>Acrostichum viscosum</i> Sm.)	Trop. Amerika — 15	<i>grande</i> Sm.	Philippinen 4 —
<i>Eupodium Kaulfussi</i> Sm. (= <i>Marattia macrophylla</i> Hort.)	Brasilien 6 —	<i>Stemaria</i> Desv.	West-Afrika 12 —
<i>Gleichenia dicarpa</i> Br.	Tasmanien 1 15	<i>Pocillopteris flagellifera</i> Sm. (= <i>Acrostichum flagelliferum</i> Wall.)	Ostindien 20 —
<i>dichotoma</i> Hook.	alle Tropenländer 1 —	<i>K Polystichum acrostichoides</i> Schott. (= <i>Aspid. acrostichoides</i> )	Nord-Amerika — 10
<i>Goniophlebium appendiculatum</i> Sm. (= <i>Polypod. appendiculatum</i> Lindl.)	Trop. Amerika 1 —	<i>K vestitum</i> var. <i>venustum</i>	— —
<i>fraxinifolium</i> Sm. (= <i>Polypod. fraxinifol. Jacq.</i> )	Trop. Amerika — 15	<i>Pteris argyrea</i> Lind.	Ostindien — 15
<i>loriceum</i> Sm. (= <i>Polyp. latipes</i> Langsd. & Fisch.)	Trop. Amerika — 20	<i>aspericaulis</i> Wall.	Ostindien — 15
<i>neriifolium</i> Sm. (= <i>Polypod. nerifol. Sw.</i> )	Brasilien — 15	<i>K cretica</i> alb. lineata (12 St. Thlr. 1. 18., 25 St. 3 Thlr.)	Japan — 5
<i>subauriculatum</i> Sm. (= <i>Polypod. Reinwardtii</i> Kze.)	Malaïen-Archipel — 20	<i>K flabellata</i> Thunbg. (= <i>ascensionis</i> Sw.)	Insel Ascension — 15
<i>Goniopteris crenata</i> Pr. (= <i>Polypod. crenatum</i> Sw.)	Westindien — 15	<i>glauco-virens</i> Goldm.	Ceylon — 20
<i>Giesbrechtii</i> Hort. (= <i>Lonchitis Giesbrechtii</i> )	Südamerika — 10	<i>K longifolia</i> L.	Südeuropa — 10
<i>Gymnogramme davallioides</i>	Peru — 10	<i>memoralis</i> fol. var. <i>Hort. Angl.</i>	— 10
<i>ferruginea</i> Kze.	Peru — 15	<i>pyrophylla</i> Sw.	Brasilien — 15
<i>gracilis</i> Hybride	— 10	<i>repandula</i> Lk.	Ostindien — 10
<i>K japonica</i> v. <i>Stieb.</i>	Japan 1 15	<i>K Pteris semipinnata</i> L.	China — 10
<i>Laucheana</i> C. Koch <i>Hybride</i>	— 10	<i>K serrulata</i> L.	Japan — 6
<i>L'Herminieri</i> Bory	Quadaloupe — 10	<i>tricolor</i> Lk.	— 15
<i>Martensii</i> Bory <i>Hybride</i>	— 15	<i>Schizoloma ensifolia</i> Sm.	Malaïen-Archipel 2 —
<i>Mayeriana</i> <i>Hybride</i>	— 15	<i>Selaginella apus</i> L.	Nord-Amerika — 10
<i>Wettenhalliana monstrosa</i> Hybr. 15 Gr. à 1 —	—	<i>caulescens</i> Wall.	— 10
<i>Hymenodium crinitum</i> Fée (= <i>Acrostichum crinitum</i> L.)	Westindien 1½ à 3 —	<i>convoluta</i> Spreng. (= <i>paradoxa</i> Hort.)	Brasilien — 15
<i>Hypoderris Brownii</i> Sm.	Trinidad — 10	<i>cuspidata</i> Lk.	Mexico — 10
<i>f Lastraea cristata</i> Pr.	Europa — 10	<i>erythropus</i> Spring. (= <i>umbrosa</i> .)	— 8
<i>f filix mas</i> Pr.	Europa — 6	<i>Griffithii</i>	— 20
<i>f „ „ var. monstrosa</i>	— 15	<i>haematosides</i> Kze. (= <i>filicina</i> Spring.)	Columbien — 15
<i>marginalis</i> Pr. (= <i>Aspid. marginale</i> Sw.)	Nordamerika — 15	<i>f japonica</i> v. <i>Lieb.</i>	Japan — 15
<i>K Opacca</i> Hooker	— 20	<i>laevigata</i> Willd. (= <i>caesia arborea</i> Hort.)	— 15
<i>K Sieboldii</i> Th. Moore (= <i>Aspid. Sieboldii</i> v. H.)	Japan 1 Thlr. — 10	<i>Lyallii</i> Hook & Gr.	Madagascar — 15
<i>K Lastraea Standishii</i> Th. Moore.	Japan. 2 —	<i>Martensii</i> albo var.	— 10
<i>K strigosa</i> Pr. (= <i>Aspidium strigosum</i> Willd.)	Mauritius — 15	<i>pilifera</i> A. B. (= <i>leptophylla</i> Hort.)	— 15
		<i>serpens</i> Spring. (= <i>variabilis</i> Hort.)	Ostindien — 8
		<i>viticulosa</i> Kl.	Columbien — 10
		<i>Willdenowii</i> Hort. (= <i>pubescens</i> Wall.)	Ostindien — 15
		<i>f Struthiopteris germanica</i> Willd.	Stark. Europa — 10
		<i>f Woodsia ilvensis</i> Br.	Alpen — 6

Aus Vorstehenden liefern wir:

12 Sorten nach unserer Wahl für 2 Thlr. und für 4 Thlr.

24	„	„	„	4	„	„	8	„
50	„	„	„	9	„	„	17	„



# BAUMFARNE.

FOUGÈRES EN ARBRE. — TREE FERNS.

Thlr. Gr.

<b>K. Alsophila australis</b> R. Br. (= <i>Cyathea medullaris</i> ).	3 Fuss Stammhöhe	Neuseeland	20 —
<i>contaminans</i> Wall. (= <i>A. glauca</i> J. Sm.).	Sehr stark.	Westindien.	40 —
<i>guyanensis</i> Hort.		Guyana.	3 —
<i>inermis</i> Kze.		Brasilien.	8 —
<i>latebrosa</i>			5 —
<i>Miquelii</i> Kze.		Java	1 15
<b>Asplenium glaberrimum</b> Mett.		Java	10 —
<i>Sheperdii</i> Spreng. (= <i>Diplazium Sheperdii</i> Lk.)		Antillen	2 —
<b>K. Balantium Karstenianum</b> Kl.		Venezuela	4 —
<b>K. Sellowianum</b> Pr.		Brasilien	60 —
<b>K. Blechnum brasiliense</b> Desv.		Brasilien	2 à 4 —
<b>Cibotium princeps</b> Klfs.			30 à 40 —
<i>Schiedei</i> Schlecht.		Brasilien	1 à 4 —
<b>K. Cyathea dealbata</b> Sw.		Neuseeland	15 —
<b>K. Dicksonia antarctica</b> Labill. (= <i>Balantium antarcticum</i> Pr.).		Australien	5 à 30 —
<b>K. squarrosa</b> Sw.		Neuseeland	40 —
<b>Didymochlaena lunulata</b> Desv.		trop. America	15 à 20 —
<b>K. Lomaria discolor</b> Hort.		Neuseeland	1 1/2 à 6 —
<b>K. falcata</b> Spgl.		Neuholland	3 à 6 —
<b>K. magellanica</b> Desv. (= <i>zamiaefol.</i> Gard.).		Südafrika	4, 8, 15 à 30 —
<b>Lotzea diplazioides</b> Kl. (= <i>Diplazium Klotzschii</i> Fée.)		Columbien	2 15
<b>Phegopteris spectabilis</b> Fée.		Trop. America	2 —

## GESNERIACEAE.

Achimenes.

1. Ambr. Verschaffelt.	10. grandiflora.	19. picta.
2. carminata splendens.	11. » fl. fl.	20. purpurea multiflora.
3. Caspar Schinz.	12. » Fr. Debois.	21. pygmaea.
4. cuprea.	13. longiflora.	22. rosea magnifica.
5. Dazzle.	14. » macrantha.	23. rouge feu d'orée.
6. Dr. Buenz.	15. » margarita.	24. Sir Freherrn Thomes.
7. Escheriana.	16. Mauve Perfection.	25. Skinneri.
8. Georgiana.	17. Mauve Queen.	26. violacea semipleno.
9. heterophylla.	18. pedunculata.	

Die Sorte 4 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Dircaea Douglasi</b>	— 15	<b>Gloxinia pyramidalis</b>	2 —
» <i>refulgens</i>	— 20	<b>Ligeria barbata</b>	— 8
<b>Drymonia punctata</b>	— 10	<b>Mandirola Brünawi</b>	— 5
<b>Gesneria barbata</b>	— 10	<b>Naegelia.</b>	
» <i>bulbosa</i>	— 10	1. amabilis.	10. Mad. A. Lacomblé.
» <i>caracasana pallida</i>	— 12	2. bicolor.	11. Mad. van Houtte.
» <i>Donkelaari</i>	— 25	3. Cerise d'or.	12. rosea odoratis-
» <i>Duc de Brunswick</i>	— 25	4. Ch. Raes.	sim.
» <i>gloxaeiniflora</i>	1 —	5. Chromatella.	13. Sappho.
» <i>Leopoldi</i>	— 20	6. cinnabarina.	14. Scepter corail.
» <i>Miellezi</i>	— 20	7. » ignea.	15. zebrina marmo-
» <i>tubiflora</i>	— 10	8. cymosa.	rata.
<b>Gloxinia maculata insignis</b>	— 20	9. Leichtlini.	16. zebr. splendens.
» <i>punctulata</i>	— 15	6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.	

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Nyphaea alba</b> . . . . .	— 8	<b>Sinningia Primevère</b> . . . . .	— 15
» <i>anecochilifolia</i> . . . . .	— 15	<b>Stauranthera grandiflora</b> . . . . .	— 10
» <i>rubida</i> . . . . .	— 6	<b>Stenogastra concinna</b> . . . . .	— 25
<b>Sinningia purpurea</b> . . . . .	— 15	» <i>multiflora</i> . . . . .	— 20

## Tydaea.

1. Agathe.	7. Fortschritt.	13. Lucie Gishen.
2. Baron de Prêt.	8. Goldfassan.	14. Perle der Tydaeen.
3. Bijon.	9. Harlequin.	15. Philip Müller.
4. Comte de Flandre.	10. Lisette.	16. Princeps.
5. Dr. Piccouline.	11. Meteor.	17. venosa.
6. Eckhauti.	12. Ortgiesi.	

# Exotische Gewächse,

die zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden,  
und  
Tropische Fruchtbäume.

Plantes utiles et officinales, et Arbres à fruits des Tropiques.

Die mit einem \* bezeichneten sind Kalthaus - Pflanzen, und diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.

*Celles précédés d'un \* sont de serre froide, et celles désignées † sont des plantes de plein air.*

	Thlr. Gr.
<b>Acalypha colorata Spreng.</b> Gegen Hautkrankheiten angewendet . . . . .	— 8
<b>Adansonia digitata L.</b> Affenbrotbaum. Die getrockneten und zerriebenen Blätter mischen die Neger unter dem Namen Alo oder Lala unter die meisten ihrer Speisen . . . . .	1 1/3 à 3 —
<b>Adiantum concinnum H. B. K.</b> Wird in Caracas bei Brustkrankheiten angewendet . . . . .	— 10
* <b>Agave americana L.</b> } Liefern das Pulque d. Mexicaner. Das Faser-	6 Gr. à 1 10
* » <i>sobolifera Salm.</i> } werk d. Blätter wird zu Seilen etc. verwendet. — —	— —
<b>Amomum Cardamomum L.</b> Liefert Cardamomum rotundum . . . . .	— 8
» <i>Afzeli Rosc.</i> . . . . .	— 15
» <i>Grana Paradisi L.</i> Die unreifen Samen kommen als Paradieskörner in den Handel . . . . .	— 20
<b>Anona Cherimolia Mill.</b> Kleiner Baum, dessen grosse grüne Früchte fast die Form eines Tannenzapfens haben; ihr Fleisch ist schmelzend und von angenehmem Geruch u. Geschmack . . . . Nord-Afrika	2 15
» <i>muricata L.</i> Flaschenbaum. } Beide sind ein beliebtes Obst — 15	— 15
» <i>squamosa.</i> Zimmetapfel d. Antillen. } der Tropengegenden. 1 20	1 20
<b>Antiaris toxicaria, Leschen.</b> Der Upasbaum von Java . . . . .	— —
* <b>Aralia papyrifera.</b> Chinesische Papierpflanze . . . . .	10 Gr. à 1 —
<b>Araucaria brasiliensis, A. Rich.</b> . . . . .	— 15
» <i>excelsa R. Br. (Ait.)</i> } Alle drei haben essbare Samen. . . . 4 à 70 —	— 15
» <i>imbricata Pav.</i> . . . . .	15 Gr. à 20 —
* <b>Arbutus Unedo L.</b> Erdbeerbaum. Aus den fade-süssen Beeren bereitet man auf Corsika einen Wein, in Italien einen vortrefflichen Alkohol . . . .	— 20
<b>Areca Catechu B.</b> Liefert das Catechu der Apotheken. Die Kerne der unreifen Früchte in Verbindung mit den Blättern von Piper Betle und etwas Muschelkalk, liefern den Indiern das Betel . . . . .	10 —
<b>Arenga saccharifera La Bill.</b> Erzeugt Zucker und Sago . . . . .	12 —
<b>Artocarpus incisa Lin. fil.</b> Brotbaum . . . . .	— —
<i>integrifolia B. fil.</i> . . . . .	3 —

<i>Artocarpus rigida</i> Blum. . . . .	1 —
<i>Baphia nitida</i> Lodd. Das Holz kommt unter dem Namen Camwood nach England in den Handel, und soll dem Fernambuc vorzuziehen sein . . . . .	— 20
<i>Barringtonia racemosa</i> Bl. ( <i>Stravadium insigne</i> ) . . . . .	1 10
<i>Bertholletia excelsa</i> H. B. Schöner Baum, welcher die amerikan. Juvia-Nüsse liefert . . . . .	2 à 3 —
<i>Blighia Sapida</i> Koenig. ( <i>Cupania Akeesia</i> .) Blätter u. Früchte wirken zusammenziehend . . . . .	2 —
<i>Bombax Ceiba</i> L. Die Wurzelrinde wird in Westindien bei Verwundungen angewendet . . . . .	2 —
<i>Brownea grandiceps</i> Jacq. Der Aufguss der Blumen wirkt zusammenziehend, das Holz soll Blutungen stopfen . . . . .	10 —
<i>Calanthe veratrifolia</i> R. Br. Wird auf den Molukken bei Hautwassersucht angewendet . . . . .	5 —
* <i>Callitris quadrivalvis</i> Vent. Schwitzt aus der Rinde ein Harz, welches erhärtet unter dem Namen Sandarak in den Handel kommt . . . . .	15 à — 20
<i>Calophyllum Madruno</i> H. B. ( <i>Caloph. acuminatum</i> Willd.) Fruchtbaum von Südamerika . . . . .	3 —
<i>Carica Papaya</i> L. Der Melonenbaum . . . . .	— 15
<i>Carludovica palmata</i> R. et B. Aus den Blattrippen werden die Panamahüte gefertigt . . . . .	1 à 2 —
<i>Caryophyllus aromaticus</i> L. Der Gewürznelkenbaum . . . . .	7 —
<i>Caryota urens</i> L. Liefert Sago; auf Ceylon bereitet man aus den abgeschnittenen Blütenkolben durch Auskochen Zucker . . . . .	4 à 20 —
<i>Castilloa Cervant. elastica</i> . Der Kautschukbaum von Tabasco . . . . .	6 —
<i>Cedrela febrifuga</i> Bl. Wird in Ostindien häufig statt der Chinarinde angewendet . . . . .	— 20
<i>Cephaëlis</i> Beeri . . . . .	— 20
<i>Ipecacuanha</i> Rich. (Brechwurzeln . . . . .	1 15
<i>Ceroxylon andicola</i> H. B. Die echte Wachspalme . . . . .	5 à 30 —
* <i>Chamaecrops humilis</i> L. Die von der Rinde befreiten Wurzeln dienen roh als Speise . . . . .	5 à 40 —
<i>Chrysophyllum Cainito</i> B. . . . .	1 15
<i>Cinchona cordifolia</i> Mutis ( <i>C. offic. C., C. pubesc.</i> Vahl.) Chinarinde nitida. Chinarinde . . . . .	1 —
nobilis. Chinarinde . . . . .	2 —
succi-rubra ( <i>C. purpurea</i> R. et P.?) <i>Tuccujensis</i> K. Chinarinde . . . . .	1 15
<i>Cinnamomum aromaticum</i> N. v. E. . . . .	1 à 6 —
dulce N. v. E. Giebt den im Handel gewöhnlichen Zimmet . . . . .	1 15
<i>Coccoloba unifera</i> L. Liefert das westindische Kino, auch werden die Früchte ihrer zusammenziehenden Eigenschaft wegen benutzt . . . . .	1 —
<i>Coffea arabica</i> L. Kaffeebaum . . . . .	— 25
<i>arabica</i> L. var. <i>Mokka</i> . Der echte Mokka . . . . .	1 10
<i>Cookia punctata</i> Retz. <i>Aurantiacee</i> , deren Früchte sehr geschätzt werden . . . . .	1 —
<i>Crescentia Cujete</i> L. Früchte gegen d. Fieber u. bei Hautentzündungen . . . . .	— 25
<i>macrophylla</i> Seem. . . . .	1 à 3 —
<i>Croton cascarilla</i> L. Liefert die Cascarillenrinde . . . . .	1 15
<i>Cupania Akeesia</i> , vide <i>Blighia Sapida</i> Koenig . . . . .	2 —
<i>Dieffenbachia Seguine</i> Schott. Soll blutreinigend sein . . . . .	— 10
<i>Dillenia speciosa</i> Thunb. Die geruchlose, scharf schmeckende Rinde wird auf Ceylon und Java äusserlich bei Gicht angewendet . . . . .	15 Gr. à 3 —
<i>Dracaena Draco</i> L. Drachenblutbaum von Madeira . . . . .	15 Gr. à 10 —
<i>Drimys Winterii</i> Forst. ( <i>Wintera aromatica</i> Murr.) Die Rinde ist ein bekanntes ausgezeichnetes Heilmittel . . . . .	1 —
<i>Durio zibethinus</i> L. Der geschätzteste Fruchtbaum der Molukken . . . . .	4 —
<i>Elaeis guianensis</i> J. D. Oelpalme . . . . .	4 à 6 —
* <i>Ephedra distachya</i> L. . . . .	— 20



* <i>Ephedra monostachya</i> L. Die Abkochung der Zweige wird als schweiss-treibendes Mittel benutzt	— 20
<i>Erythrina Corallodendron</i> L. Rinde und Blätter wirken abführend, die pulverisirten Samen werden in Südamerika bei Epilepsie angewendet	— 8
<i>Eugenia Jambosa</i> L. Mit wohlschmeckenden Früchten	2 —
* <i>Ugnii</i> Hook. et Arn. Diese Myrtacee liefert wohlschmeckende kirschen-ähnliche Früchte	— 8
<i>Eugenia Micheli</i> Lam. ( <i>E. uniflora</i> L.) Der Kirschbaum Brasiliens. Früchte cannellirt, hellroth, saftig-zuckersüss u. von der Grösse einer Herzkirsche	2 —
<i>Euterpe edulis</i> Mart. Die Kohlpalme	6 à 30 —
<i>Fagraea auriculata</i> Jacq.	3 à 6 —
<i>obovata</i> Wall.	1 —
<i>Ficus elastica</i> Roxb. Liefert das amerikanische Kautschuk	— 15
<i>heterophylla</i> L. fil. Die Wurzelrinde wird in Ostindien bei Brustkrankheiten angewendet	— 20
<i>nymphaefolia</i> L. Liefert Kautschuk	— 12
<i>religiosa</i> L. Ist von den Indianern dem Wischnu geheiligt	— 10
<i>Franciscea uniflora</i> Pohl. Wird in Brasilien gegen Schlangenbisse angewendet	— 8
<i>Galactodendron utile</i> Humb. Der Milchbaum	— —
<i>Galipea odoratissima</i> Lindl.	2 à 10 —
<i>Gardenia florida</i> L. Die Früchte werden in China als kühlendes Mittel verwendet	— —
<i>Garzinia Mangostana</i> L. Liefert wohlschmeckende u. schöne Früchte	4 —
<i>Gnetum Gnum</i> L.	2 —
<i>Gossypium</i> L. <i>arborescens</i> . Der Baumwollenbaum	1 10
<i>herbaceum</i> L.	— 20
† <i>Gratiola officinalis</i> L. Wirkt drastisch purgirend	— 4
<i>Guajacum arborescens</i> H. B. ( <i>Zygophyllum arborescens</i> )	1 15
<i>officinale</i> L. Liefert, nebst dem vorstehenden, das zu bekannten, officinellen Zwecken dienende Guajakholz	3 —
<i>Guarea trichilioides</i> L.	2 —
† <i>Gunnera scabra</i> Ruiz & Pav. Die Wurzel wird in Chili und Peru zum Gerben u. Schwarzfärben benutzt	— 8
† <i>Gymnadenia conopsea</i> R. Brown. Giebt Salep	— 3
<i>Haematoxylon campechianum</i> L. Liefert das im Handel bekannte Campecheholz	1 à 2 —
<i>Hippomane spinosa</i> L. Dorniger Mancinellenbaum	2½ à 4 —
* <i>Houttuynia cordata</i> Thunbg. Sehr gebräuchl. Heilmittel in Cochinchina	— 8
<i>Hura crepitans</i> L. Streusandbüchsenbaum. Von den Homöopathen sehr geschätzt	2 à 3 —
* <i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam. Die Blätter werden in Peru zur Heilung von Wunden benutzt	— 8
<i>Jambosa lanceolata</i> . Mit sehr geschätzten Früchten	1 —
* <i>Jasminum grandiflorum</i> L. Aus den Blüthen wird das Jasminöl gewonnen	— 8
<i>Jatropha utilis</i> . Liefert das Tapioca- und Cassava-Mehl, welches in Westindien zum Brotbacken benutzt wird	1 10
* <i>Ilex paraguayensis</i> St. Hil. Paraguay-Thee	— 15
* <i>Illicium anisatum</i> L. Sternanis	— 10
<i>floridanum</i> L.	— 8
<i>Isonandra Gutta</i> Lindl. Liefert das echte Gutta-Percha	12 —
<i>Kaempferia Galanga</i> L. Galgantwurzel	— 15
* <i>Laurus Camphora</i> L. ( <i>Laurus officin. N. v. E.</i> ) Kampherbaum	— 10
<i>nobilis</i> L. Lorbeer	15 Gr. à 35 —
<i>Machaerium firmum</i> . Liefert das seltene Palisander- oder Veilchenholz	2 15

† <i>Magnolia acuminata</i> L.	8 Gr. à	1 —
† <i>glauca</i> L.	Die Rinde ist in Nordamerika gegen Wechselfieber gebräuchlich	1 10
† <i>macrophylla</i> Mchx.		2 —
† <i>tripetala</i> L.		5 Gr. à 15
* Youlan. Desf. Die bittern Samen werd. in Chinageg. Fieber angewendet	15 Gr. à	20
§ <i>Mikania speciosa</i> . Liefert ein Mittel wider den Schlangenbiss		— 6
<i>Mimusops bullata</i>		— —
<i>Musa Cavendishii</i> Pat. (M. chinensis Sw.) Bananenbaum	1, 4 à	6 —
<i>textilis</i> N. v. E. Liefert die Manilla-Matten		3 —
<i>Myristica moschata</i> Thunb. Liefert die Muscatnüsse		15 —
<i>Myrospermum frutescens</i> Jacq. (Myroxylon frutescens Willd.) Liefert den peruvianischen Balsam		2 15
* <i>Nartex Assa foetida</i> . Liefert das echte Assa foetida		— —
<i>Nectandra Rodiei</i> . Liefert das Werkholz Hart-Green und seine Rinde das Bibrin	Guyana. 4 à	6 —
* <i>Nymphaea alba</i> L.	Der Wurzelstock der Ersteren wird in China, der der Zweiten in Aegypten als Nahrungsmittel benutzt	— 6
* <i>Lotus</i> L.		— 10
<i>Oldfieldia africana</i> Booth et Hook. Afrikan. Eisenholz		2 15
* <i>Olea europaea</i> L. Oelbaum		— 10
† <i>Ophrys arachnites</i> Reich.		— 5
† <i>Myodes</i> Jacq.		— 3
† <i>Orehis fusca</i> Jacq.		— 3
† <i>latifolia</i> L.		— 3
† <i>muculata</i> L.		— 3
† <i>mascula</i> L.	Die Knollen dieser Erd-Orchideen liefern ein sehr geschätztes Salep (Stärkemehl)	— 3
† <i>Morio</i> L.		— 3
† <i>pallens</i> L.		— 3
† <i>pyramidalis</i> L.		— 5
† <i>sambucina</i> L.		— 5
† <i>ustulata</i> L.		— 8
† <i>variegata</i> All.		— 5
† <i>Osmunda regalis</i> L. Aus dem Wurzelstock wird ein Extract bereitet		— 10
<i>Oryza sativa</i> L. Die Reispflanze		— 5
<i>Pandanus odoratissimus</i> L. fil. Ist eine in China und Cochinchina sehr gebräuchliche Arzneipflanze		8 —
<i>utilis</i> Bory. Mit sehr wohlgeschmeckenden Früchten	2 1/3 à	25 —
<i>Papyrus antiquorum</i> Willd. Die Papierpflanze der alten Aegypter		1 —
<i>Paritium elatum</i> Don. (Hibisc. elatus Swartz.) Die faserige Rinde liefert den bekannten brauchbaren Bast		1 —
<i>Parkia africana</i> R. Br. Nach Clapperton werden die Samen wie Kaffee geröstet und ähnlich benutzt		1 —
<i>Passiflora edulis</i> Sims. Früchte essbar		— 15
<i>Pavetta indica</i> L. Wird bei Unterleibskrankheiten angewendet		— 15
* <i>Pelargonium Endlicherianum</i> Fenzl. Ein in der Türkei gebräuchliches Wurmmittel		— 20
<i>Peperomia maculosa</i> Hort. (Piper macul. et variegata.)		1 10
<i>Persea gratissima</i> Gaertn. Fruchtbaum d. Antillen mit grossen, birnenartigen, sehr wohlgeschmeckenden u. saftigen Früchten		2 15
<i>Phoenix dactylifera</i> L. Die Dattelpalme		3 —
* <i>Phyllocladus trichomanoides</i> Don. Die Rinde wird zum Roth- und Schwarzfärben verwendet		1 10
<i>Phytelephas macrocarpa</i> R. et P. Liefert das vegetabilische Elfenbein	8 à	12 —
<i>Pimenta vulgaris</i> Lindl. (Eugenia Pimenta D. C.)		1 —
† <i>Pinus Cembra</i> L. Liefert die essbaren Zirbelnüsse	1 1/3 à	2 —
† „ <i>maritima</i> Lamb. Giebt verschiedene Harzprodukte		2 —
† „ <i>Massoniana</i> Lamb. Das ausgeschwitzte Harz wird in China bei Lungenkrankheiten angewendet		— 15

† <i>Pinus Taeda L.</i>	Liefert ein dem Weihrauch sehr ähnliches Harz . . .	— 15
<i>Piper Betle L.</i>	Der Betel der Malayen . . . . .	— 10
<i>Cubeba L. fil.</i>	Bekanntes officinelles Mittel . . . . .	— 12
<i>longum L.</i>	Wird in Indien als Arzneimittel hochgeschätzt . . . . .	— 10
<i>nigrum L.</i>	Giebt den im Handel gebräuchlichen schwarzen u. weissen Pfeffer . . . . .	— 10
<i>Pistia stratiotes L.</i>	Wird in Ostindien als kühlendes Mittel angewendet . . . . .	— 5
<i>Pogostemon Patchouli Pelod.</i>	Patchouli liefernd . . . . .	— 6
* <i>Prunopitys elegans Phil.</i>	Kirschenfrucht. Eibe. Neue Conifere von Chili, welche wohlschmeckende Früchte hervorbringt . . . . .	1 —
<i>Psidium Cattleyanum Sabin.</i>	Erzeugt delicate, pflaumenartige Früchte . . . . .	1 15
<i>Psychotria leucocephala A. Brogn.</i>	. . . . .	2 à 10 —
» <i>magnoliaefolia H. B. K.</i>	Die Wurzeln wirken brechenenerregend. . . . .	4 à 8 —
<i>Pterospermum acerifolium Willd.</i>	Die Blumen werden in Ostindien wie bei uns die Malvenblumen angewendet . . . . .	1 —
* <i>Punica Granatum L.</i>	Die Rinde der Wurzeln ist wurmtreibend. . . . .	15 Gr. à 40 —
<i>Quassia amara L.</i>	Giebt die Surinamsche Quassienrinde . . . . .	4 —
<i>Saccharum officinarum L.</i>	Das Zuckerrohr . . . . .	— 10
* <i>Sagittaria sinensis Sims.</i>	Wird in China ihrer essbaren Wurzeln wegen cultivirt . . . . .	— 10
<i>Sagus Ruffia Jacq.</i>	( <i>Metroxylon Ruffia Spr. Raphia Ruffia Hort. Amst.</i> ) Liefert Sago . . . . .	2 à 6 —
† <i>Salisburia adiantifolia Smith.</i>	Die Samenkerne sind wohlschmeckend, auch wird ein Oel aus ihnen gepresst . . . . .	5 Gr. à 1 —
<i>Sapindus Saponaria L.</i>	Der Seifenbaum . . . . .	— 20
<i>Sapota macrocarpa.</i>	Ausgezeichnete und grossfrüchtige Species . . . . .	6 —
<i>Muellerii Lindl.</i>	Gutta-Percha liefernd . . . . .	1 1/2 à — 3
* <i>Saururus cernuus L.</i>	Wurzel u. Blätter werden in Amerika zu erweichenden Umschlägen benutzt . . . . .	— 6
<i>Smilax Sarsaparilla L.</i>	Die Sarsaparilla; geschätztes blutreinigendes Mittel . . . . .	— 12
† <i>Solanum Dulcamara L.</i>	Scharf narkotisch . . . . .	— 5
<i>Stadmannia australis R. Br.</i>	Neuholl. Eisenholzart . . . . .	2 —
<i>Stravadium insigne, vide Barringtonia racemosa Bl.</i>	. . . . .	— —
<i>Strychnos Cabalonga.</i>	Brechnuss von Chiapas . . . . .	2 —
<i>Swietenia Mahagoni L.</i>	Baum, welcher d. Acajou- oder Mahagoniholz liefert . . . . .	— —
<i>Symphonia esculenta Steud.</i>	( <i>Platonia insignis Mart.</i> ) . . . . .	6 —
<i>Syzygium jambolanum Dne.</i>	Ostindischer, zur Familie der Myrtaceen gehöriger Fruchtbaum, dessen Früchte, von der Grösse eines Taubeneies, von schönem rothen Colorit und aromatischem, lieblich weinsäuerlichem Geschmack sind . . . . .	2 15
<i>Tacca pinnatifida Forst.</i>	Giebt aus d. Wurzeln ein vorzügl. Arrow-root. . . . .	3 —
<i>Tamarindus indica L.</i>	. . . . .	15 Gr. à 2 —
* <i>Thea Bohea L.</i>	. . . . .	
<i>chinensis D. C. β assamica</i>	{ Die verschiedenen chinesischen Theesorten à	— 20
* <i>viridis L.</i>		
<i>Theobroma Cacao L.</i>	Der den Cacao liefernde Baum . . . . .	3 à 6 —
<i>Torenia asiatica Lam.</i>	Wird in Ostindien bei Hautkrankheiten angewendet . . . . .	— 5
* <i>Torreya myristica Hook fil.</i>	Californische Muskatnuss . . . . .	3 —
* <i>nucifera Sieb. et Zucc.</i>	Aus den Samenkörnern bereiten die Japanesen ein Oel, welches sie zu ihren Speisen verwenden . . . . .	— 25
<i>Vanilla aromatica Sw.</i>	Liefert das bekannte feine Gewürz . . . . .	2 —
<i>Xanthochymus pictorius Roxb.</i>	( <i>Xanth. tinctorius Dne.</i> ) Der Saft dient zur Färbung seidener Stoffe . . . . .	2 —
<i>Xylopia L. Spr. macrantha</i>	. . . . .	2 à 4 —
<i>Zingiber officinale Rosc.</i>	Ingwer . . . . .	— 8



# ORCHIDEEN.

## ORCHIDÉES. — ORCHIDS.

	Thlr.	Gr.
<i>Acampe multiflora</i> Lindl. ( <i>Vanda multiflora</i> )	Hongkong	1 à 4 —
<i>Acanthophippium bicolor</i>	Ceylon	— —
<i>Acineta</i> Barkerii (Peristeria Barkerii Batem.)	Ceylon	— —
Humboldtii Lindl.	Columbien	2 à 4 —
Humboldtii var. Cerina		10 —
<i>Aërides affine</i> Wall. Stark!	Sylhet	20 —
affine roseum	Sylhet	10 —
„ superbum Hort. Angl.		30 —
verum Hort. Angl.		20 —
crispum Lindl.		12 à 40 —
falcatum Lindl. ( <i>A. Larpentae</i> Hort.)	Ostindien	50 —
Fieldingii (Fox Brush der Engländer)		26 —
Lindleyanum Wight	Kartairy Falls	20 à 25 —
Lobbii Hort.		21 à 30 —
maculosum Lindl.	Bombay	35 à 40 —
nobile Lindl.	Moulmein	20 à 30 —
odoratum Lour. ( <i>A. cornutum</i> Roxb.)	Ostindien	5 à 30 —
quinquevulnerum Lindl.		15 à 30 —
spec. (from England)		12 —
suavissimum Lindl.	Ostindien	15 à 35 —
Veitchii		35 —
Warnerii		15 à 30 —
<i>Anacochilus</i> vide pag. 155.		
<i>Angrecum bilobum</i> Lindl. ( <i>A. apiculatum</i> Hort.)	Cap Coast Castle	12 —
eburneum P. Th. ( <i>A. virens</i> Lindl.)	Madagascar	6 à 20 —
sesquipetale Hook.	Madagascar	80 à 300 —
superbum P. Ph.	Sierra Leone	20 —
<i>Anguloa Clowesii</i> Lindl.	Columbia	5 —
Clowesii major		10 —
<i>Ansellia africana</i> Lindl.	Sierra Leone	30 —
<i>Arpophyllum giganteum</i> Lindl.	Mexico	10 —
<i>Arundina pulchella</i> Teyss. et Binnend.	Java	7 —
<i>Barkeria</i> Skinneri, vide <i>Epidendrum</i> Skinneri.		
<i>Bifrenaria</i> Harrisoniae Rehb. fil. ( <i>Lycaste Harrisoniae</i> Hort.)	Brasilien	3 à 10 —
Harrisoniae b. alba	Brasilien	3 —
<i>Bletia hyacinthina</i> fol. albo striatis, vide pag. 5.		
<i>Brassavola cordata</i> Lindl.	Jamaica	3 à 8 —
Digbyana Lindl.	Honduras	10 —
glauca Lindl.	Mexico	2 à 10 —
Perrinii Lindl. ( <i>B. Martiana</i> Hort.)	Brasilien	2 à 4 —
species Guatemala		8 —
<i>Brassia gigantea</i> Hort. angl.		5 —
maculata R. Br.	Jamaica	3 à 4 —
macrostachya Lindl. ( <i>B. striata</i> Hort.)	Deimerara	2 à 4 —
species Guatemala		8 —
verrucosa Lindl.	Guatemala	4 —
<i>Broughtonia sanguinea</i> R. Br.	Jamaica	5 à 12 —
<i>Burlingtonia fragrans</i>		6 à 10 —
<i>Calanthe</i> , vide auch <i>Preptanthe</i> .		
veratrifolia R. Br.	Ostindien	5 —
„ australis (Hort. angl.)		6 —
<i>Catasetum Naso</i> Lindl.	Columbia	4 —
planiceps Lindl.	Mexico	2 à 7 —
Russellianum Lindl. ( <i>Cynoches viride</i> Hort.)	Guatemala	5 —
sanguineum Lindl.	Neu-Granada, Brasilien	5 —
trifidum Lindl.	Brasilien	2 à 4 —
serratum Lindl. ( <i>C. viridiflavum</i> Hook.)	Central-Amerika	4 —
Warszewiczii Lindl.	Panama	4 —
<i>Cattleya Aclandiae</i> Lindl. β obscura ( <i>C. amethystina</i> Morr.) <i>C. intermedia</i> β amethystina		
Grah.	Brasilien	4 à 12 —
Bogotensis Linden	Bogota	15 à 30 —
Bryssiana, vide <i>Laelia Bryssiana</i>		
candida	Costa Rica	6 —
crispa, vide <i>Laelia crispa</i>		
citrina Lindl.	Oaxacca	3 à 10 —
Dominiana Hort. Veitch. (Hydride)		20 —
Forbesii Lindl.	Rio de Janeiro	4 à 25 —
guttata Lindl.	Brasilien	5 à 25 —
guttata Lindl. b. Leopoldii Lind. et Rehb. fil.	Brasilien	6 à 30 —
Harrisoniae Batem.	Brasilien	10 —

	Thlr.	Gr.
<b>Cattleya</b> <i>Harrisoniae</i> $\beta$ <i>superba</i> . . . . .	15	—
hybrida (Exeter) . . . . .	8	—
labiata <i>Lindl.</i> . . . .	Brasilien	5 à 10
" <i>b. Mossiae</i> . . . . .	La Guyara	5 à 10
" <i>c. splendens Hort. Angl.</i> . . . .	Venezuela	6 à 20
" <i>d. var. Sion House</i> . . . . .		20 —
<i>Lemouliniana Hort.</i> . . . .		20 —
lobata <i>Lindl.</i> , vide <i>Laelia Boothiana Rehb. fil.</i> . . . .		
luteola <i>Lindl.</i> . . . .	Amazonenfluss	5 à 10
maxima <i>Lindl.</i> . . . .	Popayan	12 —
Perrinii, vide <i>Laelia Perrinii</i> . . . . .		— —
quadricolor <i>Batem.</i> . . . .		— —
Skinnerii <i>Bateman</i> . . . . .	Costa Rica	4 à 8
species from Neu-Granada . . . . .		10 —
species from Paraiba . . . . .		12 —
superba <i>Schomb.</i> . . . .	Essequibo	18 à 30
Trianaei <i>Lindl. Rehb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada	12 à 25
vestalis <i>Hoffg. (C. Forbesii Lindl. var.)</i> . . . . .		3 à 7
<b>Chysis</b> <i>bractescens Lindl.</i> . . . .	Peru	3 à 6
<i>Limminghei Lindl.</i> . . . .	Central-Amerika	7 à 10
<b>Cirrhaea</b> <i>saccata Lindl. (C. fusco-luteo Hook.)</i> . . . . .	Brasilien	1 à 3
<b>Coelia</b> <i>Baueriana L. (C. glacialis H.)</i> . . . . .	Jamaica, Cuba	20 à 30
<b>Coelogyne</b> <i>asperata Lindl. (C. Lowii P.)</i> . . . . .	Borneo	5 à 12
<i>cristata Lindl.</i> . . . .	Nepal Sylhet	8 à 15
<i>elegans Hort.</i> . . . .		4 à 8
<i>fimbriata Lindl.</i> . . . .	China. Nepal	3 —
" <i>b. acuminata</i> . . . . .		5 —
<i>fuscescens Hort. angl.</i> . . . .		10 —
<i>maculata Lindl. (Pleione)</i> . . . . .	Assam	— —
<i>pandurata Lindl.</i> . . . .	Borneo	10 —
<i>Parishii Hort. angl.</i> . . . .		4 à 6
<i>Schilleriana Rehb. fil.</i> . . . .	Ostindien	12 —
<i>undulata Hort.</i> . . . .	Ostindien	2 à 6
<b>Comparettia</b> <i>falcata Poepp. Endl.</i> . . . .	Polochie-Fluss	3 —
<b>Cryptoglossa</b> <i>sp. Sierra Leone</i> . . . . .		10 —
<b>Cymbidium</b> <i>aloifolium Sw.</i> . . . .	Ostindien	20 Gr. à 3
<i>ensifolium Sw.</i> . . . .	China	1 —
" <i>b. fuscum</i> . . . . .		3 —
<i>tigrinum</i> . . . . .		3 —
<i>triste Hook.</i> , vide <i>Louisia trichorrhiza</i> . . . . .		
<b>Cypripedium</b> <i>barbatum Lindl.</i> . . . .	Mont Ophir	1 à 3
" <i>b. caulescens</i> . . . . .		— —
" <i>c. majus (C. grandiflorum)</i> . . . . .		2 à 5
" <i>d. nigrescens</i> . . . . .		10 —
<i>Bullenianum Hort. angl.</i> . . . .		10 —
<i>caricinum (Selenipedium Pearcei)</i> . . . . .		20 à 40
<i>Fayrianum Lindl.</i> . . . .	Assam	3 à 8
<i>floribundum Hort.</i> . . . .		— —
<i>hirsutissimum Lindl.</i> . . . .	Assam	5 à 12
<i>Hookerae Rehb. fil.</i> . . . .	Borneo	8 à 20
<i>javanicum Reinw.</i> . . . .	Java	2 à 5
<i>insigne Wall.</i> . . . .	Nepaul	15 Gr. à 3
" <i>var. Maulei Hort.</i> . . . .		7 à 20
<i>Lowii Lindl. (Cypr. cruciforme Zollinger)</i> . . . . .		25 à 40
<i>purpuratum Lindl.</i> . . . .	Mont Ophir	2 à 5
<i>Stonei Hook. fil.</i> . . . .	Borneo	25 à 40
<i>superbiens Rehb. fil. (C. Veitchianum Hort.)</i> . . . . .		12 à 25
<i>venustum Wall.</i> . . . .	Nepal	1 à 4
<i>villosum Lindl.</i> . . . .	Moulmein	6 à 20
<b>Cyrtochillum</b> <i>filipes</i> . . . . .	Guatemala	5 —
<b>Cyrtopodium</b> <i>punctatum Lindl.</i> . . . .	Brasilien	2 à 5
<b>Dendrobium</b> <i>aggregatum Roxb.</i> . . . .	Ostindien	10 à 20
<i>anosum Lindl.</i> . . . .	Philippin	à 20
<i>chrysanthum Wall.</i> . . . .	Nepal	10 à 20
<i>chrysotoxum Lindl.</i> . . . .	Ostindien	5 à 15
" <i>superbum</i> . . . . .		— —
<i>coerulescens Lindl.</i> . . . .	Nangklow	1½ à 10
<i>Dalhouseanum Part.</i> . . . .	Ostindien	6 à 20
<i>densiflorum Lindl.</i> . . . .	Ostindien	8 —
<i>eburneum Hort. angl.</i> . . . .	Ostindien	20 —
<i>Farmerii Part.</i> . . . .	Calcutta	8 à 20
<i>Farmerii var. roseum</i> . . . . .		8 —
<i>fimbriatum Lindl. oculatum</i> . . . . .	Nepaul	7 à 10
"    " <i>giganteum</i> . . . . .		— —
<i>Gibsonii Lindl.</i> . . . .	Ostindien	7 —
<i>Griffithianum Lindl.</i> . . . .	Burma	7 —

	Thr. Gr.
<b>Dendrobium humile</b> Wight.	Ostindien 6 à 10 —
macrophyllum Dayanum Low. jun. Rehb. fil.	Borneo 15 à 40 —
moschatum Wall.	Burma. Pegu 1 à 4 —
Paxtonii Lindl.	5 à 10 —
Pierardii Roxb.	Ganges-Delta 3 à 6 —
sanguinolentum Lindl.	Ceylon 6 —
speciosum Sm.	Port Jackson 2 à 8 —
tortile Lindl. var. roseum	Ostindien 8 —
xanthophlebium Hort. angl.	15 —
<b>Disa grandiflora</b> Lindl.	Cap der guten Hoffnung 8 —
<b>Dyckia Bauerii</b> Lindl.	Jamaica 2 —
<b>Epidendrum adenocarpum</b> Lcarz.	Mexico 3 à 5 —
atropurpureum Wall. (Ep. macrochilum Hook.)	Neu-Granada 6 —
Carthaginense Hort.	2 à 7 —
ciliare L.	Trop. America 20 à 3 —
cinnabarinum Salzm.	Bahia 3 à 8 —
cochleatum L.	Mexico 1 —
dichromum β amabile Hort. angl.	10 —
falcatum Lindl. (E. lactiflorum Rich.)	Mexico 2 —
lilacinum Lindl.	Venezuela 1 à 3 —
nutans Sw.	Westindien 2 à 5 —
patens Sw.	Jamaica 4 —
Skinneri Batem. (Barkeria Skinneri Paxt.)	Guatemala 2 à 6 —
species Guatemala	5 —
Stamfordianum Batem.	Guatemala 2 à 5 —
tigrinum Lindl.	Venezuela 1 à 5 —
vitellinum Lindl.	8 —
b. majus	10 —
<b>Eria rosea</b> Lindl.	Ostindien 6 à 12 —
stellata Lindl.	Java 1 15 —
<b>Eriopsis rutidobulbon</b> Hook. (E. biloba Hort.)	Neu-Granada 15 —
<b>Eulophia streptopetala</b> Lindl.	—
<b>Fernandezia obtusa</b>	Trinidad 7 —
<b>Gongora galeata</b> Rehb. fil. (Acropera Loddigesii Lindl.)	Mexico 1 à 7 —
macrantha Linden.	Westindien 3 à 8 —
quinquenervis R. Br. (G. maculata Lindl.)	Brasilien 1 10 —
truncata	Mexico 3 —
<b>Goodyera procera</b> Hook.	China 2 —
<b>Habenaria Willd. maculata</b> Lindl.	Westindien 16 —
<b>Hartwegia purpurea</b> Lindl.	Mexico 3 —
<b>Houlletia Brokchurstiana</b> Lindl.	Brasilien 4 à 12 —
tigrina	Ocana 8 —
<b>Jonopsis rosea</b> Rehb. fil.	8 à 10 —
tenera Lindl. (J. paniculata)	4 à 6 —
<b>Laelia acuminata</b> Lindl.	Mexico 4 à 6 —
anceps Lindl.	Oaxacca 4 à 6 —
b. Barkeriana (superba Hort.)	5 à 10 —
autumnalis Lindl.	Oaxacca 3 à 8 —
Boothiana Rehb. fil. var. flore albo maculata	15 —
Bryssiana Lemaire (Cattleya Bryssiana Hort., Laelia Stelzneriana Rehb. fil.)	10 à 25 —
cinnabarina Batem.	Brasilien 6 à 12 —
crispa Rehb. fil. (Cattleya crispa Lindl.)	Brasilien 3 à 12 —
elegans Rehb. fil. (Cattleya elegans Morr.)	Brasilien 15 à 30 —
grandis Lindl.	Bahia 15 —
Perrinii Lindl.	Brasilien 6 à 10 —
b. major Hort.	Brasilien 12 —
praestans Rehb. fil.	Brasilien 5 à 15 —
pumila Rehb. fil. var. marginata (Cattleya Pinellii marginata Hort.)	12 à 18 —
purpurata Lindl. nec. L. Bryssiana Lem.	Brasilien 6 à 25 —
superbiens Lindl.	Malacatan 5 à 12 —
Wallisii Lindl.	Rio Negro 35 —
<b>Leptotes bicolor</b> Lindl.	Brasilien 3 —
<b>Limatodes rosea</b> Lindl.	Moulmein 2 à 6 —
rosea b. superba	4 à 8 —
vestalis Rehb. fil.	Ostindien 6 à 8 —
<b>Liparis cylindrostachya</b>	1 à 3 —
elata	Rio Janeiro 1 —
<b>Louisia trichorrhiza</b> Bl. (Cymbidium triste H.)	Ceylon 2 à 4 —
<b>Lycaste aromatica</b> L.	Mexico 1 à 3 —
candida Lindl.	Veraguas 4 —
cruenta Lindl. (L. balsamea A. Rich.)	Guatemala 1½ à 3 —
Deppel Lindl. (Maxill. Deppel Lodd.)	Mexico 2 à 3 —
fulvescens Hook.	Merida 5 —
macrophylla L.	Peru. Caracas 3 à 6 —
Skinnerii Lindl.	Guatemala 4 à 8 —
b. atrorosea	8 —
c. elegantissima	8 —



**Macodes**, vide pag. 155.

	Thlr.Gr
<b>Maxillaria cucullata</b> L. . . . .	Mexico 2 —
Kreyssigii Hort. . . . .	2 —
Meleagris . . . . .	1 10
punctata Lodd. . . . .	Brasilien 1 —
squalens Hook. . . . .	Brasilien 2 —
tetragona Lindl. . . . .	1/2 à 2 —
tricolor Lindl. (M. marginata Fenzl.) . . . . .	1 à 3 —

**Miltonia candida** Lindl.

" b. Jenischiana (M. grandiflora Hort.) . . . . .	Brasilien 4 à 7 —
Clowesii Lindl. b. rosea . . . . .	Brasilien 6 à 12 —
cuneata Lindl. . . . .	Brasilien 15 à 18 —
flavescens Lindl. (Cyrtorchilum stellatum Lindl.) . . . . .	Brasilien 6 —
spectabilis Lindl. . . . .	Brasilien 2 à 6 —
spectabilis β Moreliana (M. Moreliana Hort.) . . . . .	Brasilien 4 à 8 —
	Brasilien 5 à 8 —

**Nephelaphyllum**, vide pag. 155.**Octomeria graminifolia** R. Br. . . . . Brasilien 20 Gr. à 2 —**Odontoglossum aureopurpureum** Rchb. fil.

Bluntii Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada 15 —
Cervantesii Lexarz . . . . .	Bogota 30 —
citrosimum Lindl. . . . .	Oaxacca 4 à 6 —
Ehrenbergii Klotzsch . . . . .	Mexico 6 —
gloriosum Lindl. . . . .	Mexico 6 à 8 —
grande Lindl. . . . .	Ocana 20 —
hastilabium Lindl. . . . .	Guatemala 4 à 12 —
Insleyi Lindl. . . . .	Antillen 15 —
pulchellum Batem. . . . .	Mexico 10 —
" b. grandiflorum . . . . .	Guatemala 3 à 7 —
Reichenheimii Lindl. Rchb. fil. . . . .	5 à 10 —
Rossii Lindl. (O. apterum Lexarz) . . . . .	à 6 —
spec. de Guatemala . . . . .	Mexico 4 à 6 —
triumphans Rchb. fil. (suppos.) . . . . .	7 à 10 —
	Ocana 20 à 25 —

**Oeceoclades falcata** Thunbg. (Vanda spec. de Japan Linden)**Oncidium altissimum** Sw. . . . . Japan 25 —

ampliatum Lindl. b. majus . . . . .	Jamaica 4 —
barbatum Lindl. . . . .	Panama 4 à 8 —
Bauerii Lindl. . . . .	Brasilien 5 à 7 —
bifolium Lindl. . . . .	Süd-Amerika 4 à 8 —
brachyphyllum Hort. Petr. . . . .	Montevideo 15 —
Carthaginense Sw. . . . .	8 —
" b. sanguineum . . . . .	Carthagenia 4 —
Cavendishianum Batem. . . . .	4 à 6 —
crispum Lodd. . . . .	Guatemala 3 à 15 —
" b. grandiflorum . . . . .	Brasilien 4 à 10 —
" c. marginatum . . . . .	4 à 10 —
deltodeum Lindl. . . . .	5 à 7 —
flexuosum Sims. . . . .	Peru 1 à 4 —
" b. citrinum . . . . .	Brasilien 2 à 5 —
Ghiesbreghtii Roelz. . . . .	3 —
incurvum Bark. . . . .	Mexico 5 à 12 —
Lanceanum Lindl. . . . .	Oaxacca 5 à 8 —
" b. elegans . . . . .	Surinam 7 —
longipes Lindl. (O. oxyacanthosmum Lem.) . . . . .	10 —
microchilum Batem . . . . .	Brasilien 4 —
ornithorrhynchum H. B. K. . . . .	Guatemala 1 —
Papilio Lindl. b. majus . . . . .	Mexico 5 —
Pardothyrsus Rchb. fil. . . . .	6 à 8 —
phymatochilum Lindl. . . . .	Neu-Granada 4 —
roseum striatum Hort. . . . .	Brasilien 5 à 7 —
sphacelatum Lindl. . . . .	Honduras 3 à 6 —
trigrinum Lexarz (O. Barkerii Lindl.) . . . . .	Mexico 1 1/2 à 3 —
uniflorum Lindl. robustum . . . . .	Mexico 4 —
Wentworthianum Batem. . . . .	Brasilien 5 à 10 —
	Guatemala 5 —

**Ornithidium densum** Rchb. fil. (Maxillaria densa Lindl.)

coccineum Salisb. . . . . Westindien 3 à 6 —

**Peristeria elata** Hook. . . . . Panama 2 —

longicarpa Hort. Petr. . . . . 3 —

**Phajus cupreus** Rchb. fil. (Ph. Augustini) . . . . . 4 —

grandifolius Lour. . . . . Hongkong 4 à 7 —

grandifolius. β. giganteus Hort. . . . . 10 —

maculatus L. . . . . Nepal 5 à 8 —

" b. Woodfordii (Bletia Woodfordii) . . . . . Nepal 6 —

Wallichii Lindl. . . . . Sylhet 4 à 10 —

**Phalaenopsis amabilis** Bl. (Ph. grandiflora Lindl.) . . . . . Java 20 à 50 —

Aphrodite Rchb. fil. (Ph. amabilis Lindl.) . . . . . 30 à 50 —

equestris Rchb. fil. (Ph. rosea Lindl.) . . . . . Manila 40 —

	Thir.Gr.
<b>Phalaenopsis Parishii</b> . . . . .	65 —
<i>Schilleriana Rchb. fil.</i> (In 2 Varietäten) . . . . .	Manilla 30 à 60 —
<b>Pholidota imbricata Lindl.</b> . . . . .	Ostindien 1 à 4 —
<b>Physurus</b> , vide pag. 155.	
<b>Pleione maculata Lindl.</b> (Coelogyne maculata Lindl.) . . . . .	Assam Khaysia — —
<b>Pleurothallis pulchella Lindl.</b> (racemiflora) . . . . .	Columbien 15 Gr. à 1 15
<b>Pogonia</b> , vide pag. 155.	
<b>Preptanthe cuprea. (Hort. angl.)</b> . . . . .	10 —
<i>hybrida Veitchii (Exeter)</i> . . . . .	25 —
<i>vestita Rchb. fil. a. candida (Calanthe vestita Wall., Calanthe nivalis Hort. Angl.)</i> . . . . .	Java 5 à 10 —
<i>vestita b. luteo-oculata Rchb. fil.</i> . . . . .	Java 3 à 5 —
" <i>c. purpurea-oculata</i> . . . . .	Java 4 à 6 —
" <i>d. rubro-oculata Rchb. fil.</i> . . . . .	Java 3 à 5 —
<b>Promenaea stapelioides Lindl.</b> . . . . .	Brasilien 1 à 2 —
<b>Renanthera coccinea Lour.</b> . . . . .	Cochinchina 2 à 8 —
<b>Rhynchostylis Blume</b> , vide Saccolabium.	
<b>Rodriguezia bahiensis Rchb. fil.</b> . . . . .	Bahia 1 15
<i>decora Rchb. fil. (Burlingtonia decora Lem.)</i> . . . . .	Brasilien 3 à 5 —
<i>recurva Lindl. (Gomezia recurva Lodd.)</i> . . . . .	Brasilien 1 à 4 —
<i>secunda H. B. K.</i> . . . . .	Stid-Amerika 1 10
<b>Saccolabium ampullaceum Lindl.</b> . . . . .	Sylhet 40 —
<i>Blumei Lindl.</i> , vide Sacc. praemorsum.	
<i>Blumei Lindl. var. majus (Rhynchostylis retusa d. major Rchb. fil.)</i> . . . . .	30 à 40 —
<i>curvifolium L.</i> . . . . .	Nepaul. Ceylon 20 à 25 —
<i>Dayanum Hook.</i> . . . . .	Borneo 35 à 40 —
<i>guttatum Lindl. (Rhynchostylis guttata Rchb. fil.)</i> . . . . .	Java 15 à 25 —
<i>Harrissonianum Hort. Angl.</i> . . . . .	Borneo 15 à 20 —
<i>praemorsum Bl. (Rhynchostylis retusa b. praemorsa Rchb. fil. Saccolabium Blumei Lindl.)</i> . . . . .	Malabar. Java 12 à 35 —
<i>Reedii Hort.</i> . . . . .	Borneo 35 —
<i>retusum Hort. (Rhynchostylis retusa Rchb. fil.)</i> . . . . .	Malabar. Java 12 à 30 —
<i>violaceum Rchb. fil. Rhynchostylis violacea Rchb. fil.)</i> . . . . .	Manilla 30 à 50 —
<b>Sarcanthus rostratus Lindl.</b> . . . . .	Hongkong 3 —
<b>Schomburgkia crispa Lindl.</b> . . . . .	Guyana 5 à 6 —
<i>rosea Lindl.</i> . . . . .	Merida 5 —
<i>undulata Lindl.</i> . . . . .	Caracas 3 —
<b>Selenipedium caudatum Rchb. fil. (Cypriped. caudat. Lindl.)</b> . . . . .	Panama 20 à 28 —
<i>caudatum roseum Rchb. fil.</i> . . . . .	Panama 20 à 30 —
<i>Pearcei Rchb. fil. (Cypriped. caricinum)</i> . . . . .	Peru 20 à 40 —
<b>Sobralia Liliastrum Lindl.</b> . . . . .	Guyana 6 à 8 —
<i>macrantha Lindl.</i> . . . . .	Guatemala 3 à 6 —
<b>Sophranitis cernua Lindl.</b> . . . . .	Brasilien 2 à 4 —
<i>grandiflora Lindl.</i> . . . . .	Organos 7 à 10 —
<b>Stanhopea aurantiaca Hort.</b> . . . . .	4 à 10 —
<i>Bucephalus Lindl.</i> . . . . .	Quito 4 à 10 —
<i>Cavendishii Lindl.</i> . . . . .	Peru 2 à 6 —
<i>cirrhatta</i> . . . . .	4 à 10 —
<i>Devoniensis Lindl.</i> . . . . .	Mexico 3 à 6 —
<i>eburnea Lindl. (St. grandiflora Lindl.)</i> . . . . .	Brasilien 5 à 8 —
<i>ecornuta Lemaire.</i> . . . . .	Guatemala 3 —
<i>Fregeana Rchb. fil.</i> . . . . .	Caracas 3 à 10 —
<i>grandiflora Lindl.</i> , vide <i>St. eburnea Lindl.</i>	
<i>graveolens Lindl.</i> . . . . .	Guatemala 2 à 4 —
" <i>var. major Hort.</i> . . . . .	4 à 7 —
<i>guttata Lindl.</i> . . . . .	Brasilien 3 à 6 —
<i>Jenischiana Kramer</i> . . . . .	Panama 3 à 7 —
<i>inodora Lodd. b. punctata</i> . . . . .	Mexico 3 à 7 —
<i>insignis Hook.</i> . . . . .	Quito 2 à 8 —
" <i>b. maculata</i> . . . . .	10 —
" <i>c. speciosa</i> . . . . .	8 —
<i>Martiana Lindl.</i> . . . . .	Mexico 3 à 5 —
<i>oculata Lindl.</i> . . . . .	Mexico 1 à 5 —
" <i>b. crocea</i> . . . . .	5 à 8 —
" <i>c. Lindleyana</i> . . . . .	2 à 6 —
" <i>d. variegata</i> . . . . .	8 —
<i>odoratissima Lindl.</i> . . . . .	Brasilien 3 —
<i>Rueckerii Lindl.</i> . . . . .	Mexico 2 à 5 —
<i>saccata Batem.</i> . . . . .	Guatemala 3 à 5 —
<i>species de Guatemala</i> . . . . .	8 —
<i>tigrina Batem.</i> . . . . .	Xalapa 2 —
" <i>b. major (St. superba Hort.)</i> . . . . .	Xalapa 3 à 10 —
" <i>c. nigro-purpurea</i> . . . . .	Xalapa 4 à 10 —
<i>venusta Hort.</i> . . . . .	Guatemala 3 à 5 —
<i>Wardii Lodd.</i> . . . . .	Guatemala 1½ à 7 —
" <i>b. aurea (St. aurea Lodd.)</i> . . . . .	La Guyana 4 à 6 —

Bei der Lieferung der Stanhopeen ist zu berücksichtigen, dass zu den angegebenen Preisen Pflanzen von 4—10 Bulben verstanden sind.

	Thlr.Gr.
<i>Stelis macrocarpa</i> H. B.	20 Gr. à 2 —
<i>mierantha</i> Sw.	Peru, Jamaïca 20 Gr. à 3 —
<i>Thecostele Zollingeri</i> Batem.	12 —
<i>Trichocentron albo-coccineum</i>	5 à 8 —
<i>Trichopilia coccinea</i> Warsc.	Costa Rica 7 —
<i>laxa</i> Rehb. <i>fil.</i> ( <i>Pilumna Lindl.</i> )	3 —
<i>suavis</i> Lindl.	Costa Rica 15 —
<i>tortilis</i> Lindl.	Mexico 2 —
β <i>pallida</i>	Mexico 3 —
<i>Trigonidium ringens</i> Lindl.	Mexico 15 Gr. à 1 15
<i>Thunia alba</i> Rehb. <i>fil.</i>	Ostindien 3 —
<i>Uropedium Lindenii</i> Lindl.	Guatemala 20 à 25 —
<i>Vanda Batemanii</i> Lindl. ( <i>V. lissochiloides</i> L.)	Molukken 50 à 70 —
<i>Cathcartii</i> Lindl.	Sikkim — —
<i>coerulea</i> Griff.	Khasya 30 —
<i>congesta</i>	5 à 10 —
<i>furva</i> Lindl.	Birma — —
<i>gigantea</i> Lindl.	Moulmein 25 à 50 —
<i>insignis</i> Blume	Timor 25 à 30 —
<i>Lowii</i> Lindl. ( <i>Renanthera Lowii</i> Rehb. <i>fil.</i> )	Borneo — —
<i>Roxburghii</i> R. Br.	Bengalen 30 —
<i>suavis</i> Lindl. ( <i>de Veitch.</i> )	Java 30 à 40 —
" var. <i>Hrubiana</i>	— —
" var. <i>major</i>	— —
<i>teres</i> Lindl.	Sylhet 4 à 15 —
<i>tricolor</i> Rehb. <i>fil.</i>	Java 15 à 40 —
<i>Vanilla aromatica</i> Sw.	Südamerika 2 —
<i>Warrea tricolor</i> Lindl.	Brasilien 15 —
<i>Warszewiczella jonoleuron</i>	Brasilien 15 —
<i>Zygotepetalum album</i> Hort.	1 à 7 —
<i>crinitum</i> Lodd.	Brasilien 3 à 6 —
" Lodd. var. <i>coeruleum</i>	Brasilien 3 à 6 —
" " <i>rubellum</i>	— —
<i>intermedium</i> Lodd.	Brasilien 4 —
<i>Makoyi</i> Hook.	Brasilien 2 à 6 —
b. <i>macranthum</i>	Brasilien 4 à 10 —
c. <i>parviflorum</i>	4 —
d. <i>pictum</i>	5 —
e. <i>striatum</i>	Brasilien 2 à 6 —
f. <i>velutinum</i>	Brasilien 2 à 5 —
<i>maxillare</i> Lodd.	Brasilien 1 à 7 —
<i>stenochilon</i> Sw.	Brasilien 2 à 5 —

Hieran schliessen sich die

**ANECOCCHILUS**

und ähnliche Arten.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Anecochilus</i> Bl. <i>argyroneurus</i>	7 —	<i>Haemaria Veitchii</i> (Goodyera Veitchii), vide pag. 9.	
<i>Friderici Augusti</i> Rehb. <i>fil.</i> ( <i>A. xantho-</i> <i>phyllum</i> und <i>Lobbianus</i> Hort.)	4 —	<i>Macodes marmorata</i> Rehb. <i>fil.</i> ( <i>Aneco-</i> <i>chilus Lowii</i> Hort. <i>Dossinia marmor.</i> )	
<i>intermedius</i> Hort.	3 —	Java	7 —
<i>magnificus</i> , vide pag. 7.		<i>petola</i> Lindl.	6 —
<i>Rueckeri</i>	7 —	" <i>vera</i> ( <i>Anecochilus imperialis</i> Hort.)	7 —
<i>setaceus</i> Bl.	5 —	<i>Nephelaphyllum cordatum</i>	— —
β <i>aureus</i>	5 —	<i>pulehrum</i> Blume	2 à 4 —
<i>species nova</i> de Java	5 —	<i>Physurus argenteus</i> ( <i>Anecochilus</i> argen- <i>teus</i> Lindl.)	Ceylon 1 —
<i>spectabilis</i> , vide pag. 7.		<i>nobilis</i> Rehb. <i>fil.</i> , vide pag. 10.	
<i>striatus</i> ( <i>vittatus</i> )	3 —	<i>pictus</i>	Brasilien 1 15
<i>Veitchii</i> Hort.	10 —	<i>querceticola</i> L. (12 Stück 6 Thlr.)	— 20
<i>Cystorchis variegata</i> Miq.	2 15	<i>Pogonia concolor</i>	— —
<i>Etaeria javanica</i> Blume	6 —	<i>discolor</i>	8 —
<i>Haemaria discolor</i> Lindl. ( <i>Goodyera</i> dis- <i>color</i> )	Südamerika 1 —		
<i>pubescens</i>	1 15		



# PALMAE,

## CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem \* bezeichneten können in einem temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr. Gr.
<b>Areca</b> <i>alba</i> <i>Bory.</i> 5 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . .	6 —
<i>aurea</i> 1 Fuss hoch . . . . .	2 —
<i>Baueri</i> (= <i>Seaforthia robusta</i> ) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	5 —
<i>Catechu</i> <i>L.</i> 4 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . .	Ostindien 5 —
<i>crinita</i> <i>Mart.</i> 1 Fuss hoch mit 6--8 Wedeln . . . . .	7 —
» <i>Stärker</i> . . . . .	12 —
<i>lutescens</i> <i>Bory.</i> vide <i>Hyophorbe indica</i> .	
* <i>Banksii</i> <i>A. Cunn.</i> ( <i>A. sapida</i> <i>Hort. Amster.</i> ) $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wed. . . . .	10 —
9 Zoll hoch mit 3 Wedeln . . . . .	Neu-Seeland 5 15
<i>monostachya</i> <i>Mart.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	5 —
<i>nobilis.</i> 9 Zoll hoch mit 6 Wedeln . . . . .	7 —
<i>rubra</i> <i>Bory.</i> 1—2 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . . . .	Mascarenen 3 à 5 —
3—4 » » » 5—6 » . . . . .	8 —
<i>speciosa</i> , vide <i>Hyophorbe amaricaulis</i> .	
<i>Verschaffeltii</i> <i>Hort. Versch.</i> , vide <i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> . . . . .	
<b>Arenga</b> <i>saccharifera</i> <i>La Bill.</i> ( <i>Saguerus Rumphii Roxb.</i> ) 3 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	Ostindien 12 —
<b>Astrocaryum</b> <i>Chichon</i> <i>Hort. Lind.</i> ( <i>Astr. niveum</i> <i>Hort. Maelen</i> ). Die untere Seite der Wedel ist weiss, 5 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	20 —
<i>aureo pictum</i> , vide <i>Phoenicophorium Sechellarum</i>	
<b>Bactris</b> <i>Maraja</i> <i>Mart.</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . .	10 —
<b>Brahea</b> <i>dulcis</i> <i>Mart.</i> 4 Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . .	Mexico 15 —
<b>Calamus</b> <i>micranthus</i> <i>Bl.</i> 2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln . . . . .	Mexico 5 —
3—4 » » » 5—6 » . . . . .	10 —
<i>niger</i> <i>Willd.</i> , 2jährig . . . . .	Java 2 —
<i>asperrimus</i> <i>Hort.</i> ( <i>Daemonorops melanochaetes</i> <i>Bl.</i> ) 2—3 Fuss hoch. . . . .	4 —
<b>Carludovica</b> <i>atrovirens</i> <i>H. Wendl.</i> 3—4 Fuss hoch mit 10—18 Wedeln . . . . .	3 à 6 —
<i>bipartita</i> <i>Hort.</i> 4—5 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	Mexico 4 —
6—7 » » » 8—10 » . . . . .	5 —
<i>Hookeri</i> $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	6 —
<i>incisa</i> <i>H. Wendl.</i> $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . .	6 —
<i>Libonii</i> <i>Hort. Jonghe.</i> $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—6 Wedeln. . . . .	Brasilien 5 —
<i>Moritziana</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 7 Wedeln . . . . .	8 —
<i>palmata</i> <i>Ruiz. et Pav.</i> 2—3 Fuss hoch mit 4—5 Wed. Westindien 1 à . . . . .	2 —
5—6 » » » 5—6 Wedeln . . . . .	10 —
<i>plicata</i> <i>H. Berol.</i> $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	6 —
<b>Caryota</b> <i>furfuracea</i> <i>L.</i> 3jährig. 9—15 Zoll hoch. . . . .	Java 1 15
<i>species de Bengalen.</i> 3jährig 9—12 » » . . . . .	4 —
<i>urens</i> <i>L.</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . .	Ostindien 4 —
6—9 » » » 4—6 » . . . . .	20 —
<b>Ceratozamia</b> <i>longifolia</i> <i>Miq.</i> 8 Zoll hoch, 6 Zoll Durchm., mit 5 Wedeln. . . . .	Mexico 8 —
<i>mexicana</i> <i>Brogn.</i> 3—5 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser mit 5—8 Wedeln . . . . .	6 à 8 —
13 Zoll hoch 8 Zoll Durchmesser mit 9 Wedeln . . . . .	15 —
<b>Ceroxylon</b> <i>andicola</i> <i>H. B.</i> Die echte Wachspalme, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . .	5 —
2 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	30 —

<b>Chamaedorea Casperiana Kl.</b> (Ch. concolor. Ch. Lindeniana.) 6—7			
Fuss hoch mit 6—7 Wedeln	Guatemala	5 à	6 —
<b>Desmoncoides H. Wendl.</b> (Ch. elatior. Hort., Ch. scandens.) 8 Fuss			
hoch mit 7 Wedeln	Mexico		7 —
<b>elegans Mart.</b> 5 Fuss hohe Pflanzen mit 8 Wedeln	Mexico		6 —
<b>Ernesti Augusti H. Wendl.</b> $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 9 Wedeln	Guatemala		10 —
<b>geonomaeformis H. Wendl.</b> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 9 Wedeln			15 —
8 " " " 6—7 "			20 —
<b>lunata Liebm.</b> 6 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln	Mexico		4 —
7—8 " " " 6—9 "			10 —
<b>resinifera H. Wendl.</b> 7 Fuss hoch mit 6 Wedeln	Mexico		10 —
<b>Sartorii Liebm.</b> 6 Fuss hoch mit 4 und 5 Wedeln	Mexico		8 —
<b>Verschaffeltiana.</b> 3—4 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln			10 —
* <b>Chamaerops excelsa Thunb.</b> 4 Fuss hoch mit 14 Wedeln	Japan		50 —
* <b>Fortunei Hook.</b> (Ch. chinensis Hort.) Chusan-Palm.			
2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 8—10 Wedeln	China		20 —
4 " " " 10—15 "			40 —
$\frac{3}{4}$ —1 " " " 4—5 "			1 25
* <b>humilis L.</b> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—8 Wedeln	Afrika		5 —
$2\frac{1}{2}$ " " " 9—18 "			18 —
3 " " " 14—18 "			25 —
4 " " " 18—20 "			40 —
Ganz harte Palmen, welche sich besonders während des Sommers zur Aufstellung im Freien eignen.			
* <b>Mocini H. B.</b> (Sabal Mocini O. et D.). 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—7 Wed.	Süd-Amerika		2 —
2 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln			4 —
Palmetto, vide Sabal Palmetto.			
<b>Cocos comosa Hort. Jonghe.</b> (Syagrus plumosa Hort. Herrenh.)			
8 Fuss hoch mit 4 Wedeln	Brasilien		20 —
10—12 " " " 4—5 "			40 —
<b>Copernicia Miraguama Mart.</b> (C. cerifera H. Amst.) 6—7 Zoll hoch	Cuba.		15 —
<b>Corypha australis</b> , vide <i>Livistonia australis</i> .			
<b>Cycas circinalis L.</b> . . . . . Ostindien.			
12—15 Fuss Höhe und 6—7 Zoll Durchm. mit 11 Wedeln			80 —
5—6 " " " 4—5 " " mit 8 Wedeln			50 —
4 " " " 3 " " " 4 " "			25 —
1—3 " " " gleichem " " 2—4 " "			10 à 15 —
var. <i>Rumphii</i> . H. ins. pav. Postd. Selten! Nicobar.			
Archipel. Stammhöhe $2\frac{1}{4}$ Fuss, Durchmesser 12 Zoll.			
Mit vielen Wedeln . . . . . 200 —			
var. <i>Rumphii</i> ? Stammhöhe 8 Zoll, Durchmesser 4 Zoll . 20 —			
$1\frac{1}{2}$ Zoll " und gleichem " . . . . . 6 —			
<b>inermis Lour.</b> $\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe u. gleichem Durchm., mit 15 Wed.	Cochinchina.		25 —
<b>revoluta Thunb.</b> Exemplare von			
2 Fuss Stammhöhe und 9—10 Zoll Durchmesser.			
$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ " " " 7—8 " "			
$1\frac{1}{4}$ " " " 6—7 " "			
1 " " " 7 " "			
$\frac{3}{4}$ —1 " " " 3—6 " "			
$\frac{3}{4}$ " " " 5—6 " "			
$\frac{1}{2}$ " " " 3—5 " "			
Alle Exemplare sind gesund und angemessen mit grünen Wedeln versehen.			
Preisangaben auf gefällige Anfragen.			
<b>Cycas revoluta</b> , junge Pflanzen von 1—2 Zoll Stammhöhe und gleichem			
Durchmesser mit 2—5 Wedeln . . . . .	2 à	3 —	

	Thlr. Gr.
<b>Cycas Ruminiana</b> 3—6 Zoll Stammhöhe mit 5—7 Wedeln . . . . .	6 à 12 —
siamensis 1 Zoll Stammhöhe und Durchmesser . . . . .	— —
<b>Diplothemium maritimum Mart.</b> 2 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln.	
Brasilien.	6 —
2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . .	7 —
<b>Dioon edule Lindl.</b> ( <i>Zamia Friderici-Guilielmi Hort. Parment.</i> ) Junge	
Pflanzen von 3 Zoll Stammhöhe . . . . .	Mexico 4 à 6 —
$\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe $\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser 20 à 25	
1—1 $\frac{1}{2}$ » » 8 » » . . . . .	30 —
1 $\frac{3}{4}$ » » 11 » » . . . . .	50 —
<b>Encephalartos Caffer Lehm.</b> 1 Fuss Stammhöhe, 10 Zoll Dchm. Cap. 150 —	
horridus Lehm. Junge Pflanzen von 2 Zoll Stammhöhe . . . . .	6 à 8 —
$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe und gleichem Durchmesser . . . . .	30 à 40 —
Die vorstehenden Cycadeen sind mit schönen Wedeln versehen, von denen die von <i>Dioon edule</i> die Wedel von <i>Cycas revoluta</i> an Ebenmass noch übertreffen.	
<b>Elaeis guianensis Jacq.</b> Die Oelpalme. 5 Fuss hoch mit 5 Wed. West-Afrika	20 —
6—7 Zoll hoch . . . . .	2 —
<b>Euterpe edulis Mart.</b> 1 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . .	Pernambuco 2 —
9 » » » 8 » . . . . .	30 —
<b>Gaussia portoricensis, Neu!</b> $\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . .	3 —
<b>Hyophorbe amaricaulis</b> (= <i>Areca speciosa</i> ) mit rothen Blattrippen	
3—4 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln . . . . .	7 —
1—2 » » » 3—4 » . . . . .	4 —
indica Gaertn. ( <i>Areca lutescens Bory.</i> ) Insel Bourbon	
3 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	8 —
5 » » » 6 » . . . . .	15 —
9—10 » » » 5 » . . . . .	30 —
Verschaffelti. (= <i>Areca Verschaffeltii hort. Versch.</i> ) mit	
gelben Blattrippen, 6 Fuss hohe schöne Pflanzen mit 5 Wedeln.	50 —
1—1 $\frac{1}{4}$ » » » » » 3 » . . . . .	
<b>Katakidozamia Macleyi Hort.</b> . . . . .	40 —
<b>Latania borbonica</b> , vide <i>Livistonia chinensis</i> .	
Commersonii Mart. ( <i>L. rubra Hort.</i> ) 2 Fuss hoch . . . . .	15 —
glaucophylla. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 3—6 Wedeln . . . . .	12 —
rubra vera Jacq. 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln . . . . .	Mascarenen 18 —
Verschaffeltii Hort. ( <i>L. aurea</i> .) 2 $\frac{1}{2}$ —3 F. hoch mit 6—8 Wedeln. 20 à 25	
1 $\frac{1}{2}$ » » » 6—7 » . . . . .	12 —
<b>Licuala spinosa Wurm.</b> Junge Pflanzen 6—10 Zoll hoch. Ostindien	2 15
<b>Livistonia australis R. Br.</b> ( <i>Corypha australis R. Br.</i> ) $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	
mit 2—3 Wedeln . . . . .	Neu Holland 3 —
2—3 Fuss hoch mit 8—9 Wedeln . . . . .	8 —
chinensis Mart. ( <i>Latania borbonica Bam.</i> ) 2jährige Samen-Pflanzen	— 10
1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . . . .	20 Gr. à 2 —
9 » » » 6 » . . . . .	40 —
Jenkinsii Griff. 3 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	Assam 10 —
2 » » » 5—6 » . . . . .	8 —
1 » » » 3 » . . . . .	2 15
rotundifolia Mart., kräftige 4jährige Pflanzen mit 4—6 Wedeln . . . . .	5 —
Zollingeriana, vide <i>Saribus Zollingerii</i> .	
* <b>Macrozamia spiralis Miq.</b> Vorjährige Samenpflanzen . . . . .	N. Holl. 4 —
<b>Maximiliana regia Mart.</b> 1 $\frac{1}{2}$ F. hoch mit 3—5 Wed. Guiana. Brasilien	5 —
2 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . .	8 —
<b>Metroxylon Roxb.</b> elatum. 1 Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . .	Ostindien 6 —
<b>Oenocarpus caracasanus Lodd.</b> ( <i>Oenocarp. Battana Hort.</i> ) 2 Fuss hoch	
mit 3 Wedeln . . . . .	Caracas. Guyana 10 —



<i>Oenocarpus minor</i> .	1 Fuss hoch, mit 5—6 Wedeln	4 —
<i>Oreodoxa regia Kth.</i>	$\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch mit 3 Wedeln	Antillen 2 15
<i>Pandanus Bagea Miq.</i>	$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Molukken 15 —
	4 " "	30 —
<i>Candelabrum Beauv.</i>	5 Fuss hoch	West-Africa 4 —
<i>elegantissimum Hort.</i>	3 " "	10 —
	$2\frac{1}{2}$ " "	8 —
	1— $1\frac{1}{2}$ " "	6 —
<i>furcatus Roxb.</i>	7 Fuss hoch, mit 18—20 Blättern	12 —
	10 " " 25 "	20 —
<i>gramineus Hort. Herrenh.</i>	( <i>Freycinetia graminea. H. Amst.</i> )	— 20
<i>javanicus fol. var.</i>		Java $1\frac{1}{2}$ à 3 —
<i>latissimus Bl.</i>		Java —
<i>ornatus.</i>	$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	6 —
	1 " "	4 —
<i>pygmaeus P. et Th.</i>	( <i>Freycinetia graminifolia Hort.</i> )	Mascarenen — 10
<i>reflexus.</i>	2 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser	Mauritius 20 —
	$\frac{3}{4}$ " " 1 " "	8 —
<i>utilis Bory.</i>	$1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch	Mascarenen 2 15
<i>Vandermerschii.</i>	1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	6 —
<i>Phoenicophorium Sechellarum H. Wendl.</i>	( <i>Astrocaryum aureo-pictum Hort.</i> )	$3\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln 50 —
	$2\frac{1}{2}$ " " 5 "	30 —
	$1\frac{3}{4}$ " " 4 "	20 —
	1 " " 4 "	10 —
<i>Phoenix dactylifera L.</i>	Zweijährige Pflanzen	Nördl. Africa — 12
	1—2 Fuss hoch mit 5—7 Wedeln	3 —
<i>Leonensis Lodd.</i>		Sierra Leone 3 —
<i>pumila</i>		Ober-Guinea 3 —
<i>Phytelephas macrocarpa R. et P.</i>	nach Kunth die einzige Pandanee des neuen Continents.	4 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . Süd-America 8 à 12 —
<i>Pinanga maculata.</i>	5 Fuss hoch, gesunde und gut cultivirte Pflanzen mit 5 Wedeln	Java 50 —
<i>Pritchardia pacifica H. Wendl.</i>	$1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6—7 Wedeln	6 —
<i>Ptychosperma gracilis.</i>	3jährig	Java 6 —
<i>Rhapis flabelliformis fol. albo var. Neu!</i>		20 à 80 —
* <i>Sabal Adansonii Guerns.</i>	( <i>S. pumila Pers.</i> )	2 F. hoch mit 8—9 Wed. Carolina 6 à 8 —
	Zweijährige Samenpflanzen	1 —
<i>Blackbourneana.</i>	$\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	Westindien 2 —
* <i>Palmetto Lodd.</i>	( <i>Chamaerops Palmetto Hort.</i> , <i>Sabal Adansonii major Hort.</i> )	$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6—10 Wedeln . . . Florida 5 —
<i>Sagrus Ruffia Jacq.</i>	( <i>Metroxylon Ruffia Spr.</i> , <i>Raphia Ruffia Hort. Amstel.</i> )	2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch 3 —
	4 " "	4 —
<i>Saribus Zollingerii Hort. Lugd. Bat.</i>	( <i>Livistonia Zollingerii.</i> )	3 Fuss hoch mit 9 Wedeln . . . Java 25 —
	4 " " 6 "	40 —
* <i>Seaforthia elegans R. Br.</i>	8 Fuss hoch mit 4 Wedeln	Neu-Holland 20 —
	12 " " 4 "	30 —
	2 " " 4 "	5 —
	4—6 Zoll hoch	2 15
<i>Stangeria paradoxa</i>		30 —
<i>Synectanthus fibrosus.</i>	$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln	8 —
<i>Thrinax elegans. Hort. Berol.</i>	5 Fuss hoch mit 8 Wedeln	10 —
<i>ferruginea Lodd.</i>	4—5 Fuss hoch mit 7—9 Wedeln	Jamaica 15 à 20 —
<i>Trithrinax mauritiaeformis. Hort.</i>	8 Zoll hoch	Venezuela 2 15

**Verschaffeltia splendida** *Wendl.*, vide pag. 10.

3  $\frac{1}{2}$  Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . . 25 —  
2  $\frac{1}{2}$  „ „ „ 4 „ . . . . . 20 —

**Wallichia spectabilis** *Dne.* 1  $\frac{1}{2}$  — 2 Fuss hoch mit 3—4 Wed. Ostindien 15 —  
tremula. 4 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . . 20 —

**Zalacca Wagneri.** 1 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . . 8 —

**Zamia angustifolia** *Jacq.* 3 Zoll Stammhöhe mit 5 Wedeln . . . . . Cuba 12 —

furfuracea *Ait.* 1  $\frac{1}{2}$  Zoll Stammhöhe mit 4 Wedeln . . . . . 5 —

**Loddigesii** *Miq.* 4 Zoll bis  $\frac{1}{2}$  Fuss hoch und 3 Zoll im Durchmesser, mit 3 Wedeln . . . . . Mexico 6 à 10 —

muricata *Willd.* 1—3 Zoll Stammhöhe mit 4—9 Wedeln. Venezuela 2 à 5 —

**Skinnerii** *Wrwz.* 1 Fuss Stammhöhe u. 3—4 Z. Durchmesser m. 4 Wed. . 20 —

species. 1 Zoll hoch und 1 Zoll im Durchmesser . . . . . — —

## SCITAMINEAE ET MUSAE.

Thlr.Gr.

**Calathea Lindeniana** } vide Neu-

» *splendida* } heiten

» *Veitchiana* } pag. 2.

**Canna**, indica et var., v. pag. 70.

**Elettaria** *Diepenhorstii.* Neu. . 1 10

**Heliconia aurantiaca** . . . . . — 20

discolor *H.* (*Phryn. varians*) . . . . . — 10

pulverulenta *Lindl.* . . . . . — 10

sanguinolenta . . . . . — 15

**Maranta albo-lineata** *Hort.* . . . . 1 —

argyrea . . . . . 1 15

bicolor *Lindl.* . . . . . — 10

coccinea floribunda . . . . . — 10

glumacea *Hort.* . . . . . — 20

**Groenewegensis** *Hort. Groe-*

*neweg.* (*Stromanthe?*) . . . . . — 20

**Jagoreana** . . . . . — 20

orbifolia *Linden.* . . . . . 2 —

ornata *Veitch.* . . . . . 1 —

» var. *picta van H.* . . . . . 2 —

pardina . . . . . — 15

picturata . . . . . 1 —

regalis *Hort.* . . . . . 1 15

rosea-lineata *Hort.*, wird häufig

weiss . . . . . 1 10

rosea-picta, vide pag. 4.

species nova, mit blutrothen

Flecken. . . . . — 20

striata, vide pag. 9 . . . . . 3 —

vittata (= *Phrynium vittatum*) 1 —

Thlr.Gr.

**Musa chinensis** *Sweet.* (*Caven-*

*dishii Paxt.*) . . . . . 6 —

coccinea *Andr.* . . . . . 2 à 6 —

**Dacca** *Hort.* . . . . . 5 à 1 15

**Ensete** *Bruce.* . . . . . 15 —

rosacea *Jacq.* . . . . . 4 —

speciosa *Ten.* . . . . . 1 —

textilis *Nees* . . . . . 3 —

**Troglodytarum** *L.* Molukken . 3 —

zebrina . . . . . 2 —

**Pharus vittatus** *Hort.* . . . . 2 à 4 —

**Phrynium fasciatum** *C. Koch.*

(*Maranta fasciata*) . . . . . 1 10

flavescens *Sm.* (*Calathea fla-*

*vescens*) . . . . . — 20

majesticum, vide pag. 10 . . . . . 2 15

micans *Klotzsch.* . . . . . — 10

**Porteanum** *C. Koch* (*Mar. Por-*

*teana*) . . . . . 1 15

**Riedelianum** . . . . . 1 —

variens *C. Koch.*, vide *Helicoma*

discolor *Hort.*

**Warscewiczii** *Klotzsch.* (*Mar.*

*Warscewiczii*) . . . 15 Gr. à 1 —

zebrinum *Rosc.* (*Mar. zebrina*) — 12

**Strelitzia alba** . . . . . 2 à 3 —

*Reginae* *Ait.* . . . . . 5 —

**Thalia gigantea** *Tourrés* . . . . . 1 —

**Urania amazonica** *Hort.* . . 2 à 6 —

madagascariensis . . . . . 2 —

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl:  
12 Species für 5 Thlr., und für 8 Thlr., je nach dem Werthe oder der  
Neuheit der Arten.

*Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces):*

12 espèces pour 5 Thaler et pour 8 Thaler.

## N a c h t r a g.

- Cyrtandra bicolor Jacq.** Eine Pflanze, welche der blendenden Schönheit ihrer Blätter halber mit den *Anecoehilus* rivalisirt. Die eigrossen und eiförmigen, bräunlich dunkelgrünen, wie mit Sammt belegten Blätter haben einen wundervollen röthlich bronzearartigen Glanz und Schimmer, der sie vor allen buntblättrigen Pflanzen auszeichnet. Diese herrliche, aus Sumatra stammende Species erhielt bei der internationalen Ausstellung zu Amsterdam den ersten Preis (eine goldene Medaille) als „schönste, neueingeführte, nichtblühende Pflanze“ . . . 5 Thlr.
- Ulmus campestris var. aurea (Rosseels).** Diese schöne Varietät, von welcher ein Zweig im letzten Decemberhefte der Zeitschrift: „*La Belgique horticole*“, abgebildet ist, wurde von dem vortheilhaft bekannten belgischen Landschaftsgärtner, Herrn *Rosseels*, aus Samen gewonnen. Die Blätter sind schön goldgelb, oft wie bronzirt. „Je mehr der Baum der Sonne ausgesetzt ist“, schreibt Hr. *Rosseels*, „desto schöner wird das Colorit der Blätter, welche niemals durch die Sonnenstrahlen leiden und deren schöne Färbung constant ist.“
- Junge Veredelungen . . . . . 1 Thlr. 10 Gr.

### AZALEA INDICA

in starken Pflanzen. — Die Freunde dieser herrlichen Florblumengattung machen wir darauf aufmerksam, dass wir davon eine ansehnliche Partie älterer Sorten in sehr starken Exemplaren von  $1\frac{1}{2}$ —3 Fuss und mehr Kronendurchmesser, und mit Blüthenknospen überdeckt, vorrätbig haben. Wir liefern hiervon, je nach ihrer Stärke,

*das Stück von 1 Thlr. 10 Gr. bis zu 5 Thlr.;*  
*12 Stück verschiedener Sorten für 12, 18, 24 und 36 Thlr.*

### AQUARIEN

mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien besetzt; elegante und interessante Decoration für Zimmer und Salons. Je nach der Grösse der starken Glaskästen und dem Werthe der Pflanzen und Thiere

*à Stück 3, 5, 7 und 10 Louisd'or.*

Ferner

### TERRARIEN

in eleganten Glaskästen, worin auf kleinen Felspartieen von Tuffsteinen allerhand zierliche Gewächse gepflanzt sind. Je nach der Grösse der Kästen und dem Werthe der Pflanzen

*à Stück 10, 15, 20 und 30 Thlr.*

**Fuchsien** in Hochstämmen von 2—6 Fuss Höhe . . . à 20 Gr. bis 3 Thlr.  
**Fuchsien** in Ampeln, von verschiedener Grösse. (Vom 1. Juli an abzugeben.)

1 à 3 Thlr.

Es sind zu beiden Formen die schönsten und passendsten Sorten ausgewählt, wie sie unser reiches Sortiment darbietet.

## Partie-Preise für Handelsgärtner.

Prix pour Marchands. — Prices for the Trade.

4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

Thlr.Gr.

12	<i>Abutilon vexillarium</i> . . . . .	2	—
25	„ „ . . . . .	4	—
12	<i>Achimenes</i> , in 12 Sorten . . . . .	1	10





12	Caladium	Wightii	3	15
25	"	"	6	10
12	"	in 12 Sorten nach unserer Wahl	3	15
12	Calamus	asperimus, 2—3 Fuss hoch	30	—
12	Camellia	japonica, in 12 Sorten, 1½—2 F. hohe Pflanzen für 4 und	2	—
24	"	" 24 " " " " " 9 " "	4	15
50	"	" 50 " " " " " 20 " "	10	—
100	"	" 40-50 " " " " " 45 " "	22	—
12	Campanula	pyramidalis	2	—
12	Canna	discolor	1	20
12	"	nigricans	3	15
24	"	"	6	10
6	"	purpurea hybrida	1	20
12	"	"	3	10
6	"	rubicaule	1	10
6	"	van Houttei	1	10
12	"	"	2	20
6	"	in 6 Sorten mit grünen Blättern, nach unserer Wahl	1	15
12	"	" 12 " " " " " " "	4	—
6	"	" 6 " " dunklen Blättern " " "	1	15
12	"	" 12 " " " " " " "	4	—
24	"	" 24 " nach unserer Wahl	9	—
6	Caryota	furfuracea	8	—
12	Chamaerops	Fortunei, ¾—1 Fuss hoch	18	—
6	"	Mocini	10	—
12	Chrysanthemum	indicum, grossblumige u. Pompon in 12 Sorten	1	—
25	"	" " " " " " 25 " "	2	—
60	"	" " " " " " 40-50 " "	4	—
12	"	" Louise Honoraty (Huber)	1	25
25	"	" " " "	3	10
6	Cinchona	succi-rubra	4	—
12	Cineraria	maritima	1	20
6	Cissus	discolor	1	—
6	Clematis	azurea grandiflora	1	10
6	"	Louise	1	—
12	"	Standishii	5	—
6	Clerodendron	Thompsonianum	1	20
12	Crassula	coccinea, in 12 der schönsten Sorten	1	20
6	Coffea	arabica, 1 Fuss hoch	4	—
12	Coleus	Verschaffelti	2	—
6	Colocasia	macrorrhizon fol. var.	2	15
6	Convolvulus	mauritanicus	—	20
6	Corypha	australis, 1 Fuss hoch	2	15
6	Costus	zebrinus	—	20
6	Crescentia	Cujete, 9 Zoll hoch	2	20
12	Curculigo	recurvata, 1½ Fuss hoch	2	20
6	Cyclamen	africanum (macrophyllum)	2	20
12	Cypripedium	Calceolus, stark	2	—
6	Dasyllirion	longifolium	8	—
6	Deeringia	Amherstiae fol. var.	—	25
6	Delphinium	Mad. Neuner	1	—
6	"	Monsieur Pfitzer	1	—
6	"	Richaleti	1	—
6	Desmodium	gyrans	2	—
6	Deutzia	crenata fl. pl.	1	—
6	"	" fl. extra purpurea pl.	2	15
6	Dibrachion	peltatum	6	—

		Thlr.Gr.
6	Dieffenbachia Seguine picta, 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	1 15
12	„ „ „ „ „ „ . . . . .	3 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	6 —
6	Diplacus, in 6 Sorten . . . . .	— 25
12	Dianthus caryophyllus, remontirend . . . . .	2 10
12	Dracaena Draco, 3jährig . . . . .	3 15
12	„ ferrea, 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . .	3 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	6 —
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	10 —
6	„ rigidifolia, 2 Fuss hoch . . . . .	1 20
12	„ rubra, 1 Fuss hoch . . . . .	2 —
12	„ terminalis rosea, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch . . . . .	4 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	8 —
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	15 —
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	28 —
6	Echites argyræa . . . . .	1 15
6	„ nutans . . . . .	1 5
12	„ „ „ „ „ „ . . . . .	2 10
6	Equisetum limosum . . . . .	— 15
12	Eranthemum Cooperi . . . . .	1 —
12	„ tuberculatum . . . . .	1 20
6	Erdbeeren Ananas perpetuel . . . . .	2 15
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	8 —
12	„ Baron de Quadt . . . . .	4 —
6	„ Carniola Magna . . . . .	2 —
12	„ Carolina superba . . . . .	— 24
12	„ Janus . . . . .	— 24
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 —
12	„ La Constante . . . . .	— 24
6	„ La Mauresque . . . . .	1 15
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 15
12	„ Louis Vilmorin . . . . .	2 12
12	„ Marquise de Latour-Maubourg . . . . .	— 10
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	1 5
12	„ Sir Harry . . . . .	— 24
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 —
12	„ Triomphe de Hollande . . . . .	— 24
12	Erythrina Bellangeri . . . . .	2 20
12	„ Crista Galli . . . . .	1 20
12	„ ruberrima . . . . .	2 20
12	Eucharis amazonica . . . . .	4 —
6	Evonymus, diverse ältere Sorten . . . . .	1 —
6	„ neueste Sorten . . . . .	2 15
6	Ficus Cooperii . . . . .	1 15
12	„ „ „ „ „ „ . . . . .	3 —
12	„ elastica, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch . . . . .	4 15
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	9 —
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	35 —
25	Filices (Farne) nach unserer Wahl . . . . .	4 und 8 —
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	9 „ 17 —
12	Fuchsien, in 12 Sorten, vorjährige Neuheiten . . . . .	3 —
24	„ „ 24 „ „ „ „ . . . . .	5 20
12	„ „ 12 „ frühere Jahrgänge . . . . .	1 —
25	„ „ 25 „ „ „ . . . . .	2 —
50	„ „ 50 „ „ „ . . . . .	3 20
100	„ „ 30-40 „ „ „ . . . . .	7 —
12	„ „ 12 „ mit weisser Corolle . . . . .	1 6



12	Fuchsien, in 12 Species, nach unserer Wahl . . . . .	2	—
24	„ „ 24 „ „ „ „ „ „ . . . . .	6	—
6	<i>Fritillaria imperialis aureo varieg.</i> . . . . .	2	10
12	<i>Gazania aurantiaca, grandiflora, Souci, splendens</i> . . . . .	1	6
6	„ <i>splendens fol. var.</i> . . . . .	1	10
12	Georginen, grossblumige und Liliputen, in 12 nur guten Sorten . . . . .	1	—
25	„ „ „ „ „ 25 „ „ „ . . . . .	2	—
50	„ „ „ „ „ 50 „ „ „ . . . . .	5	—
100	„ nach unserer Wahl . . . . .	8	—
12	„ Liliputen, in 12 nur guten Sorten . . . . .	1	15
12	„ Zwerg-, in 12 vorzüglichen Sorten . . . . .	3	—
12	<i>Gladiolus gandavensis</i> , in 12 Sorten . . . . . für 1 und 2	2	—
25	„ „ „ 25 „ „ „ 2 „ . . . . .	5	—
50	„ „ „ 30—40 Sorten . . . . . „ 5 „	10	—
12	<i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . .	—	20
6	<i>Gratiola officinalis</i> . . . . .	—	18
6	<i>Gymnogramme Laucheana</i> . . . . .	1	15
6	„ <i>Wettenhalliana</i> . . . . .	3	—
6	<i>Hedera rhombea fol. var.</i> . . . . .	1	—
12	<i>Heliotropium</i> , in 12 Sorten . . . . .	1	10
6	<i>Hibiscus Cooperi</i> . . . . .	1	10
6	<i>Hoya</i> , diverse Sorten . . . . .	2	—
6	<i>Humea elegans</i> . . . . .	—	20
12	„ „ . . . . .	1	5
12	<i>Hydrangea japonica rosalba</i> . . . . .	2	15
12	„ <i>hortensis fol. argentea var.</i> . . . . .	2	—
12	<i>Kalmia latifolia. Stark</i> . . . . .	10	—
6	<i>Lamprococcus Laurentianus</i> . . . . .	6	—
12	<i>Lantana</i> , in 12 Sorten. . . . .	1	15
6	<i>Latania borbonica</i> , 1—1½ Fuss hoch . . . . .	5	—
12	„ „ 1 Fuss hoch . . . . .	10	—
12	<i>Libonia floribunda.</i> . . . . .	1	15
6	<i>Licuala spinosa</i> . . . . .	6	15
12	„ „ . . . . .	13	—
12	<i>Lilium lancifolium album. Stark</i> . . . . .	2	20
12	„ „ <i>roseum. Stark</i> . . . . .	2	20
12	„ „ <i>rubrum. Stark</i> . . . . .	2	20
12	„ <i>longiflorum</i> . . . . .	1	15
12	„ in 12 Sorten nach unserer Wahl für . . . . . 3 und 6	—	—
24	„ „ 24 „ „ „ „ 10 „	20	—
6	<i>Limnocharis Humboldti.</i> . . . . .	1	—
6	<i>Livistonias rotundifolia</i> . . . . .	25	—
12	<i>Lobelia erinus</i> . . . . .	1	—
12	<i>Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis</i> . . . . .	1	15
6	<i>Luzuriaga radicans</i> . . . . .	1	5
6	<i>Macodes petola</i> . . . . .	24	—
12	<i>Mahonia fascicularis</i> . . . . .	2	—
12	<i>Magnolia acuminata</i> . . . . .	2	15
12	„ <i>discolor</i> . . . . .	2	—
12	„ <i>gracilis</i> . . . . .	2	—
12	„ <i>macrophylla</i> . . . . .	5	—
12	„ <i>purpurea</i> . . . . .	2	—
12	„ <i>Soulangeana</i> . . . . .	2	—
12	„ <i>tripetala</i> . . . . .	1	20
12	„ <i>Youlan</i> . . . . .	5	—
12	„ <i>discolor</i> . . . . .	12	—
12	„ <i>gracilis</i> . . . . .	10	—

	Thlr.Gr.
Magnolia tripetala, 5jährig, in Töpfen . . . . .	5 —
6 Maranta albo lineata . . . . .	5 —
6       "       argyracea . . . . .	5 —
6       "       bicolor . . . . .	1 15
12       "       " . . . . .	3 —
6       "       glumacea . . . . .	3 —
6       "       ornata picta . . . . .	8 —
6       "       Warscewiczii . . . . .	4 —
6       "       vittata . . . . .	5 —
12 Mesembrianthemum, in 12 Sorten . . . . .	1 —
6 Musschia Wollastonii . . . . .	2 —
6 Naegeliien in 6 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	1 15
12 Nelken, Remontant-, in 12 Sorten . . . . .	2 10
6 Nymphaeen mit Namen, nach unserer Wahl . . . . .	4 —
12       "       "       "       "       "       " . . . . .	8 —
6 Oenocarpus minor, 1 Fuss hoch . . . . .	20 —
24 Orchideen, diverse, nach unserer Wahl . . . . .	18 —
50       "       "       "       "       "       " . . . . .	80 —
100       "       "       "       "       "       " . . . . .	250 —
12       "       für das freie Land nach unserer Wahl . . . . .	1 —
24       "       "       "       "       "       " . . . . .	2 —
6 Oreodoxia regia . . . . .	10 —
6 Osmanthus aquifolius diversifolius . . . . .	1 5
6       "       ilicifolius argent. marg. . . . .	1 5
12 Paeonia arborea, in 12 Sorten . . . . .	3 und 5 —
25       "       "       " 25       " . . . . .	6       " 10 —
6       "       "       (chinesische), in 6 Sorten . . . . .	3       " 5 —
12       "       "       "       " 12       " . . . . .	6       " 10 —
6 Pandanus utilis. 2 Fuss hoch . . . . .	10 —
6 Passiflora, div. species . . . . .	1 15
12 Pelargonium (grossbl. u. Odier), 12 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	3 —
25       "       "       "       " 25       "       "       " . . . . .	6 —
50       "       "       "       " 50       "       "       " . . . . .	12 —
6       "       Fancy, in 6 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	1 15
12       "       "       " 12       "       "       " . . . . .	3 —
12       "       Zonale, in 12 neueren u. neuest. Sort. n. unserer Wahl . . . . .	3 —
24       "       "       " 24 älteren Sorten . . . . .	2 —
50       "       "       " 50       "       " . . . . .	4 —
12       "       "       mit zweifarbigen Blättern nach unserer Wahl . . . . .	3 —
12       "       "       "       dreifarbigen       "       "       " . . . . .	4 20
12       "       "       "       = Species, nach unserer Wahl . . . . .	1 10
24       "       "       "       "       "       " . . . . .	3 —
6       "       "       Gloire de Corbeny . . . . .	1 15
12       "       "       "       "       " . . . . .	3 —
25       "       "       "       "       " . . . . .	6 —
6 Pentstemon, in 6 neueren Sorten . . . . .	1 20
12       "       " 12 älteren       " . . . . .	1 20
12 Periploca graeca . . . . .	2 —
12 Phlox decussata u. omniflora, in 12 neueren Sorten . . . . .	2 20
12       "       "       "       " 12 älteren       " . . . . .	1 10
25       "       "       "       " 25 Sorten . . . . .	2 15
50       "       "       "       " 30—40 Sorten . . . . .	5 —
6 Phoenix dactylifera, 2jährig . . . . .	2 —
6 Phrynium Porteanum . . . . .	6 —
6       "       Riedehaanum . . . . .	4 15
6 Pilea serpyllifolia . . . . .	1 —
12 Pilogyne suavis . . . . .	1 —

6	Pittosporum Tobirac fol. var.	2	10
12	Primula sinensis flore albo pl.	3	—
12	„ „ „ rubro „	3	—
12	Pteris cretica albo-lineata.	1	10
24	„ „ „	3	—
6	Ptychosperma gracilis. 1½ Fuss hoch.	24	—
12	Raphia Ruffia. 1½—2 Fuss hoch	24	—
6	Reineckia carnea fol. var.	1	—
12	Rhododendron, für das freie Land in 12 Sorten. 1—1½ Fuss hoch	5	—
25	„ „ „ „ „ 25 „ 1—1½ „ „	10	—
50	„ „ „ „ „ 50 „ 1—1½ „ „	20	—
100	„ in 30—40 Sorten. 1—1½ Fuss hoch	30	—
12	„ Nuttalli	5	—
25	„ „	9	—
12	„ virgatum	3	—
25	„ „	5	—
12	Rochea falcata, blühbare Pflanzen	3 à	4 —
12	Roezlia regia vera, stark	20	—
12	Rosen in 12 Sorten. Hochstämme	5	—
25	„ „ 25 „ „	10	—
150	„ „ 50 „ „	36	—
12	„ „ 12 „ Niedrige, veredelte und wurzelechte	2	—
25	„ „ 25 „ „ „ „ „	4	—
50	„ „ 50 „ „ „ „ „	8	—
6	Sabal Adansoni, 2jährig	4	—
6	Sagittaria sagittifolia	—	18
6	Saxifraga tricolor.	1	15
6	Schizostylis coccinea	—	15
12	„ „	1	—
25	„ „	2	—
50	„ „	4	—
6	Selaginella, in 6 Sorten	1	15
12	„ „ 12 „	3	20
6	Selinum decipiens, 2jährige Pflanzen	2	—
12	Serissa foetida fol. albo marginatis	1	10
6	Solanum, in 6 Sorten	1	10
6	Sonerilla margaritacea.	2	—
12	Sorghum halepense	3	—
6	Statice latifolia	1	15
12	Succulente (Fett-) Pflanzen	1	10
6	Tacsonia Vanvolxemii	1	20
6	Thyrsacanthus rutilans	1	20
6	Torenia asiatica	—	20
6	„ pulcherrima	—	20
6	Tricyrtis grandiflora	1	15
6	„ hirta	1	5
6	Trithrinax mauritiaeformis. 8 Zoll hoch	10	—
12	Tydaeen, in 12 der schönsten Sorten	2	10
6	Typha minima	1	—
6	Vallisneria spiralis (foem.)	—	10
6	„ „ (masc)	—	15
6	Verbenen, ältere, in 6 Sorten	1	—
12	„ „ „ 12 „	2	—
12	Veronica in Sorten	2	—
12	Warmhauspflanzen, in 12 Sorten	5	—
25	„ „ 25 „	12	—
12	„ buntblättrige, in 12 Sorten	6	—



12	<i>Yucca recurva</i> . In 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohen Pflanzen . . . . .	3 —
12	» <i>filamentosa</i> . In 4- und 5jährigen Pflanzen . . . . .	3 —
6	<i>Zea japonia fol. var.</i> . . . . .	— 25
6	» <i>Caragua fol. var.</i> . . . . .	— 25
6	<i>Zingiber officinarum</i> . . . . .	1 10
6	Zwergobst, in Töpfen, nach unserer Wahl (Obstorangerie) . . . . .	3 —
12	» » » » » » . . . . .	6 —
25	» » » » » » . . . . .	12 —

## Literarischer Anzeiger

für

# Botanik, Landwirthschaft und Gartenbau.

## Nr. 2.

**Die durchlaufende Colonelzeile oder deren Raum wird in diesem Anzeiger mit 3 Gr. berechnet.**

**Beer, J. G.,** Beiträge zur Morphologie u. Biologie der Familie der Orchideen. Mit Holzschnitten und 12 chromolithographirten Tafeln. Folio. Wien, C. Gerold. Cartonnirt. 10 Thlr.

**Garten- und Blumenzeitung, Hamburger.** Zeitschrift für Garten- und Blumenfreunde, Kunst- und Handelsgärtner. Herausgeg. von **Ed. Otto**. 23. Jahrg. für 1867. 12 Hefte in 3—4 Bogen, gr. 8. geh. 5 Thlr. Verlag von Rob. Kittler in Hamburg.

Die Hamburger Gartenzeitung ist nach dem Ausspruche deutscher Sachkenner und englischer und belgischer Blätter die gediegendste deutsche Zeitung für Gärtner und Gartenfreunde, sie ist in Belgien, Frankreich, Spanien und Italien (bis Neapel), in der Wallachei, in Moskau, St. Petersburg und Stockholm zu finden, und englische Blätter erklärten, dass es die einzige deutsche Gartenzeitung sei, aus der man etwas lernen könne. — Sie bringt stets das Neueste und Interessanteste und giebt wohl der Umstand den besten Beweis für den werthvollen Inhalt, dass viele andere deutsche Gartenzeitungen oft nach Wochen und Monaten als etwas Neues bringen, was wörtlich aus der Hamburger Gartenzeitung abgedruckt ist. — Auch in Schriften über Gartenbau und Botanik findet man häufig Wort für Wort die Hamburger Gartenzeitung wieder abgedruckt und als Autorität aufgeführt, was wohl am besten darlegt, dass sie einen dauernderen Werth behält, als die meisten andern Zeitschriften dieser Art. Sie bleibt ein beständiger Rathgeber und ein vollständiges Nachschlagebuch für alle Garten- und Pflanzenfreunde. —

Die seit 36 Jahren erschienene „Weissenseeer Blumenzeitung“ habe ich mit allen Vorräthen angekauft und mit der Hamburger Gartenzeitung vereinigt.

**Gartenflora.** Allgemeine Monatsschrift für deutsche, russische und schweizerische Garten- und Blumenkunde und Organ des russischen Gartenbau-Vereins zu St. Petersburg. Unter Mitwirkung vieler Botaniker und Gärtner Deutschlands, Russlands und der Schweiz. Herausgeg. von Dr. **E. Regel**, kais. russ. Collegienrath, Ober-Botaniker des kais. botan. Gartens zu St. Petersburg. 1867. Verlag von Ferd. Enke in Erlangen.

Diese allbekannte, gediegene und höchst lehrreiche Gartenzeitschrift erscheint in 12 Monatsheften und in 2 Ausgaben. Die eine mit illum. und schwarzen Abbildungen, die andere ohne diese. Erstere kostet 6 Thlr., die andere 3 Thlr. jährlich.

**Jäger, H.**, Grossherz. Sächs. Hofgärtner etc. Der immerblühende Garten. Anleitung zur Ausschmückung und Erhaltung von Blumengärten und Beeten jeder Art, sowie zur Cultur und Verwendung der schönsten Land- und Topfgartenblumen zu jeglicher Jahreszeit. Mit 24 Abbildungen von Blumenbeeten und Blumengärten. Leipzig, O. Spamer. Elegant geh. 1 Thlr.

— **Illustriertes allgemeines Gartenbuch.** Mit 230 Abbildungen. Vollständ. Anleitung zum Gartenbau nach jeder Richtung, zur Gartenkunst wie Landschaftsgärtnerei, als zum Gemüse- und Obstbau, zur Anlage von Baumschulen, zur künstlichen Baumzucht und Befruchtung, sowie zum Samenbau, zur Blumen-gärtnerei im Garten, Glashaus und Zimmer etc. Nebst einer wissenschaftlichen Einleitung: über Bau, Ernährung, Lebensverrichtungen, Feinde und Krankheiten der Pflanzen. Leipzig, O. Spamer. Elegant geh. 1½ Thlr.

**Les Fougères.** (Die Farnkräuter). *Choix des espèces les plus remarquables pour la decoration des Serres, Pares, Jardins et Salons. Précédé de leur histoire botanique, horticole et pittoresque par M. M. Rivière, Jardinier en Chef du Luxembourg, André, Jardinier principal de la Ville de Paris et de Roze, Vice-Secrétaire de la Société botanique de France.* Prachtvoller 8<sup>o</sup>-Band, 300 Seiten Text mit 112 Holzschnitten und 75 Chromotafeln. Paris, J. Rothschild. Preis 8 Thlr.

**Lowe, E. J., et W. Howard,** Les Plantes à feuillage coloré. Recueil des espèces les plus remarquables servant à décoration des jardins, des serres et des appartements. Traduit de l'anglais par J. Rothschild, avec le concours de plusieurs horticulteurs. Ouvrage illustré de 60 gravures coloriées et de 46 gravures sur bois. gr. in 8<sup>o</sup>. Paris, J. Rothschild. 1865. Relié. Prix 10 Thlr.

**Siebeck, Rud.,** Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen. Auf 20 colorirten Tafeln mit ausführlicher Erklärung und nöthigen Beispielen mit der vorausgehenden fasslichen Theorie der bildenden Gartenkunst. gr. qu. Fol. Leipzig. Geb. 12 Thlr.

**Williams, Benj. Samuel,** The Orchid-Growers Manual, containing brief descriptions of upwards of 440 orchidaceous plants, together with notices of their times of flowering and most approved modes of treatment; also plain and practical instructions relating to the general culture of orchids; and remarks of the heat, moisture, soil and season of growth and rest best suited to the several species. 2. edition. 8. London, Chapman and Hall. Cart. 2 Thlr. 10 Ngr.

*Wir sind gern bereit, unseren geehrten Abnehmern die vorstehend angekündigten Werke zu den beigefügten Preisen zu besorgen.*

*Si l'un au l'autre de nos honorables clients désire avoir des ouvrages annoncés précédemment, nous nous chargerons volontiers de les lui procurer aux prix indiqués.*

## Nachträgliche Bemerkungen und Berichtigungen.

☞ Einer, kurz vor Schluss des Catalogs erhaltenen Nachricht des Herrn Twr dy zu folge, kann derselbe die auf pag. 13 angezeigte Fuchsie „H. Laurentius“, da ihm deren Vermehrung missglückt ist, nicht vor nächstem Herbst abgeben.

Die Preise der Twr dy'schen neuen Fuchsien (vide pag. 13 und 14) normiren sich demnach wie folgt:

Abgebbar vom 15. März an die Sorte 25 Gr., die Collection (5 Sorten) 3 Thlr. 22½ Gr.; — und vom 15. Juni an die Sorte 20 Gr. und die Collection 2 Thlr. 15 Gr.

M. Twr dy vient de nous faire part qu'il ne pourra fournir la variété nouvelle de Fuchsia „H. Laurentius“ qu'en automne prochain, parcequ'il n'a pas réussi de l'augmenter suffisamment. Par cette raison les prix des Fuchsias nouveaux de M. Twr dy (voyez pag. 13 et 14) sont à fixer comme suit:

Livrables à partir du 15 Mars chaque variété 25 Gr. et la collection (5 variétés) 3 Thlr. 22½ Gr., — et à partir du 15. Juin la variété 20 Gr. et la collection 2 Thlr. 15 Gr.

**Maranta roseo picta** (M. rosea illustrata). Von dieser herrlichen Species, die wir (vide pag. 4) zu dem billigen Preise von 3 Thlr. 15 Gr. notirt haben, können wir auch stärkere Pflanzen zu 7 und zu 10 Thlr. liefern.

Wir bringen hiermit zur Kenntniss, dass die im verflossenen Jahre der Kriegseignisse wegen unterbliebene vierte Conferenz der Deputirten der vereinigten deutschen Gartenbau-Gesellschaften in Verbindung mit einer Ausstellung von Pflanzen, Blumen, Gemüsen und Früchten nunmehr den 13. bis 16. Juli d. J. in **Leipzig** stattfinden wird. Bezüglich der Ausstellung ist insbesondere hervorzuheben, dass die Commission der Wander-Versammlung ihr hauptsächlichstes Augenmerk auf die Prüfung der Gattungen

**Fuchsia** in ihren Species und Varietäten,  
**Pelargonium zonale et inquinans** var.

und auf die Fruchtsorten der

**Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren** richten wird. Die Preise bestehen in goldenen und silbernen Medaillen, sowie in Geldpreisen. Programme stehen auf Verlangen zu Diensten.

## Alphabetisches Verzeichniss

der in diesem Cataloge enthaltenen Genera.

TABLES DES GENRES,  
*compris dans ce catalogue.*

Abies 56. 63. 120. 124.	Alsophila 144.	Areca 130. 145. 156.
Abutilon 6. 129. 132.	Alstroemeria 89.	Arenga 145. 156.
Acacia 89.	Althaea 27.	Argyranthemum 73.
Acalypha 129. 132. 145.	Althernanthera 6. 73. 128.	Arisaema 138.
Acampe 150.	Alyssum 128.	Aristolochia 133.
Acanthophippium 150.	Amaranthus 73. 128.	Arpophyllum 150.
Acer 80.	Amaryllis 1. 7. 89. 129. 133.	Arthrotaxis 120. 125.
Achimenes 132. 144.	Amomum 145.	Artocarpus 133. 145.
Achyranthes 1. 73. 129. 132.	Amorphophallus 138.	Arundina 150.
Acineta 150.	Anacharis 131.	Arundo 73. 128. 131.
Acontias 138.	Ananas 141.	Aspidistra 130. 133.
Acorus 128. 131.	Andropogon 73.	Aspidium 88. 142.
Acrostichum 142.	Anecochilus 7. 155.	Asplenium 88. 142. 144.
Adamia 133.	Anemiopsis 131.	Astelia 89. 128. 139.
Adansonia 133. 145.	Angiopteris 142.	Astrapaea 133.
Adelaster 129.	Angrecum 150.	Astrocaryum 129. 156.
Adenocalymna 133.	Anguloa 150.	Ataccia 133.
Adhatoda 133.	Anona 145.	Aubrietia 10. 128.
Adiantum 142. 145.	Ansellia 150.	Aucuba 10. 64. 89. 128.
Aechmea 133.	Anthurium 2. 7. 129. 133.	Azalea 96. 128. 161.
Aërides 150.	138.	Bactris 156.
Aeschynanthus 133.	Antiaris 145.	Baeobotrys 133. 138.
Afzelia 132.	Antirrhinum 28.	Balantium 144.
Agapanthus 89. 128.	Aphelandra 129. 133.	Bambusa 73. 89. 128. 133.
Agatheia 128.	Apiera 95.	Baphia 133. 146.
Agave 92. 128. 145.	Aponogeton 131.	Barringtonia 133. 146.
Aglaonema 129. 133. 138.	Arabis 128.	Beaucarnea 139.
Alisma 131.	Aralia 2. 7. 73. 130. 137.	Begonia 2. 7. 141.
Allamanda 133.	145.	Beloperome 133.
Alloplectus 133.	Araucaria 10. 56. 122. 124.	Berberis 64. 89.
Alnus 1. 128.	145.	Bertholletia 146.
Alocasia 1. 6. 129. 133. 138.	Arbutus 145.	Bertolonia 2. 7. 130. 133.
Aloë 95.	Ardisia 132.	Beschorneria 94.



- Bifrenaria 150.  
 Bignonia 7. 89. 133.  
 Billbergia 141.  
 Biota 56. 63. 118. 125. 128.  
 Bischoffia 133.  
 Blandfordia 89. 140.  
 Blechnum 143. 144.  
 Bleckeria 133.  
 Bletia 1. 128. 150.  
 Blighia 132. 146.  
 Boehmeria 73. 130. 133.  
 Bombax 146.  
 Bonaparteia 94.  
 Bosscheria 133.  
 Botryodendron 7. 133. 138.  
 Bougainvillea 133.  
 Boussingaultia 64. 89.  
 Bouvardia 28.  
 Brahea 156.  
 Brassaiopsis 133.  
 Brassavola 150.  
 Brassia 150.  
 Brexia 133.  
 Bromelia 130. 142.  
 Broughtonia 150.  
 Brownea 133. 146.  
 Brugmansia 89.  
 Burlingtonia 150.  
 Butomus 131.  
 Buxus 64. 128.  
 Caladium 138. 139.  
 Calamus 156.  
 Calanthe 146. 150.  
 Calathea 2. 130. 160.  
 Calceolaria 28.  
 Calla 73.  
 Callitris 118. 125. 146.  
 Calonyction 7. 133.  
 Calophyllum 146.  
 Calothamnus 89.  
 Caltha 131.  
 Camellia 12. 128.  
 Campanula 88.  
 Campanumoea 89.  
 Camphora 89.  
 Campylobotris 130. 133.  
 Campyloneuron 143.  
 Canna 70.  
 Carica 146.  
 Carludovicia 146. 156.  
 Carolinaea 133.  
 Caryophyllus 146.  
 Caryota 146. 156.  
 Cassia 89.  
 Castilloa 146.  
 Catasetum 150.  
 Cattleya 3. 150.  
 Cecropia 133.  
 Cedrela 146.  
 Cedrus 57. 121. 125.  
 Celastrus 80.  
 Centaurea 11. 73. 89. 128.  
 Centradenia 133.  
 Cephaëlis 146.  
 Cephalanthera 88.  
 Cephalotaxus 123. 125.  
 Ceratopteris 131.  
 Ceratozamia 156.  
 Ceropegia 133.  
 Ceroxylon 146. 156.  
 Cestrum 89.  
 Chamaecyparis 57. 63. 118.  
 125. 128.  
 Chamaedorea 157.  
 Chamaeranthemum 7. 130.  
 Chamaerops 2. 146. 157.  
 Chamberlaynea 133.  
 Chlorophytum 140.  
 Chorizema 89.  
 Chrysanthemum 13. 29. 128.  
 Chrysophyllum 146.  
 Chrytoglossa 151.  
 Chysis 151.  
 Cibotium 143. 144.  
 Cinchona 7. 146.  
 Cineraria 73. 128.  
 Cinnamomum 146.  
 Cirrhaea 151.  
 Cissus 7. 64. 89. 128. 130.  
 133.  
 Citrus 89.  
 Clavija 133.  
 Clematis 11. 64.  
 Clerodendron 7. 90. 134.  
 Clethra 90. 128.  
 Cleystera 90. 128.  
 Climocandra 130. 134.  
 Clivia 134.  
 Clusia 134.  
 Cobaea 90. 128.  
 Coccoloba 7. 134. 146.  
 Cocos 157.  
 Coelia 151.  
 Coeloglossum 88.  
 Coelogyne 151.  
 Coffea 146.  
 Colea 7. 134.  
 Coleus 3. 130. 134.  
 Colletia 90.  
 Colocasia 73. 130. 139.  
 Combretum 134.  
 Compartmentia 151.  
 Coniogramme 143.  
 Convolvulus 90.  
 Cookia 146.  
 Copernicia 157.  
 Cordyline 11. 130. 140.  
 Correa 90.  
 Corypha 157.  
 Cosmophyllum 73.  
 Cossignea 7. 130. 134.  
 Costus 130. 134.  
 Cotoneaster 64. 90.  
 Crassula 30. 95.  
 Crescentia 134. 146.  
 Crinum 134.  
 Croton 8. 130. 134. 146.  
 Crowea 90.  
 Cryptomeria 57. 63. 119.  
 125. 128.  
 Cupania 134. 146.  
 Cupressus 11. 57. 63. 119.  
 125. 128.  
 Curculigo 134.  
 Cureuma 134.  
 Cyanophyllum 130. 134.  
 Cyathea 144.  
 Cycas 157.  
 Cyclamen 90.  
 Cymbidium 151.  
 Cyperus 73. 130. 131. 134.  
 Cypripedium 3. 88. 151.  
 Cyrtandra 161.  
 Cyrtocentrum 151.  
 Cyrtomium 88. 143.  
 Cyrtopodium 151.  
 Cystorchis 130. 155.  
 Cytisus 90.  
 Dacrydium 123. 126.  
 Dactylis 128.  
 Dahlia 15. 16. 17. 81.  
 Dammara 123. 126.  
 Daphne 90.  
 Dasylirion 140.  
 Datura 73. 90. 134.  
 Deeringia 90. 128.  
 Delphinium 31.  
 Dendrobium 151.  
 Desfontainea 90.  
 Desmodium 130. 134.  
 Deutzia 80. 128.  
 Dianthus 20. 39.  
 Dibrachion 8. 134.  
 Dichorisandra 130. 134.  
 Dicksonia 144.  
 Dicrypta 152.  
 Dictyoxiphium 143.  
 Didymochlaena 144.  
 Dieffenbachia 3. 8. 130. 133.  
 146.  
 Dillenia 134. 146.

- Dillwynia 90.  
 Dionaea 134.  
 Dion 158.  
 Dioscorea 8. 130. 134.  
 Diosma 90.  
 Diostemon 95.  
 Diplacus 31.  
 Dipladenia 3. 134.  
 Diplazium 143.  
 Diplothemium 158.  
 Dircaea 144.  
 Disa 152.  
 Disteganthus 142.  
 Dodecatheon 88.  
 Doryanthes 90. 140.  
 Doryopteris 143.  
 Dracaena 8. 73. 90. 130. 140.  
 146.  
 Drimia 90. 95. 128. 134.  
 Drimys 90. 146.  
 Drymonia 144.  
 Drynaria 143.  
 Durio 146.  
 Dykia 142.  
 Echeveria 95.  
 Echites 130. 134.  
 Elaeis 146. 158.  
 Elaeodendron 134.  
 Elaeagnus 90. 128.  
 Elaphoglossum 143.  
 Elettaria 130. 160.  
 Encephalartos 158.  
 Encholirion 142.  
 Entelia 73.  
 Epacris 90.  
 Ephedra 146.  
 Epidendrum 152.  
 Epipactis 88.  
 Equisetum 131.  
 Eranthemum 8. 90. 130. 134.  
 Eria 152.  
 Eriocnema 134.  
 Eriopsis 152.  
 Eriostemon 90.  
 Erythrina 31. 147.  
 Erytrochiton 134.  
 Escallonia 90.  
 Etaeria 130. 155.  
 Eucharis 134.  
 Eugenia 90. 147.  
 Eulophia 152.  
 Eupodium 143.  
 Eurya 90. 128.  
 Euterpe 147.  
 Evonymus 90. 129.  
 Fabiana 90.  
 Fagara 5. 129.  
 Fagraea 8. 134. 147.  
 Fagus 80.  
 Farfugium 90.  
 Fatsia 138.  
 Fernandezia 152.  
 Ficus 3. 8. 130. 134. 147.  
 Fitz-Roya 119.  
 Fragaria 24. 90. 129.  
 Franciscea 8. 9. 130. 134.  
 147.  
 Frenela 58. 63. 119. 126.  
 Fritillaria 88. 129.  
 Fuchsia 13. 14. 31. 129. 161.  
 Furcraea 94.  
 Gaillardia 88.  
 Galactodendron 147.  
 Galipea 135. 147.  
 Gardenia 90. 135. 147.  
 Garcinia 147.  
 Gastonia 138.  
 Gaultheria 90.  
 Gaussia 158.  
 Gazania 5. 36. 129.  
 Geissomeria 130. 135.  
 Genethyllis 90.  
 Georginen 15. 16. 17.  
 Geranium 17. 18. 44. 88.  
 Gesnera 144.  
 Gigelia 134.  
 Gladiolus 85.  
 Gleichenia 143.  
 Gloxinia 144.  
 Glyptostrobis 119.  
 Gnaphalium 73.  
 Gnetum 147.  
 Gomphia 135.  
 Gongora 152.  
 Goniophlebium 143.  
 Goniopteris 143.  
 Goodiera 9. 87. 152.  
 Gordonia 135.  
 Gossypium 147.  
 Graptophyllum 3. 130. 135.  
 Gratiola 131. 147.  
 Grewillea 90. 96.  
 Grias 9. 135.  
 Griffinia 135.  
 Grischowia 9.  
 Griselinia 90.  
 Guajacum 147.  
 Guarea 135. 147.  
 Gunnera 73. 88. 147.  
 Gustavia 135.  
 Guzmanina 142.  
 Gymnadenia 87. 147.  
 Gymnogramme 1. 9. 130.  
 143.  
 Gymnostachyum 135.  
 Gynierum 73. 90.  
 Habenaria 152.  
 Haemaria 155.  
 Haematoxylon 147.  
 Hakea 96.  
 Hardenbergia 90.  
 Hartwegia 152.  
 Hebeclinium 73. 135.  
 Hechtia 142.  
 Hedera 64. 65. 90. 129.  
 Hedychium 160.  
 Heliconia 130. 160.  
 Heliotropium 36.  
 Hemerocallis 88. 129.  
 Heritiera 135.  
 Heteropteris 135.  
 Heterotropa 88.  
 Hexacentris 135.  
 Hibiscus 73. 90. 130. 13.  
 Higginsia 135.  
 Hippeastrum 135.  
 Hippomane 135. 147.  
 Hippuris 131.  
 Homanolema 139.  
 Hoplophytum 142.  
 Horsfieldia 135.  
 Houletia 152.  
 Houttuynia 131. 147.  
 Hovea 90.  
 Hoya 3. 130. 135.  
 Humea 73. 90.  
 Hura 147.  
 Hydrangea 11. 73. 90. 129.  
 Hydrocharis 131.  
 Hydrocotyle 131. 147.  
 Hydropeltis 131.  
 Hymenodium 143.  
 Hypophorbe 130. 158.  
 Hypoderris 143.  
 Iaccaranda 135.  
 Iacquinia 135.  
 Iacquemontia 135.  
 Iambosa 9. 135. 147.  
 Iasminum 90. 135. 147.  
 Iatropa 147.  
 Ilex 64. 90. 129. 147.  
 Illicium 90. 147.  
 Imantophyllum 135.  
 Impatiens 135.  
 Inga 135.  
 Ionesia 135.  
 Ionopsis 152.  
 Iosephia 90.  
 Iris 11. 88. 129. 131.  
 Isonandra 147.  
 Isotypus 135.

- Iuncus* 129.  
*Juniperus* 58. 63. 119. 120.  
 126. 129.  
*Ixora* 135.  
*Kaempferia* 135. 147.  
*Kalmia* 64. 91.  
*Katakidozamia* 158.  
*Kennedya* 91.  
*Kerria* 80. 129.  
*Laelia* 3. 152.  
*Lambertia* 91. 96.  
*Lamprococcus* 9. 142.  
*Lantana* 3. 37.  
*Lapageria* 91.  
*Larix* 59. 121. 126.  
*Lasia* 131. 139.  
*Lastraea* 88. 143.  
*Latania* 130. 158.  
*Laurus* 91. 129.  
*Lechenaultia* 91.  
*Leptotes* 152.  
*Leucophyte* 91.  
*Leucopogon* 91.  
*Libertia* 91.  
*Libocedrus* 59. 120. 126.  
*Libonia* 91. 135.  
*Licuala* 158.  
*Ligeria* 144.  
*Ligularia* 129.  
*Ligustrum* 91. 129.  
*Lilium* 87. 129.  
*Limatodes* 152.  
*Limnanthemum* 131.  
*Limnocharis* 131.  
*Limonia* 91.  
*Lindenia* 135.  
*Linum* 11. 91.  
*Liparis* 152.  
*Listera* 87.  
*Livistonia* 9. 158.  
*Lobelia* 38.  
*Lomaria* 143. 144.  
*Lomatia* 96.  
*Lomatophyllum* 94. 135.  
*Lonicera* 65. 129.  
*Lotzea* 144.  
*Louisea* 152.  
*Ludolfia* 130.  
*Luzuriaga* 64. 65. 91.  
*Lycaste* 152.  
*Lychnis* 88.  
*Machaerium* 9. 147.  
*Macloya* 11. 73.  
*Macodes* 155.  
*Macrochordium* 142.  
*Macrozamia* 158.  
*Magnolia* 80. 81. 91. 148.
- Mahernia* 91.  
*Mahonia* 64.  
*Malpighia* 136.  
*Mandirola* 144.  
*Manettia* 9. 130.  
*Mappa* 136.  
*Maranta* 4. 9.  
*Marattia* 143.  
*Marsilea* 131.  
*Maxillaria* 153.  
*Maximiliana* 158.  
*Medinilla* 136.  
*Meladinus* 135.  
*Melaleuca* 91.  
*Melastoma* 130. 136.  
*Melianthus* 73. 91.  
*Menispermum* 91.  
*Mesembryanthemum* 95.  
*Methonica* 136.  
*Metrodorea* 136.  
*Metrosideros* 91. 129.  
*Metroxylon* 158.  
*Metternichia* 136.  
*Meyenia* 9. 136.  
*Miconia* 9. 130.  
*Microlepis* 143.  
*Mikania* 130. 136. 148.  
*Miltonia* 153.  
*Mimosa* 131. 136.  
*Mimusops* 148.  
*Monochaeton* 136.  
*Monstera* 139.  
*Montanoa* 73. 136.  
*Muraltia* 91.  
*Musa* 148. 160.  
*Muschia* 73. 91.  
*Mutisia* 136.  
*Myosotis* 11.  
*Myriopteris* 143.  
*Myristica* 148.  
*Myrospermum* 148.  
*Myrrhinum* 91.  
*Myrsine* 136.  
*Myrtus* 91. 129.  
*Naegelia* 144.  
*Nandina* 91.  
*Napoleona* 136.  
*Nartex* 148.  
*Nectandra* 148.  
*Nelumbium* 131.  
*Neottopteris* 143.  
*Nepenthes* 136.  
*Nephelaphyllum* 130. 155.  
*Nephrodium* 143.  
*Nicotiana* 73.  
*Nidularium* 142.  
*Nigritella* 87.
- Niphobolus* 143.  
*Norantea* 136.  
*Nuphar* 131.  
*Nymphaea* 131. 148.  
*Nyphaea* 130. 145.  
*Octomeria* 153.  
*Odontoglossum* 4. 153.  
*Oeceoclades* 153.  
*Oenanthe* 132.  
*Oenocarpus* 158.  
*Oldfieldia* 136. 148.  
*Olea* 91. 148.  
*Olecidium* 153.  
*Ophiopogon* 91. 129.  
*Ophris* 87. 148.  
*Orchis* 87. 88. 148.  
*Oreodoxa* 159.  
*Oreopanax* 9. 138.  
*Ornithidium* 153.  
*Orontium* 129.  
*Oryza* 148.  
*Osmanthus* 91. 129.  
*Osmunda* 88. 143. 148.  
*Otacanthus* 136.  
*Pachyphytum* 96.  
*Pachysandra* 129.  
*Paeonia* 65.  
*Pandanophyllum* 9. 136.  
*Pandanus* 130. 148. 159.  
*Panicum* 73.  
*Papyrus* 148.  
*Paratropia* 138.  
*Pardanthus* 12.  
*Paritium* 136. 148.  
*Parkia* 148.  
*Passiflora* 4. 9. 136. 148.  
*Paulinea* 136.  
*Pavetta* 4. 130. 136. 148.  
*Pelargonium* 18. 19. 39. 148.  
*Pellaea* 143.  
*Penstemon* 50.  
*Peperomia* 4. 130. 136. 148.  
*Periploca* 65.  
*Peristeria* 153.  
*Persea* 148.  
*Petunia* 51.  
*Phajus* 130. 153.  
*Phalaenopsis* 131. 153.  
*Pharus* 131. 160.  
*Phegopteris* 143. 144.  
*Philadelphus* 5.  
*Philesia* 91.  
*Philodendron* 9. 139.  
*Phlebodium* 143.  
*Phlox* 51.  
*Phoenicophorum* 10. 131. 159.



- Phoenix 148. 159.  
 Pholidota 154.  
 Phormium 91.  
 Phrynium 10. 131. 160.  
 Phyllarton 136.  
 Phyllocladus 123. 127. 148.  
 Phymatodes 143.  
 Physurus 10. 131. 155.  
 Phytelephas 148. 159.  
 Picea 5. 59. 63. 121. 126.  
 Pictetia 91.  
 Pilea 136.  
 Pilocarpus 136.  
 Pilogyne 65. 91.  
 Pimelia 91.  
 Pimenta 148.  
 Pinanga 131. 159.  
 Pincenecticia 141.  
 Pinus 59. 63. 121. 126.  
     127. 148.  
 Piper 4. 10. 130. 136. 149.  
 Pisonia 4. 136.  
 Pistia 132. 149.  
 Piteairnia 142.  
 Pittosporum 91. 129.  
 Planera 81.  
 Platanthera 88.  
 Platycerium 143.  
 Plectogyne 136.  
 Pleione 154.  
 Pleurothallis 154.  
 Plocostemma 136.  
 Plumieria 136.  
 Podocarpus 123. 127.  
 Poecilopteris 143.  
 Pogonia 131. 154. 155.  
 Pogostemon 136. 149.  
 Poinsettia 136.  
 Polygonum 5. 91. 129.  
 Polystichum 88. 143.  
 Pontederia 132.  
 Potamogeton 132.  
 Potentilla 53.  
 Pothos 131. 139.  
 Pourettia 142.  
 Preptanthe 154.  
 Pritchardia 159.  
 Primula 6. 91.  
 Promeneia 154.  
 Protea 96.  
 Prumnopitys 123. 127. 149.  
 Prunus 64.  
 Pseudolarix 60. 122.  
 Psidium 149.  
 Psychotria 136. 149.  
 Pteris 131. 143.  
 Pterospermum 136. 149. 159.  
 Pterostyrax 91.  
 Ptychosperma 159.  
 Pukateria 91.  
 Pultenaea 91.  
 Punica 91. 149.  
 Putzeysia 136.  
 Puya 142.  
 Pyrethrum 53.  
 Pyrus 79.  
 Quassia 149.  
 Quercus 81.  
 Raphiolepis 91.  
 Reineckea 91. 120.  
 Renanthera 154.  
 Retinispora 12. 60. 118. 127.  
 Rhamnus 91.  
 Rhapsis 10. 131. 159.  
 Rhoidea 6. 91. 129.  
 Rhododendron 64. 66. 115.  
     129.  
 Rhodotypus 81.  
 Rhopala 96. 136.  
 Rhynchosia 136.  
 Rhynchospermum 136.  
 Rhynchostylis 154.  
 Ribes 80.  
 Rochea 96.  
 Rodriguezia 154.  
 Roezlia 94.  
 Rogiera 10. 136.  
 Rosa 20. 74.  
 Rubus 91.  
 Sabal 159.  
 Saccharum 132. 149.  
 Saccolabium 154.  
 Saccopetalum 136.  
 Sagittaria 132. 149.  
 Sagus 149. 159.  
 Salisburia 60. 123. 127. 149.  
 Salix 81.  
 Salvia 91. 129.  
 Sapindus 136. 149.  
 Sapota 149.  
 Saranna 88.  
 Sarcanthus 154.  
 Saribus 159.  
 Saurauja 136.  
 Sauromatum 139.  
 Sauropus 136.  
 Saururus 132. 149.  
 Saxe-Gothaea 123. 127.  
 Saxifraga 91. 129. 132.  
 Schinus 91.  
 Schismatoglottis 131. 139.  
 Schizoloma 143.  
 Schizostylis 88.  
 Schomburgkia 154.  
 Schyzocasia 139.  
 Sciadophyllum 138.  
 Sciadopytis 120. 127.  
 Scindapsus 4. 131. 139.  
 Scirpus 132.  
 Sclerostilis 136.  
 Scutellaria 136.  
 Seaforthia 159.  
 Securidaeca 156.  
 Sedum 91. 96. 129.  
 Selaginella 6. 10. 131. 143.  
 Selenipedium 4. 154.  
 Selinum 73. 91.  
 Selliera 132.  
 Sempervivum 96. 129.  
 Senecio 73. 129.  
 Sequoia 120. 127.  
 Seriana 136.  
 Sericographis 136.  
 Serissa 91. 129.  
 Simaruba 136.  
 Sinningia 145.  
 Sisyrinchium 88. 91. 129.  
 Skimmia 91.  
 Smilax 10. 91. 129. 131.  
     136. 149.  
 Sobralia 154.  
 Solanum 73. 91. 129. 149.  
 Sonchus 73.  
 Sonerila 131. 136.  
 Sophronitis 154.  
 Sorghum 73.  
 Spathodea 136.  
 Spathophyllum 139.  
 Sphaerogyne 10. 131. 137.  
 Sphaerostemma 131. 137.  
 Spiranthes 88.  
 Stachyurus 91.  
 Stadmannia 137. 149.  
 Stangeria 159.  
 Stanhopea 154.  
 Statice 88.  
 Stauranthera 10. 145.  
 Stelis 155.  
 Stenogastra 145.  
 Stephanotis 137.  
 Steudnera 139.  
 Stereulia 137.  
 Stiftia 137.  
 Stravadium 149.  
 Strelitzia 137. 160.  
 Struthiopteris 88. 143.  
 Strychnos 149.  
 Styrax 81.  
 Sutherlandia 91.  
 Swainsonia 91.  
 Swartzia 137.

Swietenia 149.	Tradescantia 131. 137.	Viburnum 92. 129.
Symphonia 149.	Trapa 132.	Victoria 132.
Synectanthus 159.	Trichopilia 155.	Villarsia 132.
Syngonium 131. 139.	Tricocentron 155.	Vinca 129.
Syzygium 149.	Tricyrtis 12. 88. 92.	Vitis 129.
Tabernaemontana 137.	Trigonidium 155.	Vriesea 142.
Tacca 149.	Triolena 137.	Wallichia 160.
Tacsonia 137.	Trithrinax 160.	Warrea 155.
Talauma 137.	Tropaeolum 53. 92.	Warszewiczella 155.
Tamarindus 194.	Tsuga 60. 122. 128.	Weigelia 6.
Taxodium 60. 120.	Tydaea 145.	Weinmannia 92.
Taxus 60. 63. 124. 127. 129.	Tylophora 137.	Wellingtonia 6. 60. 120. 128.
Tecoma 91.	Typha 132.	Widdringtonia 120. 128.
Testudinaria 91.	Uhdea 73.	Wigandia 73.
Thalia 160.	Ulmus 161.	Witsenia 92.
Thea 91.	Urania 160.	Wolkensteinia 137.
Thecostele 155.	Uropedium 155.	Woodsia 88. 143.
Theobroma 149.	Urostigma 137.	Xanthochymus 149.
Theophrasta 10. 137.	Urtica 73.	Xanthosoma 73. 139.
Thibaudia 92.	Vaccinium 129.	Xylophylla 137.
Thrinax 159.	Vallisneria 132.	Xylophia 149.
Thuja 6. 60. 63. 120. 127.	Vanda 155.	Xylosteum 12. 92.
Thujopsis 60. 118. 127. 129.	Vanilla 149. 155.	Yucca 94.
Thunbergia 137.	Verbena 22. 53.	Zalacca 160.
Thunia 155.	Verbesina 73.	Zamia 160.
Thyracanthus 137.	Vernonia 24. 137.	Zauschneria 92.
Tilia 81.	Veronica 54. 92. 129.	Zea 12. 73.
Tillandsia 131. 137. 142.	Verschaffeltia 10. 131. 160.	Zingiber 149.
Torenia 137. 149.	Vesalia 137.	Zygopetalum 155.
Torreya 124. 127.		

Ich erkläre mich hierdurch bereit, neue Species oder Spielarten (Hybriden, Varietäten), mögen sie in europäischen Gärten gewonnen, oder aus überseeischen Ländern eingeführt sein, käuflich oder in Tausch zu acquiriren, und ersuche demnach diejenigen Personen, welche infolge eigener Züchtung, oder directer Einführung in der Lage sind, in irgend einer Beziehung werthvolle Vegetabilien, sei es in Pflanzen oder in Samen, offeriren zu können, mir hierüber gefällig Mittheilung zu machen.

### H. Laurentius,

Eigenthümer der Laurentius'schen Gärtnerei zu Leipzig.

Amateurs, horticulturists and botanists, who meet with new species or varieties of plants, or who should be enabled to collect in tropical countries plants, bulbs or seeds new and suitable for Europe, are requested to make me offers and put themselves in communication with me. All letters etc., to be addressed to the Horticultural Establishment of

H. Laurentius, Leipzig (Germany).

*J'invite MM. les amateurs et horticulteurs ainsi que les naturalistes-botanistes qui viendraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays exotiques des plantes, bulbes, oignons ou graines, nouvelles et en quelque lieu méritantes pour l'Europe, de m'en faire des offertes et de se mettre en relation avec moi.*

*Adresser toutes les lettres à l'Etablissement horticole de*

H. Laurentius à Leipzig (Allemagne).




# INHALT. (TABLE DES MATIÈRES.)

## Haupt-Rubriken. — Sections principales.

	pag.		pag.
<b>I. Abtheilung. Neuheiten . . .</b>	<b>1—27</b>	Gehölze in Töpfen . . . . .	80
Warmhaus-Pflanzen . . . . .	1	Georginen . . . . .	81
Kalthaus- und Freiland-Pflanzen . . . . .	4	Gladiolus . . . . .	85
Blumistische Neuheiten . . . . .	12	Immergrüne Pflanzen . . . . .	64
Erdbeeren, neue . . . . .	24	Lilium . . . . .	87
Vorjährige Neuheiten und sel- tene Pflanzen . . . . .	6	Obst-Orangerie . . . . .	79
		Orchideen . . . . .	87
		Paonia arborea . . . . .	65
		Rhododendron f. d. freie Land . . . . .	66
		Rosen . . . . .	74
		Schlingpflanzen . . . . .	64
<b>II. Abtheilung. Sortimente von Flor- und Modeblumen . . .</b>	<b>27—54</b>	<b>IV. Abtheilung. Kalthaus- Pflanzen . . . . .</b>	<b>89—132</b>
Althaea rosea . . . . .	27	Azalea indica . . . . .	96
Antirrhinum . . . . .	28	Buntblättrige Pflanzen . . . . .	128
Bouvardien . . . . .	28	Camellia jap. . . . .	103
Calceolarien . . . . .	28	Coniferae . . . . .	118
Chrysanthemum . . . . .	29	Kalthauspflanzen im Allgemeinen . . . . .	89
Crassula coccinea . . . . .	30	Liliaceae (Agave, Yucca etc.) . . . . .	92
Delphinium . . . . .	31	Plantae aquaticae . . . . .	96
Diplacus . . . . .	31	Proteaceae . . . . .	96
Erythrina . . . . .	31	Rhododendron für das Kalthaus . . . . .	115
Fuchsia . . . . .	31		
Gazania . . . . .	36	<b>V. Abtheilung. Warmhaus- Pflanzen . . . . .</b>	<b>132—168</b>
Heliotropium . . . . .	36	Araliaceae . . . . .	137
Lantana . . . . .	37	Aroideae . . . . .	138
Lobelia Erinus . . . . .	38	Asphodeleae (Cordylina, Dra- caena etc.) . . . . .	139
Lobelia (perennirend) . . . . .	38	Baumfarne . . . . .	144
Nelken, Remontant- . . . . .	38	Begonia . . . . .	141
Pelargonium, Grossbl. v. Odier . . . . .	39	Bromeliaceae . . . . .	141
Pelargonium, Fancy- . . . . .	43	Farne . . . . .	142
Pelargonium zonale . . . . .	44	Gesneriaceae . . . . .	144
Pelargon. zon., buntblättrige . . . . .	47	Officinell und technisch wichtige Pflanzen . . . . .	145
Pelargonium, Species . . . . .	49	Orchideae Tropicorum . . . . .	150
Pentstemon . . . . .	50	Palmae etc. . . . .	156
Petunien . . . . .	51	Scitamineae et Musae . . . . .	160
Phlox . . . . .	51	Tropische Fruchtbäume . . . . .	145
Potentillen ! . . . . .	53	<b>Literarischer Anzeiger . . . . .</b>	<b>168</b>
Pyrethrum . . . . .	53	<b>Nachtrag . . . . .</b>	<b>161</b>
Tropaeolum . . . . .	53	<b>Partiepreise . . . . .</b>	<b>161</b>
Verbena . . . . .	53	<b>Verzeichniß der Genera . . . . .</b>	<b>170</b>
Veronica . . . . .	54		
<b>III. Abtheilung. Freiland- Pflanzen . . . . .</b>	<b>55—88</b>		
Blattpflanzen für's freie Land . . . . .	70		
Canna . . . . .	70		
Coniferen (Nadelhölzer) . . . . .	55		
Farne für das freie Land . . . . .	88		





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)